

niet snel vergeten.
We wensen Bert en Ronald veel plezier en doorzettingsvermogen toe, dat laatste zullen ze nodig hebben want waarnemingen van de ringslang in de Wieden zijn schaars.

Topscore in Kuinderbos

Vorig jaar werden wij verrast door de grote aantallen ringslangen die Gré ter Woord zag op het traject in het


Kuinderbos, er werden toen zelfs meer ringslangen gezien dan op de topringslangtrajecten in de Randstad (Amsterdam, Diemen, Reeuwijk). Ook dit jaar zet die lijn zich voort; tijdens een ronde begin juni telde Gré dertig (!!!) ringslangen, waaronder veel dikke 'gebobbelde' (dus zwangere) vrouwtjes. Een dag met een topscore en een zeer voldane monitoorder.

Buizerd eet Ringslang

Van Rombout de Wijs ontvingen we de volgende berichten.

Gisteren werden bij het ringen van een jonge buizerd in het Naardermeer (door Fred Vogelenezang en Daan Buitenhuis) in het nest 6 dode ringslangen aangetroffen en nog 1 op de grond onder het nest. Ook vorig jaar werd gezien dat deze buizerd met een ringslang langsvloog. Nu is op zich uit de literatuur bekend dat buizerden ook wel ringslangen eten, maar in het Naardermeer wisten we dat nog niet. Blijkbaar moeten er heel wat ringslangen zitten, anders zou hij er niet zo gemakkelijk aan kunnen komen.

Ik ging een paar dagen later ook nog even langs het nest van deze 'slangenbuizerd'. Ik wilde proberen nog een foto te maken van wat resten van slangen, men dacht namelijk dat het jong was uitgevlogen. Inderdaad vond ik nog een oud slangenskelet en heb geprobeerd een foto te maken. Ik vond echter ook het geringde buizerdjong dood onder het nest! Het was al te ver heen om nog iets over de doodsoorzaak te kunnen zeggen. Tijdens het ringen was opgevallen dat er nogal veel prooiresten in het nest lagen, waarvan nauwelijks was gegeten. Daar lagen dus ook 6 ringslangen zonder kop bij (en 1 of 2 onder het nest). Misschien duidt dit op een verdwenen vrouwtje? Bij veel



roofvogels voeren de vrouwtjes namelijk het jong met prooien die door het mannetje worden aangesleept. Of misschien was het jong ziek. Andere mogelijkheid: gepakt door een havik..

Al eerder was in de Nieuwsbrief te lezen dat de buizerd reptielen eet. In Nieuwsbrief 8 noemde Rob Bijlsma de hazelworm 'hapklare brokjes' voor de jonkies. Opvallend is dat Rombout op z'n traject in het Naardermeer weinig ringslangen ziet, gemiddeld één ringslang per jaar. Het is duidelijk dat deze buizerd de betere ringslang- trajecten weet te vinden!

Het viel ons trouwens op dat bovenstaand bericht parallellen vertoont met het volgende bericht dat wij ontvingen van Rinus Dillerop (roofvogel-onderzoeker in Drenthe en Groningen).

In 1998 heb ik voor het eerst een verse adder (vrouw van ± 50 cm) zonder kop op een buizerd-nest aangetroffen in de periode van half april. De adder is ten prooi geslagen door de buizerd en aangeleverd als voer voor de jongen. Echter na een week, tijdens een nestcontrole lag het lijf van de adder (punt gaaf) onder de nestboom. Dit jaar (half april 1999) nogmaals precies hetzelfde vastgesteld. Alleen dit keer een adder-man (29 cm lang en vervellend)

Ook hier: slangen zonder kop en kadavers onder het buizerdnest.