



04



07



13




18

# Hoe herken ik een uitheemse steur?

Dit is een vraag waar menigeen weleens mee worstelt. Ooit hadden we in het Rijnstroomgebied enkel onze inheemse Europese steur (*Acipenser sturio*) en in een ver verleden de Atlantische steur (*Acipenser oxyrinchus*). Tegenwoordig worden er verschillende uitheemse steursoorten in ons land aangetroffen: diamantsteur (*A. gueldenstaedtii*) (synoniemen: Russische steur en Donausteure), Siberische steur (*A. baeri*), spitssnuitsteur (*A. stellatus*) en sterlet (*A. ruthenus*). Deze steuren lijken behoorlijk op elkaar en worden jaarlijks in veel verschillende km-hokken waargenomen. Met een combinatie van een paar subtiele uiterlijke kenmerken kan de juiste soort vrij gemakkelijk op naam gebracht worden. Als hulpmiddel voor meer (betrouwbare) waarnemingen, is er in het kader van het Signaleringsproject Exoten een herkenningskaart samengesteld, die je als bijlage bij dit nummer aantreft. Deze kaart is ook te downloaden op: [www.ravon.nl/herkenningskaarten](http://www.ravon.nl/herkenningskaarten)

Mark Groen



## Corrigendum

In het artikel 'Zwarte stippen bij vissen uitgelicht' van Jesper Bernds op pagina 19 in Schubben & Slijm nr 46 is een fout geslopen. In de tekst wordt tweemaal gesproken over nematode, maar dit moet zijn trematode.