

Verslagen van de maandelijkse bijeenkomsten

Te Heerlen op 17 februari

Na het welkomstwoord van de voorzitter bood de heer Van Beek de aanwezigen aan een keuze te maken uit een lijst met uit zijn eigen tuin afkomstige zaden.

Daarna meldde de heer Zilverstand de waarneming van drie om een territorium vechtende mannetjes Grote bonte spechten (*Dendrocopos major*).

De heer Offermans zag op 4 januari 1986 nabij de Putberg te Ubachsberg één mannetje Bruine Kiekendief (*Circus aeruginosus*). Januariwaarnemingen van deze soort zijn zeldzaam. Vanaf 26 december 1985 werd door de heer Hoen en andere waarnemers langs de Platzbeek te Nuth gedurende tenminste twee weken één Waterspreeuw (*Cinclus cinclus aquaticus*) gezien.

Van deze soort namen de gebroeders Wouters op 11 januari 1986 twee exemplaren waar langs de Gulp te Gulpen. Dezelfde waarnemers hoorden op die dag in het park van kasteel Gulpen een hen onbekende, typische klinkende, hoge vogelroep. Na korte tijd vloog een hoenderachtige vogel weg, die hen deed denken aan een Hazelhoen (*Testastes bonasia*). Het gehoorde geluid bleek geheel overeen te komen met de baltsroep van het Hazelhoen zoals die te beluisteren is op de betreffende grammofoonplaat van The Peterson Field Guide Series. Daarna deden de gebroeders Wouters met behulp van lichtbeelden verslag van een door hen eind april - begin mei 1985 ondernomen reis naar La Dombes, een streek gelegen ten noordoosten van Lyon, tussen de Saône en de Rhône. La Dombes is bezaaid met zo'n tweeduizend meren en meentjes, waarin vis wordt gekweekt volgens een soort drieslagsysteem: het eerste jaar wordt de pootvis uitgezet, in het tweede jaar wordt de het jaar tevoren geboren vis gevangen en het derde jaar laat men het meer leeg-

lopen om de bodem te bemesten. Het spreekt dan ook vanzelf, dat in dit prachtige land met zijn vele biotopen veel vogelsoorten voorkomen.

In en om de meren werden onder meer waargenomen: Purperreiger (*Ardea purpurea*), Koereiger (*Bulbulcus ibis*) en Kleine zilverreiger (*Egretta garzetta*), Krooneend (*Netta rufina*), Witwangstern (*Chlidonias hybrida*), Dwergmeeuw (*Larus minutus*) en Geoorde fuut (*Podiceps nigricollis*).

Van de roofvogels noemen we de Bruine en Blauwe kiekendief (*Circus aeruginosus* en *C. cyaneus*) alsmede de Rode en de Zwarte wouw (*Milvus milvus* en *M. migrans*).

De Cetti's zanger (*Cettia cetti*), een soort die normaal gesproken hier vlop zou moeten voorkomen, werd niet gehoord. Waarschijnlijk is het aantal Cetti's zangers tijdens de strengere winter 1984/1985 sterk gedecimeerd. Op de drassige terreinen fourageerden veel doortrekkende steltlopers, zoals Oeverlopers (*Tringa hypoleucos*), Bosruiter (*Tringa glareola*) en Groenpootruiter (*Tringa nebularia*).

De Sprekers besloten hun voordracht met enkele zeer fraaie opnamen van vogels van de droge biotopen: Paapjes (*Saxicola rubetra*) in een koolzaadveld, Europese kanarie (*Serinus serinus*), Hop (*Upapa epops*) en natuurlijk de Nachtegaal (*Luscinia megarhynchos*), die hier nog massaal te zien, maar vooral te horen is!

De gebroeders Wouters werden met een gul applaus door de aanwezigen bedankt voor hun voordracht, die een goed beeld gaf van de bezochte streek en de vele soorten vogels die ze herbergt.

Te Maastricht op 6 maart

Voordat de voorzitter, dr. Lever, het woord kon geven aan de gast van deze avond, was er gelegenheid korte mededelingen te doen. De voorzitter beet zelf het spits af door de jongste

uitgave in de reeks Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap te tonen en toe te lichten. Het betreft "Het dal van de Hohn, vegetatie en bodem van een natuurgebied in Noordoost-België", door M.G.H. Bongers en A.A.M. Govers. Meer informatie over deze uitgave vindt u op de binnenzijde van het achteromslag van dit Maandblad. De heer P. Vossen zag onlangs 9 Eksters in een boom in de binnenstad van Maastricht; voor deze, de steden doorgaans mijddende, vogelsoort bepaald iets uitzonderlijks. Voorts meldde hij de waarneming van een Roodkeelduiker in de Maas ter hoogte van het Maaspaviljoen, eveneens een bijzondere waarneming aangezien deze soort gewoonlijk alleen langs de kust waargenomen wordt. Deze vogel bleek gedurende ongeveer twee weken in het geheel niet schuw te zijn. Op 1 maart zag de heer Vossen 20 Kleine zwanen ter hoogte van Eijsden en op 5 maart werd een Rode wouw boven Maastricht waargenomen (vanuit het Stedelijk Lyceum).

De heer d'Aumery meldde vervolgens dat direct na het invallen van de dooi de Kievitten weer trokken: er werden er enkele langs de Maas gezien.

De heer Gijtenbeek tenslotte vergeleek deze merkwaardige late winter met die van vorig jaar en vroeg om gegevens over vorstschade aan struikgewassen (mededelingen hierover worden door de secretaris graag ingewacht).

Vervolgens kreeg de heer H. de Kroon het woord voor een voordracht over de Zuid-Limburgse hellingbossen, met name over het hakhoutbeheer. Aangezien een uitvoerig artikel hierover binnenkort in dit tijdschrift verwacht kan worden, kan een verslag van dit deel van de bijeenkomst beperkt worden tot een oproep aan allen die gegevens over het vroeger (vóór circa 1950) beheer hebben, om die kenbaar te maken aan de secretaris.