

FELDER, W.M., 1968. *Sphenodiscus binckhorsti* Boehm 1898 in het Krijt van Zuid-Limburg. Grondboor en Hamer, jrg. 22 (2), p. 75-95.

GRZIMEK, B. (Ed.), 1972. Het leven der dieren. Deel VI: Reptielen. Deel XIV: Oorsprong en ontwikkeling. Uitg. Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen.

HAUFF, B., 1953 Das Holzmadenbuch. Verlag der Hohenlohe'schen Buchhandlung F. Rau, Oehringen.

MEIJER, A.W.F., 1982. Mosasauriërs die van harde kost hielden. Grondboor en hamer, jrg. 36 (5), p. 133-136.

MULDER, E.W.A., 1984. Resten van *Telmatosaurus* (Ornithischia, Hadrosauridae) uit het Boven-Krijt van Zuid-Limburg. Grondboor en Hamer, jrg. 38 (3/4), p. 108-115.

MÜLLER, A.H., 1968. Lehrbuch der Paläozoologie. band III: Vertebraten; Teil 2: Reptilien und Vögel. VEB Gustav Fischer Verlag Jena.

PIVETEAU, J. (Ed.), 1955. Traité de paléontologie. Tome V. Masson et Cie., Parijs.


ROOS, K.C., 1965. Enige bijzondere vondsten uit het Limburgse Krijt. Jaarboek 1965 van de Nederlandse Geologische Vereniging, Afdeling Limburg, p. 37-42.

ZITTEL, K.A. von, 1923. Grundzüge der Paläontologie. II. Abteilung: Vertebrata. Vierte Auflage. Verlag R. Oldenbourg, München, Berlijn.

Korte mededeling

Waarnemingen van Fladder- of Steeliep gevraagd

Het is nú de tijd dat de iepen bloeien, als ze zich aan de boekjes houden tenminste. Iepesoorten zijn moeilijk uit elkaar te houden, maar er is er één die zich tijdens de bloei- en vruchtdragende periode goed waarneembaar van de anderen onderscheidt, nl. de Fladderiep. De bloeiwijze van de iepen is een rozelrode kleine kluwen van 2-slachtige bloemen, gewoonlijk aanliggend aan de twijg. Bij de **Fladderiep of Steeliep** (*Ulmus laevis* Pall.) zijn de bloempjes van het kluwentje echter duidelijk gesteeld. Dus zijn de vruchtjes dat ook: nootjes middenin een gewimperde vleugel- een afwijkende eigen vorm.



A. *Ulmus laevis*, Fladderiep; B. *Ulmus glabra*, Ruwe iep; C. *Ulmus carpiniifolia*, Gladde iep.

De Fladderiep bloeit iets later dan de andere iepen. Van het Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw te Wageningen ontving ik het verzoek om naar de Fladderiep uit te kijken in de holle wegen van Zuid-Limburg.

Mijn vraag aan u is dan ook: wilt u ons behulpzaam zijn met - overal in Limburg - waarnemingen te doen en op te tekenen, met precieze aanduiding van de standplaats, het aantal exemplaren, en indien mogelijk, de gesteldheid van de boom en de omtrek van de stam op 1.50 m vanaf de grond? Zend ze dan vervolgens naar de Bomenstudiegroep; wij zenden ze later door als ze in ons archief zijn ingeschreven. Het adres: Bomenstudiegroep van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Bosquetplein 7, 6211 KJ Maastricht.

C.C.M. Coolsma

Nogmaals de Wasbeer

De uitbreiding van de Wasbeer in Limburg is een interessant verschijnsel en het zal dan ook geen verwondering wekken, dat de Zoogdierenwerkgroep deze op de voet wil blijven volgen. Oproepen in voorgaande afleveringen van dit tijdschrift resulteerden in diverse nieuwe waarnemingen (fig. 1), waarvoor onze dank. Toch zijn wij ervan overtuigd dat niet alles in ons archief terecht komt. Bij deze daarom nogmaals een oproep aan alle leden om waarnemingen van Wasberen in te sturen naar het archief van de Zoogdierenwerkgroep, p/a W. van der Coelen, Mockeborg 44, 6228 CR Maastricht.



Figuur 1. Alle waarnemingen van Wasberen in Limburg in de periode 1960 t/m 1984. * 1 waarneming; * 2-5 waarnemingen.

Nieuwe meldingen:

april en begin mei 1981: 1 ex. Venray (blok 52-24).

juni 1982: 1 ex. Scheulder-Valkenburg (blok 62-22)

17 augustus 1983: 1 adult en 1 juveniel ex. Gerendal (blok 62-22)

herfst 1983: prenten ten zuiden van Heugem (blok 61-38)

november 1983: 1 ex. Vaasrade-Hoensbroek (blok 60-53)

17 januari 1984: 1 ex. verkeersslachtoffer rijksweg Heer-Maastricht (blok 61-28)

7 maart 1984: prenten Meinweg-Herkenbosch (blok 58-56)

21 april 1984: prenten Meinweg-Vlodrop (blok 58-56)

17 oktober 1984: prenten Meinweg-Herkenbosch (blok 58-56)

W.G. Vergoossen,
Brugweg 20, Echt