

Beheer

De drie hoofdartikelen in dit Maandblad hebben gemeen dat ze elk op een verschillende wijze aandacht besteden aan het beheer van natuurgebieden in Limburg.

Het artikel van de heren Veelenturf en Zoetelief is een reactie op een artikel over het opstellen van beheersplannen voor natuurterreinen dat gepubliceerd werd in het Maandblad van september 1982. De auteurs, die landschapsoecologisch onderzoek deden in het Mergelland (m.n. in het Gerendal), menen dat het toen voorgestelde model op bepaalde punten aanvulling behoeft.

In een artikel van mevrouw Gorissen en de heren Evers en Westhoff worden een tweetal vochtige graslanden, die deel uitmaken van het Bunderbos, besproken. Hierbij wordt, onder meer, de huidige situatie vergeleken met die van 20 jaar geleden. Het artikel eindigt met enkele suggesties ten aanzien van het beheer van deze graslanden.

In de reeks artikelen over de invertebratenfauna van de Zuidlimburgse kalkgraslanden ditmaal een artikel van de hand van de heren Cobben en Rozeboom over cicaden. Van deze insecten-groep werden in totaal 47 soorten aangetroffen. 6 hiervan komen in Nederland alleen in Zuid-Limburg voor. Een tweetal van de gevonden soorten is nieuw voor de Nederlandse fauna. Tot slot wordt in het artikel uitgebreid ingegaan op het effect van diverse vormen van beheer op de cicaden-fauna.

Naast de drie hoofdartikelen treft U in dit Maandblad de gebruikelijke rubrieken aan.

A.J. Lever

Verslag van de maandelijkse bijeenkomst

Te Maastricht op 2 juni 1983

Na de opening door de voorzitter, deed de heer Kemp enkele mededelingen over bijzondere bomen in Zuid-Limburg. Allereerst noemde hij het bloeien van de Anna Paulonaboom (*Paulownia tomentosa*) te Valkenburg en te Maastricht (in de Ververhoek). Deze soort komt in onze streken alleen na extreem zachte winters tot bloei. De Judasboom (*Cercis siliquastrum*), bekend uit de hortus te Luik en uit Geleen, werd tot zijn grote verbazing door een kennis gevonden in de Wycker Pastoorstraat te Maastricht. De ongeveer 10 m hoge boom, die tot de vlinderbloemigen behoort, stond volop in bloei. Deze soort is tijdens zijn jeugd bijzonder vorstgevoelig maar kan daarna heel wat hebben. Gezien de afgelopen jaren, kan deze soort dan ook het beste direkt na een zeer strenge winter aangeplant worden: dan is de kans op overleven het grootst daar de kans op opeenvolgende strenge winters vrij klein blijkt te zijn. In het park van kasteel Amstenrade vond de heer Kemp twee exemplaren van de Vaantjesboom (*Davidia involucrata*).

De heer De Graaf deelde mee dat de

heer Thomas More een fors exemplaar van *Senecio vulgaris* var. *hibernicus* had gevonden in de tuin van huize Klevarie te Maastricht. Eerder verscheen van de hand van de heer J. Cortenraad een artikel in het Maandblad over deze met lintbloemen toegeruste variëteit van het Gewoon kruiskruid. Spreker toonde tevens het nieuwe affiche van het Genootschap en spoorde een ieder aan enkele nieuwe leden te werven.

De jonge generatie vogelaars (Lebon, Vossen en Hanckx) deelden enkele waarnemingen mee: Nijlganzen op 30 april, een Roodpootvalk ♂ op 14 mei en 2 Kleine zilverreigers op 22 mei van dit jaar (alle te Oost-Eijsden). Daarnaast vermeldden zij een broedgeval van de Grote kwikstaart in de Pieterstraat te Maastricht en 2 broedgevallen van Kramsvogels in het Jekerdal te Maastricht. Tenslotte noemden zij enkele vroege aankomstdata: Tappuit ♂ op 12 maart, Zomertaling op 12 maart en Zwarte roodstaart op 13 maart, alle te Oost-Eijsden.

De heer Van Mourik bracht enkele wortelknolletjes van Speenkruid mee; deze knolletjes worden in zijn tuin gegeten door Houtduiven. De heer

A.W.F. Meijer meldde de waarneming van een Hoornaar (*Vespa crabro*) te Ja-beek. Uit de discussie bleek dat de soort ten opzichte van een tiental jaren terug weer iets in aantal toe schijnt te nemen. De heer Van Mourik veronderstelde dat de soort, die zowel overdag als 's nachts jaagt, vooral achteruit was gegaan door de opkomst van kwiklampen.

De heer J. Heerkens Thijssen had 5 Canadese ganzen (*Branta canadensis*) in het naburige Belgische Rekem waargenomen. Vermoedelijk betreft het ontsnapte exemplaren.

Na de pauze hield de heer A.W.F. Meijer een korte inleiding over de inhoud van braakballen van uilen. Aan de hand van enkele eenvoudige kenmerken is het mogelijk om schedeltjes en kaakjes in systematische groepen in te delen: knaagdieren en insecteters. Beide orden kunnen aan de hand van enkele kenmerken verder worden onderverdeeld. Met pincet en borsteltje gewapend, konden de aanwezigen zich daarna enigszins in deze materie verdiepen door enkele braakballen van Kerkuilen uit te pluizen. Rond half elf kon de heer Lever de geanimeerde avond beëindigen.