

makkelijker en met minder verlies worden verzameld. In het wild zou een dergelijke mutant snel verdwijnen, omdat de levenskansen van de zeer dicht bij elkaar ontkiemende en elkaar beconcurrerende jonge planten gering zijn. Voor de gedomesticeerde soort is het verlies van zijn zaadverspreidingsmechanisme geen probleem, omdat de mens de zorg voor verspreiding en voortbestaan op zich heeft genomen. Door een selectie, die zeker honderden jaren, zo niet langer, heeft geduurd, zijn de verschillende gedomesticeerde graansoorten ontstaan. Het

is onmogelijk aan te geven wanneer dit proces precies is begonnen, want in het begin, toen de mens pas op het idee was gekomen een deel van het verzamelde graan te bewaren en dit het jaar daarop uit te zaaien, was er natuurlijk geen verschil tussen het wilde graan en het graan op de akkertjes.

Summary

At monthly meeting observations were reported by members. Mr. Spreuwenberg gave an address about grasses.

UIT DE FLORA VAN LIMBURG

Waarnemingenrubriek van de Plantenstudiegroep van het Natuurhistorisch Genootschap onder redactie van D. Th. de Graaf, Natuurhistorisch Museum, Bosquetplein 6-7, Maastricht, tel.: 034-13671.

Op 19 april hielden leden van de Plantenstudiegroep een excursie naar de omgeving van Slenaken waar gedeelten van het Groote Bosch en het Gulpdal werden geïnvesteerd. Hieronder volgt een lijst van de meest interessante planten die werden gevonden. Een volledige lijst, opgesteld door J. Hermans met aanvullingen van R. van der Ham en J. Jansen, is op aanvraag bij bovenstaand adres verkrijgbaar.

Blad 62, hok 42. 14-15 en 42. 24-25.

Acer campestre Spaanse aak
Agrimonia eupatoria Agrimonie
Alliaria petiolata Look zonder look
Arabidopsis thaliana Zandraket
Asplenium ruta-muraria Muurvaren
Betula pubescens Zachte berk
Brachypodium sylvaticum Boskortsteel
Cardamine amara Bittere veldkers
Cardamine hirsuta Kleine veldkers
Carex caryophylla Voorjaarszegge
Carex flacca Zeegroene zegge

Carex sylvatica Boszegge
Cirsium oleraceum Moesdistel
Convallaria majalis Lelietje der dalen
Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn
Dipsacus fullonum Wilde kaardebol
Dipsacus pilosus Kleine kaardebol
Erophila verna Vroegeling
Hieracium pilosella Muizeoor
Juncus inflexus Zeegroene rus
Lathyrus sylvestris Boslathyrus
Listera ovata Grote keverorchis
Luzula pilosa Ruige veldbies
Luzula sylvatica Grote veldbies
Mespilus germanica Mispel
Myosotis ramosissima Ruw vergeetmijnietje
Myosotis sylvatica Bosvergeetmijnietje
Narcissus pseudonarcissus Wilde narcis
Paris quadrifolia Eenbes
Petasites hybridus Groot hoeblad
Potentilla sterilis Aardbeiganzerik
Potentilla tabernaemontani Voorjaarsganzerik
Primula veris Echte sleutelbloem
Ranunculus bulbosus Knolboterbloem
Ranunculus auricomus Gulden boterbloem
Senecio fuchsii Schaduwkruiskruid
Stellaria alsine Moerasmuur
Thymus pulegioides Grote wilde thijm
Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes
Veronica beccabunga Beekpunge
Veronica hederifolia ssp. *lucorum* Klimop-ereprijs
Veronica montana Bosereprijs
Viola riviniana Witsporig bosviooltje
Viola reichenbachiana Blauwsporig bosviooltje