

binnenste bloemdekbladeren, geelgroen van kleur en lijn- tot priemvormig. In de regel zijn er 8 meeldraden en 1 vruchtbeginsel dat meestal 4-hokkig is. De vrucht is een zwarte bolvormige bes. In plaats van 4-tallige kunnen ook 3-tallige bloemen voorkomen. De bloem wordt door aasvliegen bezocht en bestoven die door de onaangename geur van de bloem misleid worden. Men noemt een dergelijke bloem "fopbloem".

*Narthecium* (Beenbreek) komt met 8 soorten voor in de noordelijke gematigde zone. In West-Europa vindt men *N. ossifragum* (Beenbreek) ten westen van de lijn Noorwegen, z.w. Zweden, Denemarken, n.w. Duitsland, Nederland tot aan n.w. Spanje en Portugal. De wortelbladeren staan bij deze soort in twee rijen, ze zijn lijn- tot zwaardvormig gebogen. De bladeren aan de stengel zijn korter en schedevormig en de hoogste aan de stengel schubachtig. De bloemen staan in een veelbloemige tros. Ze zijn van het normale lelieachtige type en zijn stervormig. De 6 bloemdekbladeren zijn geel met aan de buitenzijde een brede groene middenstreep. Verder komen er 6 meeldraden voor en één 3-hokkig vruchtbeginsel. De vrucht is een oranjekleurige doosvrucht; aan de zaden zit een draadvormig aanhangsel. De bloemdekbladeren vallen na de bevruchting niet af. Deze plant groeit in zeer vochtige, voedselarme hoogvenen in het oosten van ons land en in de Kempen. Door ontginning hiervan wordt Beenbreek steeds zeldzamer. Plaatselijk zijn nog rijke vegetaties in het veen bij Baracque Michel aan te treffen. Over de naam Beenbreek, een letterlijke vertaling van *ossifragum*, heeft men als verklaring dat als vee van deze plant eet dit tot beenbreuk kan leiden. Een betere verklaring is waarschijnlijk dat als vee planten uit een zeer kalkarme vegetatie eet, zoals grassen, zegesoorten en Beenbreek het te weinig kalk in zijn voedsel opneemt, waardoor zijn beenderstelsel verzwakt wordt.

## OVERDRUKKEN VAN PUBLICATIES

In aanvulling van de in het juni/juli nummer gepubliceerde LIJST VAN VERSCHENEN PUBLICATIES, zij hier nog vermeld, dat een groot aantal overdrukken van deze publicaties los verkrijgbaar zijn, uiteraard tegen lagere prijzen. Wij volstaan hier met een summier aanduiding van Reeks, nummer binnen de Reeks (zodanig auteursnaam) en prijs; verdere bijzonderheden op pagina's 107/112.

Reeks I, deel 2: f 1,50. Reeks IV, deel 2: f 2,25. Reeks VII, deel 1: f 4,-; deel 2: f 2,-. Reeks IX, deel 1: f 4,-; deel 2: f 2,-; deel 3: f 2,-; deel 4: f 2,50. Reeks XII, deel 4: f 1,-; deel 8: f 1,50; deel 10: f 1,-. Reeks XIII, deel 1: f 11,-; deel 2: f 3,75; deel 3: f 4,75. Reeks XVIII, aflevering 3, 4, deel 2: f 7,-; deel 4: f 0,50; deel 5: f 1,50; deel 6: f 2,25. Reeks XIX, aflevering 1, 2, deel 1: f 3,-; deel 2: f 2,-; deel 3: f 3,-. Reeks XX, afl. 1, 2, deel 2: f 1,-. Reeks XX, afl. 3, 4, deel 1: f 1,50; deel 2: f 1,25; deel 3: f 3,-. Reeks XXII, deel 1: f 7,50; delen 2/4: f 18,-. Reeks XXV, afl. 2, 3, deel 1 (L.J.M. Butor): f 7,50; deel 2 (C.M. Verkroost): f 2,50.

## OOIEVAARS IN DE PEEL

De heer P. van den Munckhof verhaalt hoe hij op 17 mei 1976 en op 4 juni 1979 een ooievaar heeft waargenomen binnen de gemeente Horst.

De eerste waarneming geschiedde om 6.20 uur (normale, dwz. niet-zomertijd) op de Zwarte Plakweg, waar een Ooievaar zich bevond op het dak van huisnummer 33, vlak naast de schoorsteen. Een kauw protesteerde met geschreeuw en dreigvluchten (vermoedelijk had hij een nest in de schoorsteen), terwijl ook een spreek op ongeveer anderhalve meter zijn misgenoegen uitsprak.

De jongste waarneming werd gedaan vanaf het weggetje langs de Eerste Hoofdwijk, binnen het C.R.M.-reservaat "Mariapeel". Een ooievaar fougerageerde rustig in een groot weiland, ongestoord door het feit dat behalve door onze zegsman hij eveneens bespied werd door twee jongelui, voorzien van kijkers. De tijd van deze waarneming was iets na zessen (wederom normale tijd).