

DE VOGELSTUDIEGROEP: ONTSTAAN EN STRUCTUUR

In januari 1975 werd door het Natuurhistorisch Genootschap onder de leden een enquête gehouden over de bestaande activiteiten en interesses. Dit resulteerde daarin, dat op 20 maart 1976 door H. Gilissen en een twintigtal geïnteresseerden voor het onderdeel ornithologie de basis werd gelegd voor de oprichting van een Vogelstudiegroep.

Nu, begin 1978, is het inmiddels een goed functionerende vereniging, onder supervisie van het Natuurhistorisch Genootschap, met ruim 70 leden, een aantal dat overigens gestaag groeit.

Het doel van de Vogelstudiegroep is, het stimuleren van het vogelonderzoek in Limburg, het samenstellen van een nieuwe Avifauna (aansluitend op P.A. Hens 1963), en het samenwerken met floristische, herpetologische, entomologische en andere onderzoeken.

De groep bestaat uit een voorbereidingsgroep (voorzitter, secretaris en penningmeester), een stuurgroep gevormd door de coördinatoren van lopende onderzoeken, en de leden. Een ieder die actief mee wil werken aan de beoogde doelstellingen is hierbinnen van harte welkom.

Vlak voor elk seizoen (maart, juni, september en december) is er een algemene ledenvergadering in de Stadsschouwburg te Sittard, waar de activiteiten van de afgelopen periode besproken worden, en de nieuwe activiteiten worden voorbereid.

In het navolgende deel van dit nummer worden de activiteiten van de groep verder toegelicht.

Voorbereidingsgroep:

Voorzitter: H. Gilissen,
Rect. Thijssenstraat 9,
tel. 04461-1179,
óf



Vogelstudiegroep

foto: P. de Win

Natuurhistorisch Genootschap,
Bosquetplein 7, Maastricht, tel. 043-13671.

Secretaris:

W. Vergoossen, Brugweg 20, Pey - Echt.

Penningmeester:

C. Bakker St. Joosterbaan 24,
St Joost.

Voorlopige Stuurgroep:

H. Gilissen

W. Vergoossen

W. v.d. Coelen, Somyasingel 215, Meerssen.

G. Dunnewold, Palestinastraat 220, Heerlen.

T. Joosten, Schelsberg 109, Heerlen.

F. Hustings, Sweelinckstraat 14, Heerlen.

G. Peters, M. Magdalenastraat 1, Ohé en Laak.

HET WAARNEMINGSARCHIEF

In 1976 heeft de Vogelstudiegroep een begin gemaakt met het verzamelen van vogelwaarnemingen uit Limburg en de aangrenzende gebieden. Het is de bedoeling dat mensen, die waarnemingen doen, de belangrijke gegevens opsturen naar de waarnemingssecretaris (W. Ganzvles).

Tot nu toe werden ongeveer 1800 waarnemingskaarten ingestuurd, die plusminus 5500 waarnemingen bevatten, verdeeld over 217 soorten en ondersoorten, verwilderde en/of ontsnapte soorten niet meegerekend.

Tevens is een begin gemaakt met literatuuronderzoek.

De binnengekomen gegevens worden verwerkt op aparte kaarten.

Voor de verschillende soorten waarnemingen worden ook verschillend gekleurde kaarten gebruikt. Op de witte de "gewone" waarnemingen, op de rode de broedgegevens, op de blauwe ringgegevens en op de gele waarnemingen, die betrekking hebben op gedrag (bijv.: bij Waterhoentjes voeren de jongen van het eerste broedsel vaak de jongen uit het tweede).

Uiteindelijk zal uit de gegevens (het moeten er vele tienduizenden worden) de Avifauna van Limburg samengesteld worden, als vervolg op de Avifauna van P.A. Hens 1963. De verschijningsdatum hiervan zal in 1985 liggen.

Uit de gegevens wordt o.a. de status van een vogel bepaald (broedvogel, doortrekker, wintergast, en in welk aantal). Als voorbeeld de voorjaars trek van de Rode Wouw in 1976 in Limburg. De waarnemingen die tot nu toe binnenkwamen zijn als volgt:

- 2 - 3 - 1 ex. Echt (W. Vergoossen);
- 22 - 3 - 1 ex. Echt (A. Broen/W. Vergoossen);
- 9 - 4 - 1 ex. Echt (A. Broen);
- 25 - 4 - 2 ex. De Hamert, Bergen (Van Nieuwenhoven);
- 2 - 5 - 5 ex. Ubachsberg (F. Hustings/Van Nuys);
- begin 5 - 2 ex. Mechelen, Wittem (Conen/Blankevoort);
- 6 - 5 - 2 ex. Voerendaal (Conen/Blankevoort);
- 12 - 5 - 1 ex. Voerendaal (T. Joosten).

Deze waarnemingen vertellen ons dat de Rode Wouw in Limburg een regelmatige doortrekker is in zeer klein aantal (1 - 10 ex.). Het is echter heel goed



Waterhoentje met jong

foto: van Nieuwenhoven

mogelijk dat, als alle waarnemingen van de Rode Wouw doorgegeven zouden worden, deze een doortrekker in klein aantal (10 - 50 ex.) blijkt te zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor andere soorten.

Het is daarom ook noodzakelijk dat alle belangrijke en interessante waarnemingen worden doorgegeven. Om een ieder een idee te geven wat voor waarnemingen MINIMAAL ingestuurd dienen te worden, is navolgende lijst samengesteld.

Deze impliceert niet, dat meer algemeen voorkomende vogelsoorten onbelangrijk zijn. ELKE waarneming is in principe welkom en bruikbaar.

Toelichting:

- De genoemde aantallen zijn slechts richtlijnen.
- Onder **totalen** wordt verstaan: groepen, of de som van een aantal individuen die op een bepaald tijdstip in een bepaald gebied worden waargenomen.
- In de kolommen (alle, winter, trek, zomer, broed) achter de soortnaam is aangegeven naar welke waarnemingen onze interesse minimaal uitgaat.

- a.) ALLE: staat er een x in deze kolom, dan betekent dat, dat alle waarnemingen van de erbij staande soort(en) ingestuurd dienen te worden.
- b.) WINTER: staat er een x in deze kolom, dan dienen alle waarnemingen uit de winterperiode (deze periode is nader toegelicht onder "bijzonderheden") ingestuurd te worden.
- c.) TREK: deze kolom heeft betrekking op waarnemingen van zowel voorjaars- als najaarstrek (ook deze staan toegelicht onder "bijzonderheden").
- d.) ZOMER: staat er een x in deze kolom, dan

dienen alle waarnemingen uit de zomerperiode (deze periode is nader toegelicht onder "bijzonderheden") ingestuurd te worden.

– X in deze kolom betekent: iedere waarneming van een broedgeval (of poging) van de betreffende soort insturen. In enkele gevallen kan volstaan worden met een telling per gebied (bijv.: nachtegaal).

– O in deze kolom betekent: de soort is opgenomen in het broedvogelonderzoek.

Zie hiervoor de toelichting in de paragraaf "Broedvogelonderzoek".



Winterse gasten op de Maas te Maastricht

foto: van Nieuwenhoven

Soortnaam	alle	winter	trek	zomer	broed	Bijzonderheden
1. Alle zeeduiersoorten	x					
2. Fuut (<i>Podiceps cristatus</i>)		x			x	Van winter zeker concentraties
3. Alle andere futensoorten	x					
4. Alle Pijlstormvogel- en Stormvogelsoorten, en Jan-van Gent (<i>Sula bassana</i>)	x					
5. Alle Aalscholversoorten	x					
6. Blauwe reiger (<i>Ardea cinerea</i>)		x		x	x	Van winter en zomer zeker concentraties
7. Alle andere Reigersoorten en Roerdomp (<i>Botaurus stellaris</i>)	x					
8. Alle ooievaarsoorten, Flamingo (<i>Phoenicopterus ruber</i>), Zwarte ibis (<i>Plegadis falcinellus</i>) en Lepelaar (<i>Platalea leucorodia</i>)	x					
9. Alle ganzensoorten	x					Indien mogelijk ondersoorten en/of ad./juv. verhouding vermelden; bij trek tevens tijd en vlieg-richting; ook niet 100% gedetermineerde soorten insturen.
10. Knobbelzwaan (<i>Cygnus olor</i>)		x	x		x	Van winter zeker concentraties; ad./juv. verhouding vermelden; van trek alle waarnemingen.
11. Alle andere zwanensoorten	x					Ad./juv. verhouding vermelden indien mogelijk
12. Wilde eend (<i>Anas platyrhynchos</i>)		x			o	Van winter zeker concentraties; telresultaten per gebied
13. Alle andere eendensoorten	x					Evt. ♂/♀ verhouding
14. Buizerd (<i>Buteo buteo</i>)		x	x		o	Van winter zeker telresultaten per gebied; van trek alle waarnemingen.
15. Torenvalk (<i>Falco tinnunculus</i>)		x	x	x	o	Van winter en zomer zeker concentraties (bij muizenplagen e.d.) telresultaten per gebied; ook negatieve gegevens; van trek alle waarnemingen.
16. Alle andere Roofvogelsoorten	x					Bij trek tijd en richting vermelden
17. Patrijs (<i>Perdix perdix</i>)					o	
18. Fazant (<i>Phasianus colchicus</i>)					o	
19. Alle andere hoender- en patrijssoorten, Kwartel (<i>Coturnix coturnix</i>) en Kraanvogel (<i>Grus grus</i>)	x					Zie Kwartel- en Kraanvogel-onderzoek elders in dit art.
20. Waterhoen (<i>Gallinula chloropus</i>)		x			o	Van winter zeker telresultaten per gebied

Soortnaam	alle	winter	trek	zomer	broed
21. Meerkoet (<i>Fulica atra</i>)		x			o
22. Alle andere ral- en bleshoendersoorten en trap- pen (<i>Otididae</i>)	x				
23. Kievit (<i>Vanellus vanellus</i>)		x	x		o
24. Watersnip (<i>Gallinago gallinago</i>)		x	x		x
25. Oeverloper (<i>Tringa hypoleucos</i>)		x	x	x	x
26. Alle andere plevier-, ruiter; grutto-, wulp-, snip-, strandloper-, kluut-, en franjepootsoorten, benevens Scholekster (<i>Haematopus ostralegus</i>), Griel (<i>Burhinus oedicnemus</i>), Renvogel (<i>Cursorius cursor</i>) en Vorkstaart- plevieren (<i>Glareola</i>)	x				
27. Alle soorten jagers	x				
28. Kokmeeuw (<i>Larus ridibundus</i>)		x			o
29. Alle andere meeuwen- soorten	x				
30. Alle sternsoorten	x				
31. Alle alksoorten	x				
32. Alle zandhoendersoorten	x				
33. Holenduif (<i>Columba oenas</i>)		x	x		o
34. Houtduif (<i>Columba palumbus</i>)		x	x		o
35. Tortelduif (<i>Streptopelia turtur</i>)		x	x		o
36. Turkse tortel (<i>Streptopelia decaocto</i>)		x	x	x	o

Bijzonderheden

Van winter zeker telresultaten per gebied

Van winter zeker grote concentraties massale
vorsttrek

Van winter zeker totalen >5 ex.; evt.
jaar- of seizoenoverzicht per gebied.

Alle waarnemingen uit periode oktober-maart
én juni; van andere perioden zeker totalen
>5 ex.; evt. jaar of seizoenoverzicht per gebied.

Van winter zeker slaappleatsen en slaap-
trektellingen.

Van Storm- en Zilvermeeuw zeker totalen
>10 ex. en alle juni-
en juliwaarnemingen in Maasdal; buiten Maasdal
alle waarnemingen van deze twee soorten

Van winter en trek zeker totalen >5 ex.

Winter concentraties en tellingen op
slaappleatsen; van trek zeker totalen >500 ex.

Alle waarnemingen uit periode september-half
april; van trek zeker totalen >10 ex; zie
fenologie.

Van winter en zomer zeker concentraties en
slaappleatsen; van trek zeker totalen > 10 ex.

Soortnaam	alle	winter	trek	zomer	broed	Bijzonderheden
37. Koekoek (<i>Cuculus canorus</i>)		x			o	Alle waarnemingen uit periode oktober-maart/april; zie fenologie; indien mogelijk waardvogels/rossige fase vermelden
38. Alle andere koekoeksoorten	x					
39. Ransuil (<i>Asio otus</i>)		x			o	Roestplaatsen in winter
40. Steenuil (<i>Athene noctua</i>)					o	
41. Alle andere uilensoorten	x					
42. Alle soorten nachtzwaluwen (<i>Caprimulgidae</i>)	x					
43. Gierzwaluw (<i>Apus apus</i>)		x	x		o	Alle waarnemingen uit periode september-half april; van trek zeker totalen >50 ex.; zie fenologie
44. Alle andere gierzwaluwsoorten	x					
45. Hop (<i>Upupa epops</i>), Bijeneter (<i>Merops apiaster</i>) Ijsvogel (<i>Alcedo atthis</i>) en Scharrelaar (<i>Coracias garrulus</i>)						Zie ijsvogel-onderzoek elders in dit nr.
46. Groene specht (<i>Pica viridis</i>)		x	x		o	Van winter zeker waarnemingen van plaatsen waar ze niet broedvogel zijn, van trek alle waarnemingen
47. Grote bonte specht			x		o	
48. Alle andere spechtensoorten	x					
49. Veldleeuwerik (<i>Alauda arvensis</i>)		x	x		o	Van winter en trek zeker totalen >50 ex; let op vorsttrek.
50. Alle andere leeuweriksoorten	x					
51. Boerenzwaluw (<i>Hirundo rustica</i>)		x	x		o	Alle waarnemingen uit periode november-maart; van trek zeker totalen >25 ex; zie fenologie
52. Oeverzwaluw (<i>Riparia riparia</i>)		x	x		x	Alle waarnemingen uit periode september-april; van trek zeker totalen >10 ex.; zie fenologie; in komende jaren speciaal onderzoek.
53. Huiszwaluw (<i>Delichon urbica</i>)		x	x		o	Alle waarnemingen uit periode oktober-begin april; van trek zeker totalen >25 ex.; zie fenologie; in komende jaren speciaal onderzoek.
54. Alle andere zwaluwsoorten	x					
55. Graspieper (<i>Anthus anthus</i>)		x	x		o	Alle waarnemingen uit periode december-februari; van trek zeker totalen >30 ex.

Soortnaam	alle	winter	trek	zomer	broed
56. Boompieper (<i>Anthus trivialis</i>)		x	x		o
57. Alle andere soorten piepers	x				
58. Witte kwikstaart (<i>Motacilla alba</i>)		x	x		o
59. Gele kwikstaart (<i>Motacilla flava</i>)		x	x		o
60. Grote gele kwikstaart (<i>Motacilla cinerea</i>)	x				
61. Alle soorten klauwieren	x				
62. Pestvogel (<i>Bombycilla garrulus</i>) en Waterspreeuw (<i>Cinclus cinclus</i>)	x				
63. Winterkoning (<i>Troglodytes troglodytes</i>)					o
64. Heggemus (<i>Prunella modularis</i>)			x		o
65. Kleine karekiet (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)	x				
66. Bosrietzanger <i>Acrocephalus palustris</i>		x			o
67. Spotvogel (<i>Hippolais icterina</i>)		x			o
68. Tuinfluiter (<i>Sylvia borin</i>)		x			o
69. Zwartkop (<i>Sylvia atricapilla</i>)		x			o
70. Grasmus (<i>Sylvia communis</i>)		x			o
71. Braamsluiper (<i>Sylvia curruca</i>)		x			o
72. Fitis (<i>Phylloscopus trochilus</i>)		x			o
73. Tjiftjaf (<i>Phylloscopus collybita</i>)		x			o

Bijzonderheden

Alle waarnemingen uit periode half oktober-maart; zie fenologie; van trek alle waarnemingen.

Alle waarnemingen uit periode half november-februari; van trek zeker totalen > 10 ex.; let op slaapplaatsen.

Van Rouwkwikstaart alle waarnemingen.

Alle waarnemingen uit periode oktober-maart; van trek zeker totalen > 5 ex.; zie fenologie. Van ondersoorten alle waarnemingen.

zie onderzoek grote gele kwikstaart elders in dit nr.

let bij Waterspreeuw op ondersoorten

Tijdens strenge, langdurige vorst grote sterftes; hiervan melding

Van trek zeker totalen > 5 ex.

Alle waarnemingen uit periode september-eind april; zie fenologie

Alle waarnemingen uit periode september-eind april, zie fenologie

Alle waarnemingen uit periode oktober-half april; zie fenologie

Alle waarnemingen uit periode november-maart; zie fenologie

Alle waarnemingen uit periode oktober-maart; zie fenologie

Alle waarnemingen uit periode oktober-half april; zie fenologie

Alle waarnemingen uit periode half oktober-maart; zie fenologie

Alle waarnemingen uit periode november-half maart; zie fenologie

Soortnaam	alle	winter	trek	zomer	broed
74. Fluits (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)		x			x
75. Goudhaantje (<i>Regulus regulus</i>)		x	x		o
76. Alle andere soorten zangers	x				
77. Grauwe vliegenvanger (<i>Muscicapa striata</i>)		x	x		o
78. Alle andere soorten vliegenvangers	x				
79. Roodborsttapuit (<i>Saxicola torquata</i>)		x	x		o
80. Zwarte roodstaart (<i>Phoenicurus ochruros</i>)		x	x		o
81. Gekraagde roodstaart (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)		x	x		o
82. Roodborst (<i>Erithacus rubecula</i>)					o
83. Merel (<i>Turdus merula</i>)			x		o
84. Kramsvogel (<i>Turdus pilaris</i>)		x	x	x	x
85. Koperwiek (<i>Turdus iliacus</i>)		x	x	x	x
86. Zanglijster (<i>Turdus philomelos</i>)		x	x		o
87. Grote lijster (<i>Turdus viscivorus</i>)		x	x		o
88. Alle andere tapuit-, lijster-, nachtgealsoorten, en Paapje (<i>Saxicola rubetra</i>) Blauwborst (<i>Cyanosylvia</i>) svecica en Baardmannetje (<i>Panurus biarmicus</i>)	x				
89. Koolmees (<i>Parus major</i>)			x		o

Bijzonderheden

Alle waarnemingen uit periode eind september-half april; zie fenologie

Van winter zeker totalen > 5 ex.; van trek alle waarnemingen

Alle waarnemingen uit periode oktober half april; van trek zeker totalen > 5 ex.; zie fenologie

Alle waarnemingen uit de periode oktober-maart; van trek zeker totalen > 3 ex.; zie fenologie

Alle waarnemingen uit periode half oktober-half maart; van trek zeker totalen > 3 ex.; zie fenologie

Alle waarnemingen uit periode half oktober-maart; zie fenologie; van trek alle waarnemingen

Tijdens strenge, langdurige vorst grote sterftes. Hiervan melding

van trek zeker totalen > 10 ex.

Alle waarnemingen uit periode mei-september; let op evt. broedgevallen; van winter zeker concentraties; van trek zeker totalen > 30 ex.; zie fenologie

Alle waarnemingen uit periode mei-september; van winter zeker concentraties; van trek zeker totalen > 30 ex.; zie fenologie

Alle waarnemingen uit periode half november-half maart; van trek zeker totalen > 10 ex.

Alle waarnemingen uit periode december-januari; van trek zeker totalen > 10 ex.

Let bij Blauwborst op roodgestreepte vorm (c.s. svecica). Hiervan melding

Van Nachtegaal (*Luscinia megarhynchos*) telling van zangposten per gebied.

Van trek alle waarnemingen

Soortnaam	alle	winter	trek	zomer	broed
90. Pimpelmees (<i>Parus caeruleus</i>)		x	x		o
91. Zwarte mees (<i>Parus ater</i>)		x	x		o
92. Kuifmees (<i>Parus cristatus</i>)		x	x		o
93. Matkop (<i>Parus montanus</i>)		x	x		o
94. Glanskop (<i>Parus palustris</i>)	x				
95. Staartmees (<i>Aegithalos caudatus</i>)		x	x		o
96. Alle andere soorten mezen	x				
97. Boomklever (<i>Sitta europaea</i>)	x				
98. Boomkruiper (<i>Certhia brachydactyla</i>)			x		o
99. Taiga- of Kortsnavel- boomkruiper (<i>Certhia familiaris</i>)	x				
100. Grauwe gors (<i>Emberiza calandra</i>)	x				
101. Geelgors (<i>Emberiza citrinella</i>)		x	x		o
102. Rietgors (<i>Emberiza schoeniclus</i>)		x	x		o
103. Alle andere soorten gorzen	x				
104. Vink (<i>Fringilla coelebs</i>)		x	x		o
105. Keep (<i>Fringilla montifringilla</i>)		x	x	x	x
106. Putter (<i>Carduelis carduelis</i>)		x	x		x
107. Sijs (<i>Carduelis spinus</i>)		x	x	x	x
108. Groenling (<i>Chloris chloris</i>)		x	x		o
109. Goudvink (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	x				
110. Kneu (<i>carduelis cannabina</i>)		x	x		o

Bijzonderheden

Van winter zeker totalen > 20 ex.; van trek alle waarnemingen

Van winter zeker totalen > 5 ex.; van trek alle waarnemingen; alle waarnemingen van plaatsen waar ze niet broeden

Van winter zeker totalen > 5 ex.; van trek alle waarnemingen; alle waarnemingen van plaatsen waar ze niet broeden

Van winter tellingen per gebied; van trek alle waarnemingen

Van winter zeker totalen > 5 ex.; van trek alle waarnemingen

Van trek alle waarnemingen

Zie onderzoek Grauwe gors elders in dit nr.

Van winter en trek zeker totalen > 10 ex.

Alle waarnemingen uit periode december-januari; van trek zeker totalen > 10 ex.

Van winter en trek zeker totalen > 50 ex.; tellingen op slaapplekken

Alle waarnemingen uit periode mei-augustus en december-februari; van trek zeker totalen > 10 ex.; tellingen op slaapplekken

Van winter en trek zeker totalen > 10 ex.

Alle waarnemingen uit periode mei-augustus; van winter zeker totalen > 20 ex.; van trek zeker totalen > 10 ex.

Alle waarnemingen uit periode december-februari; van trek zeker totalen > 20 ex.

Alle waarnemingen uit periode december-februari; van trek zeker totalen > 20 ex.

Soortnaam	alle	winter	trek	zomer	broed	Bijzonderheden
111. Alle andere soorten vinken	x					Concentraties in herfst en winter; melding van boomnesten
112. Huismus (<i>Passer domesticus</i>)		x	x		o	Van trek zeker totalen >25 ex.; concentraties in herfst en winter; tellingen op slaappleatsen
113. Ringmus (<i>Passer montanus</i>)		x	x		o	
114. Alle andere soorten mussen en Sneeuwvink (<i>Montifringilla nivalis</i>)	x					Slaappleatsen en slaaptrek
115. Spreeuw (<i>Sturnus vulgaris</i>)					o	
116. Alle andere soorten spreeuwen	x					Alle waarnemingen uit periode half augustus-half mei; zie fenologie; alle trekwaarnemingen
117. Wielewaal (<i>Oriolus oriolus</i>)		x	x		x	Van trek zeker totalen > 10 ex.
118. Vlaamse gaai (<i>Garrulus glandarius</i>)			x		o	Let op slaappleatsen. Hiervan melding
119. Ekster (<i>Pica pica</i>)					o	Van trek en winter zeker totalen >25 ex.; tellingen op slaappleatsen
120. Kauw (<i>Corvus monedula</i>)		x	x		o	Van winter zeker totalen > 100 ex.; van trek zeker totalen > 50 ex.; tellingen in kolonies en op slaappleatsen
121. Roek (<i>Corvus frugilegus</i>)		x	x		x	Van winter tellingen per gebied; van trek zeker totalen > 10 ex.; tellingen op slaappleatsen
122. Zwarte kraai (<i>Corvus corone</i>)		x	x		o	
123. Alle andere soorten kraaien	x					

Behalve voornoemde waarnemingen zijn ook belangrijk:

- 1.) Afwijkende verschijningen van (een) gewone soort(en).

Ten voorbeeld:

- qua uiterlijk (bijv.: albino);
- qua biotoop (bijv.: Goudhaantjes langs een grindgat);
- qua gedrag (bijv.: bij Waterhoentjes het voeren van jongen uit het tweede broedsel door jongen uit het eerste).
- qua aantal (bijv.: 2000 Turkse Tortels bij LBB in Maasbracht).

– qua vliegrichting (bijv.: massale Houtduiven-trek naar n. in december).

– enz.

- 2.) Meldingen en/of tellingen (!) van slaappleatsen en slaaptrek (bijv.: mezen, vinken, meeuwen en kraaiachtigen).

Indien U zelf niet kunt tellen (bijv.: door gebrek aan tijd), deze waarnemingen wél zo spoedig mogelijk doorgeven aan het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. (tel. 043 - 13671).

- 3.) Meldingen van invasies.

Indien men daar prijs op stelt wordt bij broedgeval-len (van bedreigde of minder voorkomende vogel-soorten) geheimhouding verzekerd!!!