

AANKONDIGING VAN DE MAANDVERGADERINGEN

te Heerlen zal de eerste maandelijks vergadering van het jaar worden gehouden op dinsdag 9 januari (2e dinsdag) om 19.30 uur in het Grotius college; de heer W. F. Bult zal dia's vertonen van het gebied rond de Neusiedler See in Oostenrijk.

te Maastricht zal de eerste vergadering van 1973 worden gehouden op donderdag 11 januari (dus niet 4 januari) in het Natuurhistorisch Museum om 20.00 uur.

van 20.00 - 20.30 uur:

Algemene ledenvergadering

Agenda:

Verkiezing van nieuw bestuurslid.

Ter voorziening in de vacature van de aftredende penningmeester de heer P. Wassenberg draagt het bestuur voor de heer J. G. H. Schoenmaeckers, Johan Frisostraat 4, Cadier & Keer.

Van 20.30 uur af wordt overgegaan tot de normale mededelingen van de leden en wat verder ter tafel wordt gebracht.

DE NATUUR IN

Programma natuurwandelingen IVN Limburg

Zondag 14 jan. *Wandeling in omgeving stuwmeer van Eupen (B.), o.l.v. IVN-Bocholtz. Opgave en inlichtingen dhr. Schoonbrood, Julianastraat 7a, Bocholtz. Buskosten f. 7,—. Vertrek Kerkhof Bocholtz om 9.30 uur (lunch en pas meenemen).

*Sneeuwwandeling omgeving Ovifat, o.l.v. IVN-Maastricht. Opgeven tel. 30837 en 32760. Buskosten f. 6,50 leden, f. 7,50 niet-leden, overmaken op giro-rekening 2405239 t.n.v. penningmeester van IVN-Maastricht. De bus vertrekt om 8.30 uur Emma-plein, 8.35 uur Hubertuslaan/kazerne, 8.45 uur bij station/boekenhal, 8.50 uur Kruispunt Heer.

VERSLAGEN VAN DE MAANDVERGADERINGEN

te Heerlen op 7 november 1972

Ir van Geel vertoont een galmijt (*Phytophtus tiliae*) op de Kleine linde, verder een Hoge stuifzwam (*Lycoperdon exhaliformis*).

Mej. Sterken laat een versteende slak zien, namelijk *Natica acutimargo* Roemer, gevonden in de grind-zandgroeve Borger op de Brunssummerheide. De heer Giessen heeft o.a. Struikweegbree (*Plantago cynops*) meegenomen welke hij vond langs de Maas. Daarna bespreekt de heer van Geel de Alpenflora en begint zijn wandeling op de boomgrens, de bomen die er nog voorkomen zijn reeds ten dele afgestorven. Het verst naar boven groeit nog de *Larix*. Nog iets verder naar boven, op de Alm, treft men nog wel heesters aan, waarvan de groei meer horizontaal dan in de hoogte is gericht. Wordt zo'n struikje in het lage land overgebracht, dan behoudt het deze horizontale groei, hetgeen bewijst dat de dikke sneeuwlaag gedurende de winter deze groeiwijze niet veroorzaakt heeft. In de Alm staan talrijke bloemen, de planten zijn meestal van zeer geringe afmetingen. Merkwaardig is dat tegelijkertijd soorten bloeien die wij voorjaarsplanten zouden noemen en soorten die verwanten hebben die bij ons in de herfst bloeien. Dit is te verklaren door het feit dat de zomer zeer kort is en alles vrijwel tegelijk gaat bloeien. Vervolgens begeleidt de spreker het gezelschap terug naar beneden, naar het bos. Er komt veel naalddhout voor met zijn typische begroeiing o.a. *Goodyera repens* (Dennenorchis). Op vochtige plaatsen is *Leucorchis alba*, (Witte muggenorchis) te vinden, een soort die vroeger bij Vaals voorkwam en nu nog in de Eifel niet zo erg ver van Vaals te vinden is. Ook *Epipactis palustris* (Moeraswespenorchis) en *Cephalanthera* (Bosvogeltje) soorten, komen er voor. Daarna daalt spr. nog verder bergafwaarts en betreedt de Matten (men heeft er voor ieder soort grasland een aparte naam). De soorten in dit grasland zijn wel bekend uit de verschillende geïllustreerde flora's. Dit gedeelte zou,