

moeten nog onderzocht worden. Het spreekt wel vanzelf dat er verschillende soorten een rol spelen in het zoetwaterleven.

Nog zou ik hier op de toegankelijkheid van de Doort kunnen wijzen, op de wenselijkheid van maatregelen die beogen het gebied te beschermen tegen auto's, motor- en bromfietsen die de weggetjes en paden stukrijden of gedeelten van het bos vernielen; tegen rustverstorende transistors, tegen jagers (!) en stropers die op alles schieten wat haar of veer heeft; op de noodzaak van meer toezicht, enz. Het allerbelangrijkste is dat het mooie en uitzonderlijke landschap van de Doort en omgeving in één hand, in één beheer komt. Stappen worden daartoe momenteel gedaan. Mogen ze spoedig succes hebben.

Literatuur:

1. V. Westhoff, J. W. Dijk, H. Passchier — Overzicht der Plantengemeenschappen in Nederland, 's Gravenland 1942.
- J. Meltzer en V. Westhoff — Inleiding tot de plantensociologie, 's Gravenland 1942.
- Dr. Ir. H. Diemont — Zuidlimburgse Boschgezelschappen N.H.M. 33 : 31-35 Maastricht 1944.
2. R. Geurts — Bossen in Midden-Limburg N.H.M. 36 : 25, 26 1947.
Bossen in Midden-Limburg. De Doort. N.H.M. 44 : 31-34, 1955.
3. R. Geurts — Zweefvliegen van de Doort. N.H.M. 50 : 98-100, 1961.
4. R. Geurts — Syrphidae uit Midden-Limburg. N.H.M. 50 : 122, 123, 1961.
5. J. G. Meuffels en W. Maassen — Vangsten van minder algemene Diptera in Limburg. N.H.M. 54 : 78-80, 1965.

Verder nog Br. Theowald over Diptera, gevangen in de Doort (N.H.M.) en opgave van vangsten in de Doort door Dr. v.d. Goot en J. Lucas in diverse jaarg. van Entomologische Berichten.

INTERESSANTE FUNGI UIT DE DOORT

door

C. Ph. VERSCHUEREN, Roermond

Cortinarius Myrtilinus Fr. ss Quélet-Bataille
De meest opvallende soort in de Doort, vaak in bundels groeiend en in gunstige jaren talrijk. In jeugdtoestand is de hele paddestoel grijsig violet. Schijnt alleen voor te komen op zware klei-ige grond.

Cortinarius Ochroleucus Schaeff
Slechts enkele malen gevonden. Valt op door zijn lichtkleurige hoed en bittere smaak.

Clitocybe Geotropa Bull
Groeit in het oostelijk deel van het bos, vaak in grote kringen. Deze trechterzwam kenmerkt zich door zijn bijna witte kleur en grote afmetingen (hoeddiameter tot 25 cm).

Collybia Rancida Fr.
Donkere soort, gekenmerkt door zijn ranzige lucht.

Rhodophyllus (Entoloma) Porphyrophaeus Fr.

Deze fraaie bruinig violette paddestoel met zijn — op het laatst — rose lamellen groeit in een weide grenzend aan het bos.

In tegenstelling tot deze vertegenwoordigers met vrij forse afmetingen kan men soorten noteren met een hoeddiameter van hoogstens één cm.:

Phaeomarasmium Siparius (Fr.) Sing.
met fijn schubbig bruinrood hoedje

Rhodophyllus Molluscus (Lasch ex Quel.) Romagn

met zijn sneeuwhoedje, een van de kleinste rose spoorders uit dit uitgebreide geslacht.

Op de kale bodem van de leemputten is vanaf april tot laat in het seizoen te vinden:

Omphalina Rickenii Hora
een klein grijsbruin paddestoeltje. Groeit vaak in een vegetatie van het pioniersmosje *Bryum bicolor*.

Langs de randen van de leemputten is sporadisch aan te treffen:

Agrocybe (Naucoria) Arvalis Fr.
bekend om zijn vingervormige cystiden.

Op sterk vermolmd hout is enkele malen gevonden:

Pluteus Umbrosus Fr.
Heeft een opvallend donkerharig hoedje en een donkervlokkige lamellenrand.

Om te besluiten nog enkele zeldzaamheden, die niet tot de bovengenoemde plaatjeszwammen behoren:

Thelephora Atrocitrina Quél

Thelephora Anthrocephala Bull

en de fraai violetkleurige resupinate:

Helicobasidium Purpureum (Tul.) Pat.
de allerzeldzaamste.