

Deze kever heeft dus ten opzichte van bijen niets wolfachtigs. Hij jaagt wel kleinere insecten achterna, terwijl de schade in de bijenstallen beperkt blijft tot niet verzorgde en vervuilde kasten.

Ook heeft Br. Arnoud een aanvulling op zijn waarnemingen aan de eihoopjes van *Sialis lutaria*. Een ervan was op een ochtend bedekt met okerkleurige larfjes, die zich niet direct in het water lieten vallen, maar zich aan elkaar en aan het nest door middel van fijne spinseldraden vasthielden, hierbij gesteund door hun lange beharing. Wanneer zo'n larfje in het water viel, bleef het daar even met uitgestrekte poten liggen, en begon dan zonder meer aan zwembewegingen. Een ander eihoopje was bedekt met donkergrauwe diertjes, met rode oogjes; kennelijk parasieten, wespen, waarbij de legboor van de wijfjes vóór het einde van het achterlijf stond ingeplant, en waarvan de voorvleugels maar één ader bezaten. De achtervleugels waren geveerd. Br. Arnoud meent deze wespjes tot de Chalcididae, Bronswespen te moeten rekenen.

De heer Bult geeft een overzicht van eerste waarnemingsdata van terugkerende trekvogels in 1966, hem verstrekt door J. Bais, H. Bult, J. Coonen, W. de Veen en R. Goldbach. In de tabel staan tussen haakjes de hem bekende normale data.

Boomleeuwerik, 22-II, Heerlen; Tjiftjaf, 1-III, (8/20-III), Heerlen; Roodborsttapuit, 5-III, Heerlen; Zwartkoptuinfluit, 20-III, (10/15-IV), Heerlen; Boerenzwaluw, 28-III, (15/25-III), Hoensbroek; Zwarte roodstaart, 28-III, Heerlen; Kleine plevier, 1-IV, (15/30-III), Heerlen; Gele kwikstaart, 1-IV, (15/20-III), Heerlen; Fitis, 2-IV, (15/28-III), Hoensbroek; Boompieper, 5-IV, Heerlen; Gekraagde roodstaart, 9-IV, (20/25-III), Strabrecht; Snor, 9-IV, Strabrecht; Rietzanger, 9-IV, (5/10-IV), Strabrecht; Visdief, 10-IV, (1/4-IV), Ospel; Sprinkhaanrietzanger, 11-IV, (10/20-IV), Ospel; Grasmus, 16-IV, (10/20-IV), Heerlen; Koekoek, 17-IV, (5/10-IV), Schinnen; Tapuit, 19-IV, (10/15-III), Hoensbroek; Braamsluiper, 21-IV, (10/20-IV), Heerlen; Nachtegaal, 22-IV, (6/12-IV), Schinnen; Gierzwaluw, 22-IV, (15/20-IV), Hoensbroek; Tortelduif, 22-IV, (18/25-IV), Brunssum; Tuinfluit, 23-IV, (10/

20-IV), Heerlen; Huiszwaluw, 23-IV, Heerlen; Grauwe vliegenvanger, 29-IV, (15/25-IV), Schaesberg; Paapje, 30-IV, Ospel; Wielewaal, 1-V, (24/29-IV), Heerlen; Kleine karekiet, 7-V, (18/25-IV), Hoensbroek; Grote karekiet, 8-V, (24/26-IV), Heythuysen; Spotvogel, 13-V, (24/30-IV), Schinnen; Bosrietzanger, 14-V, Schinnen.

Een Draaihals verbleef op 2-V een dag in een tuin te Terwinselen (J. Bais). Een Kwak werd op 7 en 14-V waargenomen te Hoensbroek (W. de Veen). Twee Ortolanen waren op 15-V aan het zingen te Koningsbosch. In de Grote Moost werd op 15-V een visarend gezien. Een Zwarte wouw cirkelde op 19-V boven de Brunssummerheide en trok later weg in Z.Z.O.-richting. Aan een plas te Heerlen bij „De Vrank” werden op 7-V twee groenpootruiters gezien en vier Bosruiters (alle laatste waarnemingen H. Bult & R. Goldbach). Reeds meer dan een week verblijft in Maria-veen een paar steltkluten. De dieren zullen hier zeker gaan broeden.

De heren Bult & Coonen zagen hoe een mannetje Grauwe vliegenvanger op zijn vaste vliegroute naar en van het nest om daar zijn jongen te voeren over een afstand van meer dan 200 m werd vergezeld door een groepje zingende en scheldende kleine zangertjes, waaronder fitis. Dit gedrag is te begrijpen als men bedenkt, dat deze zangvogel met roofvogel-allures niet alleen insecten op zijn menu heeft staan, maar ook hagedissen en jonge vogels!

NEDERLANDS-VLAAMSE WERKWEEK VOOR NATUURONDERZOEKERS

van 9-18 augustus in het Europa-huis te Borgharen

In deze twee weken zal diep worden ingegaan op verschillende thema's. Het zal dus slechts voor de echte natuurvrienden interessant zijn aan de cursus deel te nemen. De wetenschappelijke leiding berust bij Dr. P. J. van Nieuwenhoven, de algemene leiding heeft Dr. H. J. G. Waltmans. Minimumleeftijd 21 jaar. Maximaal aantal deelnemers 40.

Kosten f 110,— per persoon, inclusief excursies. Inlichtingen bij het Europa-huis te Borgharen.