

DE NATUUR IN

Herfstverschijnselen kunnen worden bestudeerd onder leiding van de heer E. J. C. B u d d e n b e r g in het staatsnatuurreservaat Savelsbos op zaterdag 7 november 1964. Samenkomst in het bezoekerscentrum van het Staatsbosbeheer te Moerslag 14, aan de weg van Eijdsen naar St Geertruid, om 15.00 uur..

Afdeling Heerlen van het I.V.N. trekt op 8 november per bus naar de Helle in de Ardennen. Vertrek om 9.00 uur vanaf theater Royal te Heerlen. Opgave vóór 1 november. Kosten f 6,00, storten op girorekening 1062548 t.n.v. T a s m a, Heerlen.

De Vrienden der Natuur te Weert bezoeken op 14 november de „Advokaat”. Zij verzamelen aan sluis Nr 16, om 14.00 uur.

Het Natuurhistorisch Genootschap bezoekt op 22 november de Bemelerberg. De wandeling begint bij het station Houthem om 14.30 uur.

De Vrienden der Natuur te Weert gaan naar de Tungelroyse heide op 22 november, en vertrekken bij het viaduct maaseikerweg om 14.00 uur; om 14.30 uur zijn zij bij het Ambonzenenkamp.

Op zaterdag 12 en zondag 13 december kan men een bezoek brengen aan een grot in het Geuldal onder leiding van Dr. v a n N i e u w e n h o v e n. Op beide data verzamelt men zich te Sibbe, bij de gemeentegrot om 14.30 uur. Men zorgte voor verlichting (zaklantaarn).

VERSLAGEN

VAN DE MAANDVERGADERINGEN

te Maastricht op woensdag 7 oktober 1964

De heer Poot toont soorten van het geslacht *Cionus*, behorende tot de snuitkevers. Het zijn 3 à 4 mm grote kevertjes met tamelijk brede dekschilden en een relatief klein driehoekig halsschild. Bij het vliegen staan de dekschilden loodrecht omhoog. Zij worden aangetroffen op *Verbascum*- en *Scrophularia*-soorten. Wanneer zij van deze planten worden afgeklopt, houden zij zich dood, waarbij poten en snuit ingetrokken worden, zodat zij veel op verdroogde bloembladeren lijken.

De meeste soorten bezitten midden op de

naad van de dekschilden een kleinere of grotere fluweelzwarte vlek. Zij knagen aan de bladeren van genoemde planten, of mineren deze als ze nog larve zijn. De larven scheiden een slijmachtige omhulling af. Deze afscheiding wordt ook gebruikt voor het vervaardigen van de tonvormige cocon, waarin de verpopping plaats heeft. Deze cocons zitten tussen de bloemen of aan de bladeren, en vallen daar zeer weinig op.

Het gemakkelijkst maakt men kennis met *Cionus tuberculatus* en *C. scrophulariae*, die men praktisch op elke helmkruidplant kan aantreffen. *C. alauda* werd gevonden op helmkruidplanten van kaalgekapte bospercelen, vaak samen met *C. pulchellus*, maar beide soorten steeds in gering aantal. *C. hortulanus* is ook wat minder algemeen en komt voornamelijk voor op *Scrophularia nodosa*. De zeldzaamste soort is echter *C. olens*, die tot dit jaar in Nederland slechts in één exemplaar gevonden was te Gronsveld op een toortsplant, zo'n dertig jaar geleden. Door de heer Poot werd de soort gevonden op een zuidhelling bij Valkenburg, waar de kevertjes zich bevonden tussen de bladeren van eenjarige bladrozetten van toortsplanten. De eerste keer werden daar acht kevers gevonden, maar een paar dagen later geen enkele meer. Daarna weer eens twee, en tenslotte nog eens vijf. Een der laatste keren trof hij aan de voet van de hoofdnerf tussen twee bladlagen een coconnetje aan. Na enig zoeken vond hij er nog enkele, die hij op goed geluk meenam. Na enkele dagen kwamen hier de kevers uit: *C. olens*! totaal zes exemplaren. De *Verbascum*-soort bleek *V. thapsus* te zijn.

De heer Kemp nam op 12 september 1964 bij het grindgat te Itteren een krombekstrandloper waar, *Calidris ferruginea*. Tijdens de vlucht was de witte stuit duidelijk te zien. Op 20 september waren ten noorden van Stevensweert nog drie zwarte sterns, *Chlidonias niger*. Ook de heer Stevens zag eind september nog een zwarte stern aan de Maas te Eysden-Oost.

De heer Bouchoms toont vruchten van de Pimpernoot, *Staphylea spec.* De harde zaden van deze plant worden wel gebruikt voor het maken van rozenkransen. Naar aanleiding van vondsten van planten tijdens de excursie naar Comblain au Pont gedaan door de heer Hensels, o.a. *Cotoneaster integerrima*, de bloedrode dwergmispel, en *Euphorbia lathyris*, de kruis-