



Buizerd

Foto E. van Campen

genomen. Van op andere plaatsen voor buizerden neergelegd slachtafval was wel gegeten, maar door welk dier is niet bekend. De laatste keer wachtten wij tevergeefs op de buizerd. Zou het voor deze dieren niet zo moeilijk zijn voedsel te vinden, nu de strenge winter steeds meer slachtoffers maakt? Wel zagen wij hoe een groene specht zich langzaam uit een boom omhoog liet zakken en enige decimeters van de stam met opgezette veren en een weinig uitstaande vleugels als verstand bleef zitten. Wij hebben dit dier niet meer kunnen redden. Zijn gewicht bedroeg nog maar 150 g., terwijl dit normaal 185-210 g bedraagt. Het was een mannetje, gezien de rode middenpartij van de zwarte baardstreep. Het hele vertrek waar het kadaver gelegen had, rook naar mierenzuur. Geprepareerde spechten behouden deze geur nog jaren lang. Tijdens zijn bezoeken aan mieren nesten wordt het dier dan ook rijkelijk met mierenzuur besproeid. Sielmann schrijft in zijn boek „Een jaar tussen de spechten” dat de tong van de groene specht niet van weerhaakjes is voorzien zoals bij andere soorten het geval is. Het is bij dit exemplaar opgevallen, dat de punt van de tong aan beide zijden bezet was met een rijtje van zes stijve borstelharen.

ADVENTIEVEN LANGS DE MAAS IN LIMBURG IV

door

S. J. van OOSTSTROOM & Th. J. REICHGELT
(Rijksherbarium, Leiden)

In 1962 bezochten wij op 28 en 29 september wederom de grintgroeven aan de Maas bij Grevenbicht en bij Itteren in verband met ons onderzoek van de Nederlandse adventief-flora. Verschillende van de reeds vroeger in dit Maandblad (I in Natuurhist. Maandbl. 47, no. 5-6, 1958, p. 67-70, met aanvulling in id. 48, no. 7-8, 1959, p. 89; II in id. 49, no. 1-2, 1960, p. 19-22; III in id. 51, no. 7-8, 1962, p. 115-116) vermelde soorten werden weer aangetroffen. In het hieronder volgende lijstje geven wij een overzicht van de voor Grevenbicht resp. Itteren nieuwe vondsten.

Vindplaatsen:

1. Grintgroeve aan de Maas ten ZW. van Grevenbicht, 28 sept. 1962.
2. Grintgroeve aan de Maas ten N. van Itteren, 29 sept. 1962.

Polygonaceae.

Rumex dentatus L. (1).

Amaranthaceae.

Amaranthus thunbergii Moq. (2).

Cruciferae.

Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Fossat (1, 2).

Solanaceae.

Nicandra physalodes (L.) Gaertn. (1).

Solanum nigrum L. var. *atriplicifolium* (Desp.)
G. Mey. (1).

Compositae.

Picris echioides L. (2).

Gramineae.

Hordeum marinum Huds. subsp. *marinum* (2).