




DE BOMEN

In een park kan men de bomen niet laten groeien zoals zij willen. Zijtakken die te laag zitten moeten worden weggenomen. Door dit snoeien ontstaat de lange stam. Meestal worden de jonge bomen pas uitgeplant wanneer op de kwekerij de hoge stam al is gevormd.

Door het telkens afkappen van de stam en de takken op een bepaalde hoogte boven de grond ontstaan „knot-bomen”. De meest bekende zijn de knotwilgen, en ook de bolacacia's. Langs de Jeker vind je een paar „schietschiet-wilgen” als bewijs, dat wilgen tot hoge bomen kunnen uitgroeien.

In een park komt natuurlijk een groot aantal boompjes op uit zaad. Op de gazons worden zij door de maaimachine al gauw afgesneden, zodat zij dood gaan. In de perken worden zij uitgerukt of ondergespit. Daarom krijgt deze „opslag” alleen kans in verloren hoekjes, maar ook wel eens hoog op de muur, omdat de meeste boomzaden door de wind worden verspreid. Het is een mooi gezicht, zo'n boom die in de muur groeit, maar het is voor de muur heel slecht: de boomwortels wringen de stenen uit elkaar. Het is bovendien niet juist dat er bomen op of tegen een vestingmuur groeien! Waarom niet, denk je?

Er zijn ook bomen en struiken die door vogels worden verspreid. Dit zijn de soorten met opvallend gekleurde vruchten, die vol sap zitten, en lekker smaken. De vogels zijn er verlekkerd op. Het zachte vruchtvlees verteert snel, maar de harde pitten niet. Daardoor werpen de vogels deze zaden onbeschadigd uit. Besdragende heesters vind je dan ook veel onder bomen, waarin veel vogels slapen. In de parken zijn dit meestal naaldbomen. Zoek eronder naar jonge vlier of naar lijsterbes. Enkele erg hoge vlierbomen staan langs het water van de Jeker. Misschien zijn de vogels al van de bessen aan het smullen, wanneer je er langs komt. Let er dan op, welke vogels dit zijn.

DE DIERENWERELD VAN HET PARK

Onze parken worden alleen bewoond door dieren die de nabijheid van de mens kunnen verdragen. Er leven eekhoorntjes in de bomen. Soms wagen zij zich op de grond, wanneer zij op zoek gaan naar beukenootjes en andere lekkere hapjes. Als je ze verjaagt klauteren zij razend snel tegen de stam van een boom op. Ook kun je ze zien springen, van de ene boomtak naar de andere: daarbij spreiden zij hun staart uit om de lengte van hun sprong te vergroten.

Op de grond komen konijntjes voor, waar zij wel eens schade veroorzaken door het kaalvreten van de bloemperken. Er is zelfs eens een troepje wilde zwijnen in het plantsoen langs de Jeker verzeild geraakt. Het vrouwtje en vijf biggen konden worden geschoten; het mannetje wist te ontkomen. Van deze jachtpartij getuigt de steen in de muur boven het Nieuwenhofpoortje. Kun je uittellen in welk jaar dit is gebeurd? Daarvoor moet je alle Romeinse cijfers bij elkaar tellen, die op de steen zijn uitgebeiteld.

Het merendeel van de wilde parkbewoners bestaat uit vogels. Merel en zanglijster zijn overbekend, en ook de manier waarop zij op de gazons op jacht zijn naar regenwormen. Vaak zie je er ook spreeuwen, die het meer gemunt hebben op de in de grond levende insecten. Om die te kunnen pakken gebruiken zij hun snavel als de punten van een schaar. In de voorzomer verdelen zij veel rupsen, die zij in de bomen zoeken.

De meeste watervogels zijn uitgezet door de Stichting Dierenpark, die zelf voortgekomen is uit de Vereniging Stadsverfraaiing. Op het rondeel Haet ende Nijd zit nog een naambordje van deze vereniging. Ook het hertenkamp en de berenkuil worden door de Stichting Dierenpark verzorgd. Lang niet in elk hertenkamp worden jaarlijks jonge edelherten geboren. Daar mogen wij hier in Maastricht echt wel een beetje trots op zijn!



DE VLINDERS VAN MONTFORT

door A. W. P. Maassen

Vanaf 1956 heb ik me bezig gehouden met de inventarisatie van de vlinderfauna van mijn woonplaats en onmiddellijke omgeving. Het resultaat is een respectabele lijst van 503 soorten, meer dan de helft van de in ons land waargenomen Macrolepidoptera. Toch zal deze lijst niet compleet zijn; vooral de spanners, waaraan ik de eerste jaren weinig aandacht besteedde, zullen nog wel wat nieuwe soorten opleveren.

De totale oppervlakte van de gemeente Montfort bedraagt ± 993 ha, waarvan ± 691 ha cultuurgrond en ± 243 ha bos en „woeste grond” (heide, moeras, riet). De zandheuveld rondom het dorp, o.a. Sweeltje en Galgenberg, waren tot in de tweede helft van de vorige eeuw begroeid met struikheide, brem en wat armtierig hakhout. De dorpelingen haalden er heiplaggen en lover om te gebruiken als strooisel in de stal. In de tweede helft van de vorige eeuw werden deze heuvels bebost met in hoofdzaak grove den (± 123 ha.). Aan heide bleef niet veel meer over, momenteel nog slechts 2 ha.

In de vorige eeuw lag Montfort ingesloten in uitgestrekte moerassen met gevaarlijke vennen en plassen, waarop de visvangst werd uitgeoefend. Nog omstreeks 1900 kon men de kwalijk riekende moerasdampen ruiken wanneer men het dorp naderde. Moeraskoortsen kwamen toen nog veelvuldig voor. Men had voor deze ziekte zelfs een aparte naam „het Kaai”. (kaai = kou).

Tot op 't eind van de vorige eeuw werd er te Montfort turf gestoken! Omstreeks 1880 werd met ontwatering en ontginning van moerassen en vennen begonnen. Men kan zich nu nauwelijks voorstellen hoe het eens geweest moet zijn! Alleen een aantal namen, Paardebroek, Reigersbroek, Grootbroek, 't Vin (= ven). Op de Koele e.a. herinneren ons aan de oorspronkelijke toestanden. Gelukkig bleven enkele plekjes in vrijwel de oude staat bewaard, waar een aantal moerassoorten zich konden handhaven. In een enkel vennetje, dat helaas met gemeentelijk vuil wordt dichtgestort, groeit nog steeds de witte waterlelie. Een ander heerlijk moerassig elzenbosje, met prachtige rietzomen, waar ik reeds diverse zeldzame soorten ving (o.a. *Pelusia obtusa*, 1e

vindplaats in onze provincie) wordt door de onlangs sterk verbeterde afwatering jammer genoeg steeds droger. Van de eertijds zo uitgestrekte moerassen is nauwelijks 1,5 ha over.

De slechte broekgraslanden (niet slecht voor de entomoloog!) zijn enkele jaren geleden gedraineerd, gescheurd en opnieuw ingezaaid met prima weide-grassen, natuurlijk niet gunstig voor de entomofauna.

Op de hoger gelegen zandgronden vindt men nog al wat bosjes met kreupelhout, z.g. „slaaghout”, vooral bestaande uit eik en berk. Dit „slaaghout” werd geregeld gekapt om er „schansen” van te binden, waarmee de „bakoven” gestookt werd. De laatste jaren zijn veel van deze kreupelbosjes gerooid en ontgonnen.

Aan loofhout en gemengd bos bezit Montfort momenteel nog 116 ha. Langs de wegen staat veel aangeplant: populier, linde, inlandse en am. eik, tamme en wilde kastanje, esdoorn e.a. Een van de mooiste Midden-Limburgse loofbossen, 't Munnicksbosch, vormt met de Montfortse bossen practisch één geheel, kadastraal ligt het grotendeels in de gemeenten Odiliëberg en Posterholt.

Beuk en eik overheersen in het bos; vooral een aantal eeuwenoude beuken met een omtrek van meerdere meters, als ook de machtige den-nen dwingen ieders bewondering af. Als onderhout noem ik: hazelaar, vuilboom, sleedoorn, kamperfoelie, braam ratelpopulier, lijsterbes, bosbes, adelaarsvaren enz. Onder het kreupelhout en langs de lanen allerlei kruiden welke voor een dergelijk bos typerend zijn. De hogere delen zijn begroeid met grove den, met een weelderige ondergroei van bosbes, braam en adelaarsvaren; langs de brandwegen heide en brem. Wanneer de bosbessen rijp zijn komt men van heinde en verre naar de „Warbele-bos” om de kleine blauwe bessen, „warbele”, te plukken.

Alle bekende vangmethoden werden toegepast: kloppen, het afzoeken van boomstammen, smeren, rupsen zoeken, de oppomplamp (weinig) en natuurlijk hetmeest de M.L.-lamp.

De mate van voorkomen heb ik als volgt aangegeven: zeldzaam practisch elk jaar gevangen, maar slechts in enkele exempl.; vrij gewoon van 5 tot 15 exempl. per jaar; gewoon meer dan 15 exempl. per jaar; in twijfelgevallen is het juiste aantal gevangen dieren opgegeven.

Summary

A list of the Macrolepidoptera taken at Montfort, a little village in the centre of the province of Dutch Limburg.

LIJST
VAN WAARGENOMEN MACROLEPIDOPTERA

Hesperiidae. — *Carterocephalus palaemon* Palas, niet zelf gevangen, doch in Lempke's Catalogus vermeld van Munniksbosch; *Thymelicus lineola* O. gewoon; *T. sylvestris* Poda gewoon; *Hesperia comma* L. zeldzaam, reeds enkele jaren niet meer waargenomen; *Ochlodes venatus* Bremer et Grey gewoon.

Papilionidae. — *Papilio machaon* L. vrij gewoon, de laatste jaren zeldzamer.

Pieridae. — *Leptidea sinapis* L. éénmaal in 1956; *Anthocaris cardamines* L. vrij gewoon; *Pontia daplidice* L. éénmaal in 1960; *Pieris napi* L., *P. rapae* L. en *P. brassicae* L. gewoon; *Colias hyale* L. en *C. crocea* Fourcroy afhankelijk van goede trekkersjaren; *Gonepteryx rhamni* L. gewoon.

Lycaenidae. — *Heodes tityrus* Poda vrij gewoon; *Lycaena phlaeas* L. gewoon; *Celastrina argiolus* L. gewoon; *Plebejus argus* L. vrij gewoon; *Aricia agestis* Schiff. zeldzaam; *Polyommatus icarus* von Rott. gewoon; *Strymonidia ilicis* Esper gewoon; *Callophrys rubi* L. gewoon; *Quercusia quercus* L. zeldzaam.

Nymphalidae. — *Limenitis camilla* L. zeldzaam; *Malliceta athalia* von Rott. gewoon; *Issoria lathonia* L. in de meeste jaren zeldzaam, soms gewoon (1952); *Argynnis paphia* L. niet zelf gevangen, in Lempke's Cat. vermeld van Munniksbosch; *Araschnia levana* L. (en f. prorsa L.) enkele jaren geleden nog gewoon, momenteel zeldzaam; *Vanessa cardui* L. in sommige jaren gewoon; *V. atalanta* L. gewoon; *Polygonia c. album* L. gewoon; *Aglais urticae* L. gewoon; *Nymphalis antiopa* L. zeldzaam; *N. polychloros* L. vrij gewoon; *N. io* L. gewoon.

Satyridae. — *Pararge aegeria* L. gewoon; *Lasiomata megera* L. gewoon; *Hipparchia semele* L. gewoon; *Aphantopus hyperantus* L. gewoon; *Maniola jurtina* L. gewoon; *Pyronia tithonus* L. vrij gewoon; *Coenonympha pamphilus* L. gewoon.

Sphingidae. — *Acherontia atropos* L. in totaal vier exemplaren; *Herse convolvuli* L. tweemaal de vlinder en enkele rupsen; *Sphinx ligustri* L. één rups in 1960 en één vlinder in 1961, vóór 1956 vooral als rups zeer gewoon!; *Hyloicus pinastri* L. vrij gewoon; *Mimas tiliae* L. gewoon; *Smerinthus ocellata* L. vrij gewoon; *Laethoë populi* L. gewoon, de meest voorkomende Sphingide; *Hemaris fuciformis* L. zeldzaam; *Macroglossum stellatarum* L. afhankelijk van goede trekkersjaren; *Celerio galii* von Rott. tweemaal; *Deilephila elpenor* L. gewoon; *D. porcellus* L. viermaal gevangen.

Notodontidae. — *Harpyta furcula* Clerck gewoon; *H. bifida* Brahm gewoon; *Cerura vinula* L. vrij gewoon; *Stauropus fagi* L. eenmaal in 1962; *Hoplitis milhauseri* F. vrij gewoon; *Gluphisia crenata* Esper vrij gewoon; *Drymonia querna* F. vrij gewoon; *D. dodonaea* Schiff. zeldzaam; *D. chaonia* Hübner gewoon; *Pheosia*

tremula Cl. gewoon; *P. gnoma* F. gewoon; *Notodonta dromedarius* L. gewoon; *N. ziczac* L. gewoon; *N. phoebe* Siebert gewoon; *Peridea anceps* Goeze vrij gewoon, de laatste jaren minder; *Ochrostigma velitaris* Hufn. éénmaal in 1959; *Lophopteryx capucina* L. gewoon; *Pterostoma palpina* L. gewoon; *Phalera bucephala* L. gewoon; *Clostera anachoreta* Schiff. zeldzaam; *C. curtulia* L. gewoon; *C. pigra* Hufn. gewoon.

Lymantriidae. — *Olene fascelina* L. zeldzaam; *Dasychira pudibunda* L. gewoon; *Orgyia antiqua* L. gewoon; *Leucoma salicis* L. in de meeste jaren gewoon; *Lymantria dispar* L. gewoon; *L. monacha* L. één exemplaar in 1960; *Euproctis similis* Fuessly vrij gewoon; *E. chrysorrhoea* L. gewoon.

Lasiocampidae. — *Trichiura crataegi* L. zeldzaam; *Malacosoma neustria* L. gewoon; *Lasiocampa trifolii* Schiff. gewoon; *L. quercus* L. gewoon; *Macrothylacia rubi* L. gewoon; *Dendrolimus pini* L. tweemaal; *Philudoria potatoria* L. vrij gewoon; *Epicnaptera tremulifolia* Hübner 2 ex. in 1960 en 1 ex. in 1961; *Gastropacha quercifolia* L. vrij gewoon; *G. populifolia* L. zeldzaam, hoogste aantal per jaar 6, in 1961; *Odonestis pruni* L. vrij gewoon.

Endromididae. — *Endromis versicolora* L. één ex. in 1958 en één ex. in 1960.

Saturniidae. — *Saturnia pavonia* L. gewoon.

Drepanidae. — *Drepana falcatoria* L. gewoon; *D. lacertinaria* L. gewoon; *D. binaria* Hufn. gewoon; *D. cultraria* F. vrij gewoon; *Cilix glaucata* Scop. gewoon.

Thyatiridae. — *Habrosyne pyritoides* Hufn. gewoon; *Thyatira batis* L. gewoon; *Tethea fluctuosa* Hb. 1 ex. in 1962; *T. duplaris* L. vrij gewoon; *T. or* Schiff. gewoon; *T. ocularis* L. gewoon; *Achlya flavicornis* L. gewoon.

Amatidae. — *Amata phegea* L. gewoon.

Nolidae. — *Nola cucullatella* L. vrij gewoon; *Roeselia albula* Schiff. vrij gewoon; *Celama aerugula* Hübner. éénmaal in 1962.

Endrosidae. — *Setina irrorella* Cl. vrij gewoon.

Arctiidae. — *Miltchrista miniata* Forster zeldzaam; *Cybosis mesomella* L. gewoon; *Lithosia deplana* Esper, vrij gewoon; *L. complana* L. gewoon; *L. griseola* Hb. gewoon; *L. sororcula* Hufn. zeldzaam; *Pelosis muscerda* Hufn. gewoon; *P. obtusa* Herrich-Schäffer in 1960 en 1961 telkens één exemplaar; *Atolmis rubricollis* L. gewoon; *Coscinia cribraria* L. zeldzaam; *Phragmatobia fuliginosa* L. gewoon; *Spiloscona lutea* Hufn. vrij gewoon; *S. lubricipeda* L. gewoon; *S. urticae* Esper vrij gewoon; *Cynia mendica* Cl. gewoon; *Arctia caja* L. gewoon; *Tyria jacobaeae* L. vrij gewoon.

Zygaenidae. — *Zygaena trifolii* Esper gewoon; *Procris statice* L. vrij gewoon.

Cochlidiidae. — *Apoda limacodes* Hufn. gewoon.

Psychidae. — *Canephora unicolor* Hufn. één zak in 1960, die een mannetje opleverde; *Sterrhopteryx fusca* Haworth gewoon; *Epichnopteryx pulla* Esper enkele zakjes; *Psyche casta* Pallas gewoon; *Bacotia sepium* Speyer gewoon; *Proutia betulina* Zeller vrij gewoon; *Taleporia tubulosa* Retzius gewoon; *Solenobia triquetrella* Hübner. vrij gewoon.

Sesiidae. — *Sesia apiformis* Cl. gewoon; *Aegeria*

tipuliformis Cl. gewoon; *A. myopaeformis* Borkh. in 1960, 1961 en 1962 telkens één exemplaar.

Cossidae. — *Cossus cossus* L. zeldzaam; *Zeuzera pyrina* L. zeldzaam.

Hepialidae. — *Hepialus humuli* L. 1 ex.; *Triodia sylvina* L. en *Phimatopus hecta* L. gewoon.

Agrotidae. — *Panthea coenobita* Esp. één ex. in 1957; *Colocasia coryli* L. gewoon; *Simyra albovenosa* Goeze gewoon; *Apatele rumicis* L., *A. psi* L., *A. tridens* Schiff., *A. aceris* L., *A. megacephala* F. en *A. leporina* L. alle gewoon; *A. auricoma* F. zeldzaam; *Cryphia raptricula* Hb. enkele malen; *Moma alpium* Osb. éénmaal in 1961; *Euxoa obelisca* Schiff. zeldzaam; *E. tritici* L. gewoon; *E. nigricans* L. enkele malen; *Scotia vestigialis* Hufn. éénmaal; *S. segetum* Schifferm. gewoon; *S. clavis* Hufn. enkele exx.; *S. exclamationis* L. gewoon; *S. ipsilon* Hufn. gewoon; *Ochropleura plecta* L. gewoon; *Rhyacia simulans* Hufn. tweemaal in 1960; *Noctua pronuba* L. gewoon; *N. comes* Hübner vrij gewoon; *N. fimbriata* Schreber vrij gewoon; *N. janthina* Schifferm. vrij gewoon; *N. interjecta* Hübner zeldzaam; *Graphiphora augur* F. gewoon; *Paradiarsia glareosa* Esper één ex. in 1961; *Lycophotia molothina* Esper één ex. in 1962; *L. porphyrea* Schiff. gewoon; *Peridroma saucia* Hübner in goede trekkersjaren soms gewoon; *Diarsia mendica* Fabr. gewoon; *D. brunnea* Schiff. zeldzaam; *D. rubi* Vieweg gewoon; *Amathes c-nigrum* L. gewoon; *A. ditrapezium* Schiff. zeldzaam; *A. triangulum* Hufn. gewoon; *A. baja* Schiff. 2 exx. in 1962; *A. sexstrigata* Haworth vrij gewoon; *A. xanthographa* Schiff. gewoon; *Naenia typica* L. vrij gewoon; *Cerastis rubricosa* Schiff. vrij gewoon; *Mesogona oxalina* Hübner éénmaal in 1960; *Axytia putris* L. gewoon; *Actinotia polyodon* Cl. éénmaal in 1960; *Mythimna straminea* Tr. één exemplaar in 1958; *M. pallens* L., *M. impura* Hb., *M. albipuncta* F. en *M. lythargyria* Esp. alle gewoon; *M. pudorina* Schiff. zeldzaam; *M. conigera* Schiff. drie exx. in 1962; *Leucania comma* L. gewoon; *L. obsoleta* Hb. enkele exemplaren; *Mythimna l-album* L. in de meeste jaren vrij gewoon; *Cerapteryx graminis* L. gewoon; *Panolis flammea* Schiff. gewoon; *Orthosia incerta* Hufn., *O. stabilis* Schiff., *O. cruda* Schiff. en *O. gothica* L., alle gewoon; *O. gracilis* F. vrij gewoon; *O. minioso* F., *O. munda* Schiff. en *O. populeti* F. zeldzaam; *Heliophobus saponariae* Bkh. zeldzaam; *Sideridis albicollis* Hb. in 1958 en 1961 telkens twee exemplaren; *Tholera popularis* F. gewoon; *T. cespitis* F. zeldzaam; *Pachetra sagittigera* Hufn. vrij gewoon; *Mamestra pisi* L., *M. contigua* Schiff. en *M. thalassina* Hufn. zeldzaam; *M. genistae* Bkh. en *M. serena* Schiff. vrij gewoon; *M. dysodea* Schiff. één ex. in 1960; *M. oleracea* L., *M. brassicae* L., *M. dissimilis* Kn. en *M. persicariae* L. gewoon; *Hadena cucubali* Schiff. en *H. bicurris* Hufn. zeldzaam; *H. compta* Schiff. gewoon; *Polia nebulosa* Hufn. vrij gewoon; *P. advena* F. enkele exx.; *Discestra trifolii* Hufn. gewoon; *Anarta myrtilli* L. gewoon; *Conistra rubiginosa* Schiff. vrij gewoon; *C. vaccinii* L. gewoon; *C. ligula* Esp. zeldzaam; *C. erythrocephala* Schiff. éénmaal in 1960; *C. vau-punctatum* Esp. alleen in 1961, elf exx.; *Agrochola helvola* L., *A. lynchnidis* Schiff., *A. macilenta* Hb., *A. lota* Cl. en *A. circellaris* Hufn. alle gewoon; *Spudaea ruticilla* Esp. gewoon; *Omphalosclis lunosa* Hw.

zeldzaam; *Cirrhia icteritia* Hufn. gewoon; *C. aurago* Schiff. zeldzaam; *C. ocellaris* Bkh. vrij gewoon; *C. lutea* Ström vrij gewoon; *Eupsilia transversa* Hufn. gewoon; *Atethmia xerampelina* Esp. éénmaal in 1961; *Dryobotodes protea* Schiff. zeldzaam; *Xylocampa areola* Esp. vrij gewoon; *Meganephria oxyacanthae* L. gewoon; *Xylena exsoleta* L. éénmaal een rups in 1960; *Lithophane lamda* F. één ex. in 1960; *L. ornifopus* Hufn. twee exx.; *L. semibrunnea* Hw. twee exx. in 1960; *Calophasia lunula* Hufn. enkele malen; *Cucullia scrophulariae* Schiff. gewoon, vooral de rupsen vaak talrijk; *C. chamomillae* Schiff. één ex. in 1960; *C. umbratica* L. gewoon; *Pyrrhia umbra* Hufn. zeldzaam; *Chilodes maritima* Tauscher één ex. in 1962; *Coenobia rufa* Hw. alleen in 1962, zes exx.; *Archana algae* Esp. zeldzaam; *A. sparganii* Esp. gewoon; *A. dissoluta* Tr. één ex. in 1962; *A. geminipuncta* Hw. zeldzaam; *Nonagria typhae* Thunberg vrij gewoon; *Arenostola fluxa* Hb. éénmaal in 1960; *A. pygmaea* Hw. gewoon; *A. phragmitidis* Hb. gewoon; *Rhizedra lutosa* Hb. gewoon; *Calamia vitens* L. vrij gewoon; *Energia paleacea* Esp. éénmaal in 1959; *Cosmia trapezina* L. gewoon; *C. pyralina* Schiff. vrij gewoon; *C. affinis* L. éénmaal in 1959; *Zenobia subtusa* Schiff. gewoon; *Meristis trigramica* Hufn. vrij gewoon; *Petilimna arcuosa* Hw. in 1959, 1960 en 1961 telkens één exemplaar; *Charanyca clavipalpis* Scop. gewoon; *Caradrina morpheus* Hufn. vrij gewoon; *Hoplodrina blanda* Schiff. vrij gewoon; *H. alsines* Brahm gewoon; *H. ambigua* F. in de meeste jaren gewoon; *Hapalotis venustula* Hb. één ex. in 1962; *Celaena haworthii* Curtis éénmaal in 1959; *Gortyna flavago* Schiff. vrij gewoon; *Hydraecia oculea* L. één ex. in 1962; *H. fucosa* Freyer gewoon; *H. micacea* Esp. gewoon; *Luperina testacea* Schiff. gewoon; *Eremobia ochroleuca* Esp. zeldzaam; *Phlogophora meticulosa* L. gewoon; *Talpophila matura* Hufn. vrij gewoon; *Euplexia lucipara* L. gewoon; *Miana furuncula* Schiff. gewoon; *Procus fasciuncula* Hw. gewoon; *P. latruncula* Schiff. gewoon; *P. strigilis* L. vrij gewoon; *Trachea atriplicis* L. vrij gewoon, de laatste jaren minder; *Apamea lithoxylea* Schiff. vrij gewoon; *A. monoglyphia* Hufn. gewoon; *A. lateritia* Hufn. vrij gewoon; *A. crenata* Hufn. gewoon; *A. sordens* Hufn. gewoon; *A. sordida* Schiff. gewoon; *A. remissa* Hb. gewoon; *A. secalis* L. gewoon; *A. ypsilon* Schiff. vrij gewoon; *A. ophiogramma* Esp. gewoon; *Dipterygia scabriuscula* L. gewoon; *Rusina umbratica* Goeze gewoon; *Anhipyrra fragopoginis* L. en *A. pyramidea* L. gewoon; *Jaspidia pygarga* Hufn. gewoon; *J. deceptor* Scop. twee exx. in 1962; *Unca uncula* Cl. slechts enkele malen gevangen; *U. olivana* Schiff. gewoon; *Emmelia trabealis* Scop. éénmaal in 1960; *Nycteola revayana* Scop. vrij gewoon; *Earias clorana* L. vrij gewoon; *Pseudopsis bicolorana* Fuessly vrij gewoon; *Bena prasinana* L. gewoon; *Catocala nupta* L. gewoon; *Phoberia lunaris* Schiff. vrij gewoon; *Euclidimera mi* Cl. gewoon; *Ectypa glyptica* L. gewoon; *Chrysaspidea festucae* L. gewoon; *Autographa jota* L. zeldzaam; *A. gamma* L. gewoon; *A. confusa* Stephens vier exx. in 1959, drie in 1960 en twee in 1961; *Polychrisia moneta* F. éénmaal in 1958; *Plusia chrysitis* L. gewoon; *Abrostola triplasia* L. en *A. tripartita* Hufn. gewoon; *Episema caeruleocephala* L. gewoon; *Scoliopteryx libatrix* L. gewoon; *Lygephila pastinum* Tr.

vrij gewoon; *Catephia alchymista* Schiff. één ex. in 1962; *Parascotia fuliginaria* L. vrij gewoon; *Rivula sericealis* Scopoli gewoon; *Laspeyria flexula* Schiff. vrij gewoon; *Zanclognatha grisealis* Schiff. gewoon; *Z. cribrumalis* Hb. enkele malen; *Z. tarsipennalis* Tr. vrij gewoon; *Z. tarsicrinalis* Knoch enkele malen; *Paracolax derivalis* Hb. enkele exx.; *Bomolocha crassalis* F. gewoon; *Hypena proboscidalis* L. gewoon; *H. rostralis* L. vrij gewoon.

Geometridae. — *Archiearis parthenias* L. gewoon; *Alsophila aescularia* Schiff. vrij gewoon; *Pseudoterpna pruinata* Hufn. vrij gewoon; *Geometra papilionaria* L. gewoon; *Comibaena pustulata* Hufn. zeldzaam; *Hemithea aestivaria* Hb. gewoon; *Hemistola chrysoprasaria* Esp. éénmaal n 19610; *Jodis lactearia* L. gewoon; *J. putata* L. gewoon; *Sterrhia muricata* Hufn. zeldzaam; *S. biselata* Hufn. gewoon; *S. fuscovenosa* Goeze vrij gewoon; *S. seriata* Schrank gewoon; *S. dimidiata* Hufn. gewoon; *S. emarginata* L. gewoon; *S. aversata* L. gewoon; *S. nigropunctata* Hufn. vrij gewoon; *S. immutata* L. vrij gewoon; *S. floslactata* Hw. gewoon; *Cosymbia albipunctata* Hufn. vrij gewoon; *C. annulata* Schulze éénmaal in 1959; *C. porata* L. vrij gewoon; *C. punctaria* L. gewoon; *C. linearis* Hb. éénmaal in 1961; *Calothyranis amataria* L. gewoon; *Lythria purpurata* L. vrij gewoon; *Ortholitha mucronata* Scopoli enkele malen; *O. plumbaria* F. zeldzaam; *O. chenopodiata* L. vrij gewoon; *Chesias legatella* Schiff. gewoon; *C. rufata* F. zeldzaam; *Anaitis efformata* Guenée gewoon; *Acasis viretata* Hb. vrij gewoon; *Nothopteryx carpinata* Bkh. één ex.; *Lobophora halterata* Hufn. één ex.; *Mysticoptera sexalata* Retzius vrij gewoon; *Operophtera brumata* L. gewoon; *Oporinia dilutata* Schiff. gewoon; *Triphosa dubitata* L. enkele malen; *Calocalpe undulata* L. gewoon; *Lygris prunata* L. vrij gewoon; *L. populata* L. zeldzaam; *L. mellinata* F. gewoon; *L. pyralata* Schiff. vrij gewoon; *L. testata* L. vrij gewoon; *Plemyria rubiginata* Schiff. gewoon; *Thera variata* Schiff. éénmaal in 1959; *T. obeliscata* Hb. gewoon; *T. firmata* Hb. zeldzaam; *Dystroma truncata* Hufn. gewoon; *Xanthorhoe fluctuata* L. gewoon; *X. spadicearia* Schiff. en *ferrugata* Clerck beide gewoon; *Nycterosea obstipata* F. éénmaal in 1962; *Orthonomia vittata* Bkh. vrij gewoon; *Calostigia pectinaria* Knoch zeldzaam; *Lampropteryx ocellata* L. gewoon; *Euphyia cuculata* Hufn. één ex. in 1961; *E. luctuata* Schiff. één ex. in 1962; *E. bilineata* L. gewoon; *Ecliptopera silaceata* Schiff. vrij gewoon; *Electrophaes corenlata* Thnbg. enkele malen; *Mesoleuca albicillata* L. gewoon; *Epirrhoe alternata* Müller gewoon; *E. rivata* Hb. vrij gewoon; *Perizoma alchemillata* L. gewoon; *P. flavofasciata* Thunb. zeldzaam; *Hydriomena coerulata* F. vrij gewoon; *Pelurga comitata* L. gewoon; *Hydrelia flammeolaria* Hufn. vrij gewoon; *Euchoeca nebulata* Scop. gewoon; *Asthena albulata* Hufn. gewoon; *Eupithecia plumbeolata* Hw. de rupsen geklopt uit hengel; *E. linariata* F. gewoon, vooral als rups; *E. valerianata* Hb. als rups gewoon op valerian; *E. oblongata* Thunberg gewoon; *E. tripunctaria* Herrich-Schäffer enkele exx.; *E. absinthiata* Clerck gewoon; *E. vulgata* Haworth gewoon; *E. icterata* Villers vrij gewoon; *E. succenturiata* L. gewoon; *E. nanata* Hb. gewoon; *E. abbreviata* Stephens zeldzaam; *Gymnoscelis pumilata* Hb. vrij gewoon; *Chloroclystis coronata* Hb. enkele malen; *Calliclystis*

rectangulata L. gewoon; *C. debiliata* Hb. vermeld in Lempke's Cat.; *Abraxas grossulariata* L. gewoon; *A. sylvata* Scop. vrij gewoon; *Lomaspilis marginata* L. gewoon; *Ligdia adustata* F. zeldzaam; *Aleucis distinctata* Herrich-Schäffer vrij gewoon; *Bapta bimaculata* F. vrij gewoon; *B. temerata* Schiff. vrij gewoon; *Deileinea pusaria* L. en *exanthemata* Scop. beide gewoon; *Ourapteryx sambucaria* L. gewoon; *Ellopia fasciaria* L. gewoon; *Campaea margaritata* L. gewoon; *Ennomos autumnaria* Werneburg gewoon; *E. alniaria* L., *fuscantaria* Stephens en *erosaria* Schiff. alle vrij gewoon; *Selenia bilunaria* Esp. gewoon; *S. lunaria* Schiff. vrij gewoon; *S. tetralunaria* Hufn. vrij gewoon; *Apeira syringaria* L. twee exx. in 1959; *Crocallis elinguaris* L. gewoon; *Angerona prunaria* L. gewoon; *Anagoga pulveraria* L. vrij gewoon; *Opisthograptis luteolata* L. gewoon; *Epione repandaria* Hufn. vrij gewoon; *Cepphis advenaria* Hb. gewoon; *Pachycnemia hippocastanaria* Hb. gewoon; *Lozogramma chlorosata* Scopoli gewoon; *Pseudopanthera macularia* L. gewoon; *Colotois pennaria* L. zeldzaam; *Semiothisa notata* L. gewoon; *S. alternaria* Hb. gewoon; *S. brunneata* Thunberg gewoon; *S. liturata* Clerck gewoon; *S. clathrata* L. gewoon; *S. wauraria* L. gewoon; *Isturgia limbaria* F. gewoon; *Erannis leucophaearia* Schiff. gewoon; *E. aurantiaria* Hb. zeldzaam; *E. marginaria* F. enkele malen; *E. defoliaria* Clerck vrij gewoon; *Phigalia pedaria* F. gewoon; *Lycia hirtaria* Clerck twee exx. in 1962; *Biston strataris* Hufn. vrij gewoon, de laatste jaren minder; *B. betularis* L. gewoon; *Peribatodes gemmaria* Brahm gewoon; *P. secundaria* Hb. één ex. in 1960; *Cleora cinctaria* Schiff. vermeld in Lempke's Catalogus; *Alcis repandata* L. zeldzaam; *Boarmia roboraria* F. zeldzaam; *Serraca punctinialis* Scopoli gewoon; *Ectropis bistortata* Goeze gewoon; *Aethalura punctulata* Schiff. vrij gewoon; *Ematurga atomaria* L. gewoon; *Bupalus piniarius* L. gewoon; *Perconia strigillaria* Hb. vrij gewoon.

Literatuur

- Lempke, B. J.: Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera.
 Maassen, A. W. P.: Macrolepidoptera in Midden-Limburg. Nat. Hist. Maandblad, 50e jrg., no. 9—10, blz. 102; 51e jrg. no. 3, blz. 38; 52e jrg. no. 1, blz. 11.
 Simonis, A. H. en Sangers, W.: Beknopte Geschiedenis van Montfort, Echt 1950.

MONTFORT 15-7-1963.

NIEUWE LEDEN

- Mej. Th. Dauphin, Koningsplein 59 c, Maastricht.
 Mej. J. Nievergeld, Hondstraat 4, Maastricht.
 Mej. M. Oehlen, Capucijnenstraat 75, Maastricht.
 Mej. G. v. Soest, Hertogsingel 76, Maastricht.