

geving zijn dus botanisch ideale plaatsen, alleszins de moeite waard om excursies te maken, indien men tenminste de planten kan laten staan!

te Heerlen op 10 mei 1961.

Bij afwezigheid van Dr. Dijkstra zit de heer Romein de vergadering voor. De heer van Loo geeft een uitvoerige toelichting bij een collectie door hem meegebrachte planten, o.a. veenpluis, cristaatvormen van mannetjes- en wijfjesvarens, venushaar, bekervaren en stekelvaren. Verder nog de Gelderse roos en de aardkastanje, *Bunium bulbocastanum*. De laatste is vroeger in de omgeving van Bouwberg waargenomen. Tenslotte demonstreert hij, hoe de knollen van de herfsttijloos kunnen worden herkend.

De heer Bex toont moerasandijvie en blaartrekkende boterbloem, die volgens de heer Toussaint bijna altijd samen in Zuid-Limburg gevonden worden. Beide soorten waren afkomstig van de Oranje-Nassau III, maar in de laatste jaren wordt de moerasandijvie op veel plaatsen in Zuid-Limburg waargenomen.

De heer van Loo had waargenomen, dat een paar merels brood uit een voederhuisje aan hun nestjongen voerde. Hieraan aansluitend vertelt de heer Bult het een en ander over het nest en de broedgewoonten van de tiftjaf, hier het „ovenbouwertje” genoemd, de fitis, de roodborst, de zanglijster en de staartmees, waarvan hij de nesten demonstreert. Ook de appelvink komt ter sprake. Een nest, dat op 14 april gevonden was, bleek 's middags al te zijn uitgehaald. Van veel kanten hoort men klagen over toenemende vernielingen van nesten -en het doden met katapulten van vogels.

NIEUWS UIT VENLO EN OMGEVING

De heer Spreuwenberg schrijft:

De Europese Kanarie (*Serinus serinus*) heeft bij de uitbreiding van zijn gebied bijna Venlo bereikt. Van deze soort, die buiten de trek nog nooit door ons in de buurt van Venlo is waargenomen, hoorde ik 16 Mei j.l. 's avonds twee individuen zingen. Daar ik de zang niet kende en het reeds laat was, kon ik de vogels niet determineren. Op 19 Mei j.l. hoorde ik met de heer Maeghs uit Tegelen langs de Rijksweg te Steijl weer twee van deze vogels zingen. Eén zat op een T.V.-antenne en kon door ons als

een Europese Kanarie worden geïdentificeerd.

Maandag 22 Mei j.l. hebben wij, d.w.z. de heer en mevrouw de Bruijn en de heren v. d. Hombergh, Dr. Waldeck en zoon, Weijs en ondergetekende het landgoed De Hamert bezocht. Het is een unieke dag geworden. Even een schets van het terrein: de vennen, c.q. het door ons bezochte Herenvan, stonden allen boordevol water en de omliggende heide is eveneens zeer nat. Aan een kant van het ven grenst akker- en grasland. Door het lange tijd onderwater staan is hier de plantengroei verdwenen en een echt slikterrein ontstaan, zeer geschikt als fourageerterrein voor doortrekkende steltlopers, die we dan ook gezien hebben. Dr. Waldeck woont in Den Haag en kent uiteraard de steltlopers erg goed. Enkele soorten herkende hij het eerst, waarna we ze rustig konden bekijken:

Tureluur (*Tringa totanus*), deze soort is hier een normale doortrekker. We zagen 6 ex. Een mannetje baltste, hetgeen er op wijst, dat deze vogel hier zou kunnen gaan broeden.

Kleine Pluvier (*Charadrius dubius*).

Wordt in de kleigroeven bij Tegelen vaker waargenomen. Nu 1 ex. gezien.

Zwarte Ruiter (*Tringa erythropus*) 2 ex.

In '60 ook gezien in Tegelen door hr. Weijs.

Bosruiter (*Tringa glareola*), 4 ex. in gezelschap van

Kemphennen (*Philomachus pugnax*), 2 ex., deze worden vaker in de Ospelse Peel gezien.

Groenpootruiter (*Tringa nebularia*), ca 10 ex., vrij algemene doortrekker.

Oeverloper (*Tringa hypoleucos*), 2 ex.

Wordt ook tijdens de trek vrij veel waargenomen.

Temminck's strandloper (*Calidris Temminckii*), 2 ex. Voor ons de eerste waarneming van deze soort.

Verder zagen wij:

Bergeend (*Tadorna tadorna*), 2 ex. Deze waren hier al op 16-5-'61 door de heer v. d. Hombergh gezien. Bergeend is een typische zeeëend.

Regenwulp (*Numenius phaeopus*), 2 ex. Kenmerkende korte snavel en opvallende roep: „Bi-bi-bi-bi-bi”. Nog nooit door ons gezien.

Korhaan (*Lyrurus tetrix*), 1 ex. bolderend op roggeveld.

Geoordefuut (*Podiceps nigricollis*), 1 ex, zwemmend en duikend op ven. Eerste waarneming op dit terrein.

Zomertaling (*Anas querquedula*) regelmatige doortrekker.

Smient (*Anas penelope*), regelmatige doortrekker.

Pijlstaart (*Anas acuta*), regelmatige doortrekker.

Kokmeeuw (*Larus ridibundus*), Voor het eerst sedert jaren weer een kolonie, geschat 250—300 ex.

In de natte hei vond ik nog twee Heikikers (*Rana arvalis*).

P.S. Zojuist hoor ik van de heer v. d. Hombergh, dat hij verleden jaar bij Venlo al een Eur. Kanarie heeft gezien en dit jaar een in Tegelen en twee in Venlo.

De heer Hermans stuurde de volgende mededelingen:

Naar aanleiding van de mededeling van de heer Toussaint in het Maandblad van juni 1960 deel ik U mede, dat de moerasandijvie in onze omgeving op verschillende plaatsen gevonden is. Drie exemplaren vond ik vorig jaar in een kleigroeve bij de Bovenste Molen. De vorige week mocht ik tot mijn voldoening constateren, dat de planten ook dit jaar present zijn. De kleigroeve bij de Abdij te Tegelen bleek een waar moerasandijvie-paradijs. Zeventien ex. telde ik daar, die voor een groot deel in het water stonden. Ook in het Ven op een drassig stukje tuindersgrond vonden wij een ex. In het Duitse grensgebied komt de plant veel voor: de gebr. Faahsen uit Kaldenkirchen hebben de plant op verschillende plaatsen gevonden, met als brandpunt een kleigroeve op Duits gebied ter hoogte van Reuver. De planten staan daar met tientallen.

VERZOEK OM GEGEVENS INZAKE DE VERGIFTIGING VAN WATERPLANTEN DOOR HERBICIDEN.

De Commissie tot Bescherming van de Wilde Flora der Kon. Ned. Botanische Ver. vraagt de aandacht van alle Nederlandse floristen voor het volgende.

Sinds het vorige jaar heeft de bestrijding van onze wilde flora door middel van herbiciden helaas ook ingang gevonden in onze sloten en

andere wateren. Men hoopt zo de aanzienlijke arbeidskosten van het jaarlijks mechanisch reinigen der waterlopen te drukken. Wat de gevolgen zullen zijn van deze nieuwe aanslag op het biologisch evenwicht — voor de visstand, het vee dat dit water moet drinken, de tuinbouw die er mee moet sproeien — vragen degenen, die deze maatregelen propageren, zich niet af. Ook schijnt men zich niet bezorgd te maken over de vraag, wat het gevolg zal zijn van de aanwezigheid van zulke enorme massa's gedood en dus rottend, niet verwijderd plantenmateriaal in de openbare wateren. Gelukkig is men bij de Plantenziektenkundige Dienst wel wijzer. Deze dienst heeft echter niet de bevoegdheid, bedoeld gebruik te verhinderen. Wel waarschuwt men tegen misbruik. In het bijzonder wordt er door deze dienst de nadruk op gelegd:

1. dat de thans bekende en toegelaten middelen alleen bruikbaar zijn voor de bestrijding van boven het water uitstekende oeverplanten als *Phragmites communis*, *Iris pseudacorus*, *Typha angustifolia* en vooral *Glyceria maxima*, ook voor *Stratiotes aloides* in de tijd dat deze boven het water uitkomt, doch niet voor drijvende en ondergedoken waterplanten;

2. dat men deze bespuitingen niet dient uit te voeren in de nabijheid van natuurreservaten, en dat men in twijfelgevallen de natuurbeschermingsconsulent van de betreffende provincie moet raadplegen.

Het is thans vooral zaak, zoveel mogelijk gegevens te verzamelen omtrent dit euvel en te trachten, door tijdig waarschuwen erger te voorkomen.

De Commissie verzoekt daarom dringend aan alle Nederlandse floristen, bij hun excursies te letten op eventuele aantasting van bepaalde waterlopen met interessante flora in of in de nabijheid van natuurgebieden. Hierbij wordt dus niet zozeer gedacht aan alle sloten in het Hollandse polderland, maar aan sloten en andere wateren in of nabij plassen- en moerassengebieden, of andere wateren die op zich zelf van meer dan gewone floristische betekenis zijn. Neemt men waar dat hier een bespuiting heeft plaatsgehad, nog in gang is of voorbereid wordt, dan is het gewenst dat men zo spoedig mogelijk rechtstreeks de betrokken natuurbeschermingsconsulent waarschuwt. In Limburg dus Dr. Ir. W. H. Die mont, St Pieterskade 25, Maas-tricht, tel. 04400—2408.