

ber krijgen de bezoekers van de vergadering de gelegenheid onder leiding de tentoonstelling te bezichtigen.

UIT EIGEN KRING.

Proefstation voor de Champignoncultuur te Horst. Op 6 juli geschiedde de officiële opening van dit proefstation door de minister van Landbouw en Visserij, mr. V. G. M. M a r i j n e n. Bij deze plechtigheid was het Genootschap vertegenwoordigd door zijn voorzitter.

Het is de lezers wel bekend, dat dit proefstation onder leiding staat van twee goede bekenden in ons Genootschap, de heer drs. P. J. B e l s als directeur en Mevr. dr. H. C. B e l s - K o n i n g. Wij wensen hun veel succes in hun belangrijk werk.

Onderscheidingen. Prof. dr. J. J. P r i c k uit Nijmegen werd benoemd tot commandeur in de Orde van Sint Silvester, mr. W. B a r o n M i c h i e l s v a n K e s s e n i c h tot commandeur in de Orde van Leopold II en de heer J. H. U b a c h s tot officier in de Orde van de Kroon.

Examens. 30 juni slaagde de heer H. R. S m i s s a e r t, de schrijver van de Limburgse Beken, te Leiden voor het doctoraal biologie. De heer J. W i l l e m s uit Geleen slaagde te Roermond voor het onderwijsexamen.

Gouden priesterfeest. 26 augustus was het 50 jaar geleden dat Dr. H. S c h m i t z S. J. te Maastricht de H. Priesterwijding ontving. Verleden jaar — bij zijn 80e verjaardag — hebben wij gewezen op de grote verdiensten van onze oud-hoofdredacteur en willen vandaag volstaan met het aanbieden van onze hartelijke gelukwensen.

VERSLAG VAN DE MAANDVERGADERINGEN

te Heerlen op 10 juni 1959.

In juni is de bloei van de voorjaarsplanten ten einde, terwijl de uitbundige zomerbloei nog wel even op zich laat wachten. Toch is het niet no-

dig dat onze tuinen een leegte vertonen, zoals de heer van Loo bewees door een aantal planten mede te brengen, die juist voor deze periode zeer geschikt zijn: Van de vlinderbloemen *Cladrastis lutea*, ook wel *Virgilia lutea*, een boom met geel hout en bloemen in hangende pluimen, afkomstig uit Centraal-Noord-Amerika, en de Duitse brem, *Genista germanica*, een stekelige behaarde plant die bij ons uiterst zelden gevonden is. Van de Heidekruidfamilie *Erica cinerea atropurpurea*, een purperen variëteit van de grauwe dopheide, bekend vooral uit de Belgische Kempen. Van de Sleutelbloemfamilie: *Primula littoniana*, ook wel *P. viali*, met een aarvormige bloeiwijze met veel bloemen, gekweekt als tweejarige plant; *P. bulleyana* uit Zuid-China met oranje-gele bloemen. Van de Caryophyllaceën *Dianthus deltoïdes*, de steen- of heideanjer, vooral bekend van de rivierdalen in het oosten van ons land. Tenslotte van de lipbloemen de drakenkop, *Dracocephalum argunense*, afkomstig uit Oost-Azië.

De heren Mientjes en Collin brachten een tweetal bandvormingen ter vergadering. Fasciatie is ten dele erfelijk. Wint men zaad van een gefascieerde bloem en zaait men dit uit, dan kan men onder de zaailingen een zeker percentage planten met fasciatie terugkrijgen. Selecteert men zo enige jaren na elkaar dan blijkt dat het aantal planten met fasciatie constant is geworden. Men krijgt echter nooit 100% planten met fasciatie. Bandvorming kan wellicht ook ontstaan door beschadiging, b.v. bij een paardebloem in een wagenspoor. Dit soort fasciatie is natuurlijk niet erfelijk. Ook door bespuiting met groeistoffen kunnen allerlei misvormingen ontstaan.

Tussen allerlei bloemen, medegebracht door de heer Coonen, bevond zich de heggerank, *Bryonia dioica*. De dikke vlezige wortel werd wel gebruikt voor het vervaardigen van „alruinmannetjes”. Onder het mompelen van allerlei toverformules moest men de raapvormige wortel uit de grond trekken zonder deze te breken. Dit lukte natuurlijk nooit, want de soms vuistdikke wortel zit stevig in de grond. Zou het evenwel toch lukken, dan hoort men een kermend geluid en dat is het zekere teken dat alles naar wens is verlopen. Het echte alruinmannetje wordt geleverd door de *Mandragora*. Deze te bemachtigen was natuurlijk nog veel moeilijker, ja levensgevaarlijk, want wie dit waagde moest sterven. Men kon het natuurlijk ook een ander laten