

zeldzame soort, die uitsluitend in Z.-Limburg is waargenomen. Komt niet in Engeland voor. Rups in Juni en September op *Alliaria officinalis*.

Adoxophyes orana F. v. R. (*Capua reticulana* Hb.). Deze op vruchtbomen zeer schadelijke mot, die 10 jaar geleden nog zo goed als onbekend was in het land en thans op zeer veel plaatsen schadelijk optreedt, is in Limburg verbijsterend algemeen. De rups leeft hier zeker ook op hazelaar.

Cacoecia semialbana Gn. 9 exemplaren op licht in Augustus 1950. Volgens Snellen slechts eenmaal bij Arnhem en eenmaal in Z. Limburg gevangen en dit is zeker al 70 à 80 jaar geleden. De soort is in het gehele palae-arctische gebied gevangen. De rups schijnt wel polyphag te zijn, hoewel veel naar *Lonicera* als voedselplant verwezen wordt. Voor Nederland een zeer bijzondere vangst.

Cnephasia genitalana Pierce. 7 exemplaren op licht in Juli 1950. *Cn. genitalana* is uitwendig moeilijk van de andere *Cnephasia*-soorten te onderscheiden. De genitalia zijn echter, vooral bij de man, zeer bijzonder gevormd; de sacculus reikt tot ver voorbij de valven en daardoor is het zelfs mogelijk de mannen te determineren zonder praeparaat te maken, hetgeen de Engelsen noemen "dry manipulation". De soort zal wel in geheel Europa voorkomen maar is nog niet vermeld uit Frankrijk en België. Nieuw voor de Ned. fauna.

Conchylis flaviciliana Wilken. 2 ♂♂ op licht 18-VIII-1950. Deze soort was zeer lang alleen bekend uit Engeland doch sedert de laatste twee decennia ook bekend in Frankrijk en Zweden. De rupsen leven in September en October in de zaadhoofdjes van *Knautia*. Uiterlijk gelijkt *flaviciliana* veel op de inlandse *C. roseana* Hw., doch er is een duidelijk verschil in genitalia en ook in de levenswijze van de rups. Nieuw voor de Ned. fauna.

Olethreutes rufana Sc. 1 ex. in Juli 1950. Een overall, ook in het buitenland zeer zeldzame soort. De rups leeft in wortels van *Artemisia* en *Chrysanthemum vulgare*.

Steganoptycha simplana F. 3 exemplaren in Juli en Augustus 1950. Eveneens een hier in het land zeer weinig waargenomen soort.

Platyedra vilella Z. 1 zeer afgevlagen ♂ op 5-V-1949. De genitalia van de man zijn zeer karakteristiek gevormd waardoor de determinatie werd vergemakkelijkt. De rups leeft in Juli-Augustus in zaden van *Malva silvestris* en de mot vliegt van eind Augustus tot in Mei van het volgende jaar; dit exemplaar heeft dus overwinterd. *Vilella* is gewoon in alle naburige landen, ook Engeland. Nieuw voor de Ned. fauna.

Bryotropha mundella Dgl. 5 exemplaren op licht 18-23-VII-1950. In Nederland werd slechts éénmaal een wijfje gevangen door de heer V á r i in het Soesterveen. In Engeland schijnt deze soort niet zeldzaam te zijn want in de verzameling B a n k e s in het British Museum bevindt zich een grote serie van deze dieren. Voor Nederland is deze vangst van 5 exemplaren wel zeer bijzonder.

WIJZIGING VAN DE VOGELWET.

Tot de wijzigingen van de Vogelwet 1936, welke op 5 Juni 1947 van kracht werden, behoort onder meer het verbod tot het onder zich hebben van opgezette beschermde vogels, voor zover deze niet zijn voorzien van een metalen merkteken van een erkend praeparateur. Dit z.g. praeparateurs-teken bevindt zich meestal aan de vleugel of aan de staartwortel van de vogel. Soms is het evenwel aangebracht om het loopbeen of op het voetstuk waarop de vogel is geplaatst. Het merkteken bevat het nummer waaronder de praeparateur als zodanig is erkend, alsmede een volgnummer.

Voor het in bezit hebben van vogels, waaraan dit merkteken ontbreekt, diende een z.g. Vogelvergunning I te worden aangevraagd. Het ligt thans in de bedoeling de afgifte van deze I-vergunningen die uitsluitend worden verleend voor het onder zich hebben van beschermde vogels, welke kennelijk vóór 5 Juni 1947 zijn opgezet, binnenkort te beëindigen.

Correspondentie hierover kan worden gericht aan het Hoofd van de Afdeling Oudheidkunde en Natuurbescherming van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Prinsessegracht 21 te 's-Gravenhage.