

organ is beset with very small hairs, which have the shape of small teeth. Although never mentioned, these small hairs are present too in *Nothrus silvestris*, where they are, however, much smaller. The hairs on the posterior border of the hysterosoma are larger than figured by Willmann.

Supplementary details. Measurements 1.050×0.500 mm and 1.035×0.535 mm. Length of the damaged specimens in the Oudemans collection 0.865—1.015 mm.

Propodosoma and notogaster with distinct reticulate structure. This structure is much finer at the border of the hysterosoma, which part is distinctly separated from the centre of the notogaster (fig. 2 c).

Pseudostigmatic organ (fig. 2 b) rather short, 0.235 mm long, with a few very small hairs. Rostral hairs simple and thin, as mentioned already by Willmann, and not clavate as figured by Oudemans. The greater part of the hairs on the hysterosoma is only a little thickened (figs. 2 a, d). The hairs near the posterior border (F_2 , K_1 , PN_1 , PN_2 in the notation by Grandjean, 1934) (fig. 2 e) are more thickened, especially towards the end; K_1 and PN_1 are, moreover, longer (1/10 of the total length, just as in the specimens from the Oudemans collection).

Willmann (1935) has compared *Nothrus biciliatus* with *Nothrus borussicus* and concludes that these are two different species. The length of the bristles at the posterior border of the hysterosoma in *N. borussicus* is 1/5—1/7 of the total length.

Our specimens were collected in the litter of a bush of *Prunus spinosa*.

Literature

- Berlese, A., 1910. Acari nuovi. Manipulus V, VI. Redia, vol. 6, pp. 199—230, pls. 18—21.
- , 1910a. Brevi diagnosi di generi e specie nuovi di Acari. Redia, vol. 6, pp. 346—388.
- Grandjean, F., 1934. La notation des poils gastronomiques et des poils dorsaux du propodosoma chez les Oribates (Acariens). Bull. Soc. zool. Fr., vol. 59 (1), pp. 12—45, figs. 1—10.
- Hammen, L. van der, 1949. Voorlopige Mededeling over de Oribatei van de Sint Pietersberg. Mededelingen van de Commissie inzake Wetenschappelijk Onderzoek van de Sint Pietersberg. No. 2. Natuurhistorisch Maandblad, vol. 38(12), pp. 119—120.
- Oudemans, A. C., 1904. Notes sur les Acariens. Xe Série. Parasitidae (vel Gamasidae), Thrombidiidae et Oribatidae d'Italie. Mém. Soc. zool. Fr., vol. 16, pp. 5—32, pls. 1—3.
- Sellnick, M., 1928. Formenkreis: Hornmilben, Oribatei. in: P. Brohmer, Die Tierwelt Mitteleuropas, vol. 3.
- Willmann, C., 1930. Neue und bemerkenswerte Oribatiden aus der Sammlung Oudemans. Abh. naturw. Ver. Bremen, vol. 28(1), pp. 1—12, figs. 1—16.
- , 1931. Moosmilben oder Oribatiden (Cryptostigmata). in: Die Tierwelt Deutschlands, vol. 22, pp. 79—200, figs. 1—364.
- , 1935. Die Milbenfauna, in: Ine Jans. Faunistisch-ökologische Studien im Anningergebiet mit besonderer Berücksichtigung der xerothermen Formen. Zool. Jahrb. (Syst.), vol. 66(5), pp. 331—344, figs. 1—12.

BOEKAAANKONDIGING.

Bomenspiegel voor de wandelaar,
door W. L. Leclercq, 3de druk,
Uitg. P. N. van Kampen, Amsterdam.

„Een boek van een leek voor leeken”, zo heeft wijlen Dr Jac. P. Thijssen deze uitgave genoemd in zijn voorwoord, dat hij ter geleiding van de eerste druk, ongeveer 7 jaar geleden, schreef.

Uit het verschijnen van de derde druk blijkt, dat dit boek in brede kring belangstelling heeft weten te trekken, hetgeen in de eerste plaats zeker te danken zal zijn aan de voortreffelijke wijze waarop de auteur de stof aan zijn lezers voorlegt.

Het eerste deel is gewijd aan bos en bosbouw, het meest geslaagde tweede deel behandelt de naald- en loofbomen, die men in ons land kan aantreffen.

Alles is verlicht met duidelijke tekeningen en fraai fotomateriaal dat een honderd opnamen van meer of minder bekende plekken in ons land weergeeft. Ieder die de twee recente boeken over Limburg van deze auteur kent, zal met belangstelling de Bomenspiegel ter hand nemen.