

nog niet uit ons land. De inlandsche exemplaren van Smits van Burgst behooren tot *tetragonus* Thunb. Wat Vollenhove vermeldt als *multicolor* Grav., is blijkens de slecht bewaarde overblijfselen in Leiden een variëteit van *tibiatorius* Thunb. met breede roode segmentranden.

Diplazon scutatorius n. sp.

Kopf hinter den Augen stark verschmälert; Stirn ziemlich fein und dicht punktiert, zwischen den Punkten teilweise fein gerunzelt. Beim ♂ Stirn etwas glatter, zerstreuter punktiert. Clypeus ziemlich flach, in der Mitte des Endrandes schwach ausgeschnitten; Grübchen neben den hinteren Ocellen nicht deutlich, ganz flach. Fühler kräftig, kurz, beim ♀ 19-gliedrig, letztes Glied wie abgeschnitten (♀). Das ♂ hat 20-gliedrige Fühler. Mesonotum glänzend, ziemlich dicht punktiert, an den Seiten viel zerstreuter. Mesopleuren glatt und glänzend, ziemlich fein und zerstreut punktiert, oben etwas weitläufiger, nicht punktierte Stellen wie bei *tibiatorius* Thunb. Metathorax ziemlich deutlich gefeldert. Area petiolaris mit plateauartig erhabenen, unregelmässig grob punktiertem Raum. Area superomedia kurz, quer. Mervulus schräg; Nervellus schwach antefurkal. 3. Glied der Hintertarsen so lang als die 2 letzten Glieder zusammen, die beiden letzten Glieder sind gleichlang. Hinterleib gegen das Ende schwach seitlich zusammengedrückt. Postpetiolus etwas breiter als lang, mit 2 parallelen Leisten bis zum Quereindruck. Segment 2—4 mit Quereindruck.

♀: Schwarz. Die inneren Augenränder zum Teil, Clypeus, Palpen und Mandibeln gelblich, letztere mit schwacher Spitze. Gelbe Thoraxzeichnung: Schulterflecken, quadratförmiger Fleck des Schildchens, das Hinterschildchen, Flecken vor und unter den Flügeln. Stigma braun, an der Basis hell. Fühler schwarzbräunlich. Beine rot; alle Trochanteren, die Vorder- und Mittelhüften gelblich-weiss; das Rot der 4 vordersten Beine besonders vorne heller. Die Hinterschienen und Tarsen schwarz, die Schienen mit breitem, weissen Ring. Die mittleren Segmente schmal rötlich eingeschnitten.

♂: Gelb sind: Gesicht, Wangen, Stirnseiten, Unterseite des Schaft- und Wendegliedes, Vorderrand des Mesosternums, Sutura zwischen Meso- und Metapleuren zum Teil, übrigen wie beim ♀. Hinterleigsegmente 2—4 mit gelben Endbinden, von 2 und 3 schmal unterbrochen. Alle Hüften und Trochanteren weisslichgelb, Vorderbeine rötlichweiss; an den Hinterbeinen die Schenkel rötlich, die Schienen und Tarsen wie beim ♀, nur die Schienensporne heller.

1 ♀ Venlo 29-8-1942; 1 ♂ Venlo 14-8-1942. Typen in meiner Sammlung.

V e n l o.

H. TEUNISSEN.

BOEKBESPREKING.

Van de Geïllustreerde schoolflora voor Nederland, door H. Heukels, verscheen de twaalfde, geheel omgewerkte druk, bewerkt door W. H. Wachter. Waar dit de eerste keer is, dat een nieuwe druk verschijnt na den dood van Heukels, heeft de bewerker de piëteit gehad een korte levensschets van den auteur vooraf te doen gaan.

De flora verschijnt op zeer licht, maar voor dezen tijd nog uitstekend papier. Deze flora geeft inderdaad de meest uitvoerige en nauwkeurige beschrijving van alle Nederlandsche gewassen en van de bekende sier- en aanvoerplanten.

Eerst schrok ik van de nieuwe benamingen. Alweer? En voor hoelang? Maar het zijn de eenig juiste, zoodat we ons er aan moeten onderwerpen, al kost het mij soms veel moeite b.v. bij *Chenopodium hybridum* en *Petasites hybridus*, daar het toch geen bastaarden zijn.

Over de flora niets dan lof en juist daarom moge ik enkele opmerkingen maken over soorten, die in Noord-Nederland vrij algemeen, maar in Z. Limburg zeer zeldzaam zijn, of ontbreken.

Equisetum hiemale is sinds lang niet meer waargenomen, evenzoo *Botrychium Lunaria*.

Azolla komt in ons gewest nog niet voor.

Salix alba var. *vitellina* houden we liever voor een aparte soort, afkomstig uit het Oosten. Ze vormt hier ook bastaarden met *S. fragilis*.

Claytonia perfoliata komt thans op een paar plaatsen verwilderd en zich uitbreidend ook in Limburg voor.

Melandryum noctiflorum is alleen adventief.

Van *Cardaminopsis arenosa* komen hier zoowel de typische vorm met lila-, als de var. *albiflora* met witte bloemen adventief voor.

Sedum spectabile is een veel gekweekte sierplant.

Tillaea muscosa ontbreekt ook in Z. Limburg.

Rubus vastitus is hier vrij algemeen, zoowel in Kr. als in L. Evenzoo *R. rivularis* in vochtige bossen.

Malva verticillata is hier adventief waargenomen en wordt als de wilde type uit China opgevat, terwijl de var. *crispa* in cultuur zou zijn ontstaan.

Peucedanum palustra treffen we in Z. Limburg alleen aan in het veengebied.

Hierochloë odorata ontbreekt in Z. Limburg. Voor België geeft Goffard — 1934 — R. R. In-
troduit.

Deze opmerkingen mogen getuigen van mijn belangstelling en waardeering in het werk van Wachter.

DE WEVER.