

haar aangeven o.a. voor Krefeld, Kleef, Wesel. Dit gebied sluit waarschijnlijk aan bij 't land van Nijmegen, vanwaar ik ze ontving van Joh. Jansen (Malden). In 't Maasgebied is ze daar veel zeldzamer dan *B. vulgaris*.

In Z. Limb. heb ik ze nog niet gezien.

Behalve door de soortelijke verschillen met *B. vulgaris typica* — kleiner nevenblaadjes, zoowel aan wortel- als stengelbladen en kleiner bloemen — verschilt *B. stricta* Andr. van de var. *rivularis* van *B. vulgaris* ook nog door den scherpsten smaak als van waterkers. Bij *rivularis* is deze wel onaangenaam maar niet scherp. Verder door de gedurende den bloei rechtopgroeijende verlengde bloeiwijzen, die bij *rivularis* dan meer schermachtig zijn, doordat de takken meer schuin naar beneden afstaan. De stijlen op de hauwen zijn bij *stricta* maar $\frac{1}{2}$ —1 mm lang, bij *rivularis* 2—3 mm.

Groene bloemen zijn door Suringar in Kruidkund. Archief, 2e ser., 2e st., 4e deel, beschreven en afgebeeld; deels was hierbij ook diaphyse frondipare te vinden.

ANTHIDIUM STRIGATUM LATR. EN COELIOXYS ALATA FÖRST.

Nadat de mededeeling in het Natuurhistorisch Maandblad No. 4 van April j.l. gedaan was over *Anthidium strigatum* Latr., welke toen nog niet voor ons land vermeld zou zijn, is mij gebleken, dat zich in de verzameling van het Rijksmuseum te Leiden ook reeds twee exemplaren bevinden, respectievelijk voorzien van de etiketten „Snellen, Rijen, 1877” en „Maurissen, Meerssen”.

Het dier van Snellen, een ♂, wordt ook genoemd in de lijst van C. Ritsema, afgedrukt in het Tijdschrift v. Entomologie No. XXII, jaargang 1878—1879, alsmede een ♂ door Piaget bij de Bildt gevangen.

Daar ze evenwel in de lijst van Van der Vecht, welke in Zool. Mededeelingen, Deel XIII, aflev. 1 en 2, 1930, verschenen is, niet zijn opgenomen, was de aanwezigheid van de twee eerstgenoemde dieren mij nog niet bekend.

Deze interessante bij schijnt bovendien in het geheel niet zeldzaam te zijn; want behalve het op 19 Juli 1918 te Bemelen gevangen ♂, en het in Augustus 1935 te Heerlen gevangen ♀, zijn er in den tuin van het Museum te Maastricht niet minder dan 4 exemplaren gedurende den afgeloopen zomer gevangen, alle op *Sedum acre* (Muurpeper).

Volgens Schmiedeknecht zou *strigatum* bij voorkeur op *Lotus* en *Scabiosa* vliegen, terwijl Friese ook nog *Hippocrepis* opgeeft.

In verband met de vermelding in het Natuurhistorisch Maandblad No. 9 van Sept. j.l., van de twee *Coelioxys alata* Först. ♀♀, in Augustus 1937 te Mechelen (Z.L.) en Gulpen gevangen, dient nog te worden opgemerkt, dat zich in de collectie te Leiden ook een ♀ hiervan bevindt, op 28 Juli 1881 door Ritsema te Valkenburg gevangen, dus na het verschijnen van Ritsema's lijst.

Vermoedelijk heeft Van der Vecht bij het samenstellen van zijn lijst in 1929—1930 dit exemplaar niet gezien, althans wordt de soort door hem niet genoemd.

Uit het bovenstaande blijkt weer, over hoe weinig gegevens over het voorkomen in ons land we beschikken, terwijl die gegevens, welke bekend gemaakt zijn, over verschillende tijdschriften zijn verspreid. Een volledige recente lijst hieromtrent bestaat er, voor zoover mij bekend, niet.

Daarom zou ik gaarne in dit Maandblad een opsomming willen geven van de bijen en wespen (Chrysidae, Vespidae, Psammocharidae en Sphegidae), welke tot nu toe in ons land zijn waargenomen, zulks voornamelijk aan de hand van de groote verzamelingen, met inachtname der reeds gepubliceerde lijsten van Van der Vecht, Bouwman e.a. In die lijst zouden dan natuurlijk zooveel mogelijk ook de verschillende streken van ons land gespecificeerd moeten worden.

Gaarne zou ik daartoe van de entomologen, die hier belang in stellen gegevens ontvangen, welke voor deze lijst van gewicht kunnen zijn, in de eerste plaats natuurlijk, wanneer deze betrekking hebben op soorten, welke voor ons land nog niet waren vermeld.

Met de in de laatste jaren groeiende belangstelling voor deze insecten is het toch zeker wel gewenscht, dat we tenminste een bijgewerkt overzicht van de verspreiding in ons land tot onze beschikking hebben.

J. P. VAN LITH.

Wm. van Hillegaersbergstraat 145,
Hillegersberg.

PHORIDEN AUS FLUGZEUGEN, VOM MEERESSTRANDE, AUS PILZEN UND TOTEN SCHNECKEN.

von

H. Schmitz S. J. (Valkenburg L. Holland).

I. Vom britischen Imperial Institute of Entomology erhielt ich zu Beginn des Jahres 1937 fünfzehn Phoriden aus British Ostafrika, die in der Gegend von Kisumu, Kenya Colony, in Flugzeugen der Imperial Airways erbeutet wurden. Ich habe keine Nachricht darüber, und es wird auch wohl keiner darüber Auskunft geben können, wie die Phoriden in die Aëroplane gelangt sind, ob sie am Landungsplatz hineinkamen und die Reise als „blinde Passagiere” mitmachten, oder erst in hoher Luft vom Flugzeug überrascht wurden. Es wäre besonders interessant, wenn wir das letztere annehmen dürften; und tatsächlich hat es eine gewisse Wahrscheinlichkeit für sich. Denn acht der fünfzehn Exemplare gehören zu einer Art der Gattung *Hypocrepides*, die schon früher einmal, und zwar von der Expedition Ch. Alluaud und R. Jeanne, auf dem Kenya selbst angetroffen wurde, in einer Höhe, wo vermutlich heutzutage kein Flug-