

hoopvolle verwachting, kon deponeren. Zoo verliepen nog twee dagen.

Doch nu gebeurde er iets buitengewoons en onverwachts in dat gelukkige vogelleventje. Het mannetje verdween plotseling en kwam niet meer zingen op den tak van den perelaar vlak voor het open venster.

Wat was er gebeurd? Was het ten prooi gevallen aan een kat of een roofvogel? Was het mannetje ontrouw geworden? Niet denkbaar.

Het wijfje zocht eenige dagen lang trouw de omgeving af en riep onder angstig getjielp het verdwenen mannetje terug. De moeite was vergeefs, het was weg en bleef weg.

Wat mocht er dan toch met het diertje gebeurd zijn?

Toen de vrouw des huizes na eenige dagen vaststelde, dat het zwaluwenpaar haar gastvrije woning verlaten had en niet meer terugkeerde, werd het plankje weggenomen en het nestje, waar drie eitjes in lagen verwijderd.

Bij toeval werd er later nog iets ontdekt. Aan den muur hing een schilderij, die aan den onderkant door een paar nageltjes werd opgehouden om haar iets te doen overhellen. Deze schilderij was van de nageltjes afgeschoten.

De vrouw klom op een stoel en stelde de schilderij in haren vroegeren stand terug; maar wat schrok ze toen er iets wit-zwart achter uit schoot en op den vloer viel.

Het doode lichaam van de verdwenen zwaluw.

AUG. KENGEN.

TWEE NIEUWE WANTSEN UIT ZUID-LIMBURG

door A. M. Scholte S. J.

Van *Bathysolen nubilus* (Fall.) vond ik 19. 7. 34. een enkel wijfje aan den spoordijk te Schin op Geul in het lage gras. Het diertje is $6\frac{1}{2}$ mm, geelbruin van kleur met zwarte stippels en eenige lichtgele vlekken, zooals aan den rand van het halsschild, aan den top en de basishoeken van het schildje, en op de afwisselende strooken van het connexivum. Alleen met *Spathocera dalmani* (Schill.) kan het, oppervlakkig beschouwd, verwisseld worden, doch is ervan te onderscheiden door de veel bredere voorzijde van het halsschild en het zesde abdomensegment, dat aan weerszijden tot een driehoek is uitgetrokken.

Eveneens een wijfje van *Peritrechus angusticollis* (Shlb.) werd door Rector Cremers in het Schinvelder veenmos van 24. 12. 34. gevonden (cfr. 24ste Jaargang van dit Tijdschrift: afl. 1. p. 8). Het diertje kan verwisseld worden met een klein (4 mm) exemplaar van *Peritrechus geniculatus* (Hhn), doch heeft zeer dikke, knotsvormige sprietleden en een breeden roodbruinen band aan het proximale gedeelte der dijen. Ook in het bui-



Bathysolen nubilus ♀ vergr. 7 ×.



Peritrechus angusticollis ♀ vergr. 8 ×.

tenland is het zeer zeldzaam en ik vermoed, dat het nog lang bij ons een unicum blijven zal.

Bathysolen nubilus is echter verleden jaar door den Heer P. v. d. Wiel opnieuw in Zuid-Limburg gevonden.

DESCRIPTION OF NEW INDO-MALAYAN ACRIDIDAE

(ORTHOPTERA)

by

C. WILLEMSE

Part V.

(Continuation).

Genotype: *Perakia maculipennis* Ramme.

Perakia borneensis nov. spec.

♀: General coloration brown. Antennae reddish brown or brown, joints somewhat darker at their tips. Head and pronotum very coarsely punctate, brown, variegated with irregular yellowish brown or blackish spots.

Disc of pronotum with the sulci deep and very distinct, metazona somewhat expanded posteriorly.

Elytra and wings reaching the middle of abdomen, touching each other in the middle. Elytra with a basal dilatation at the anterior margin, broad, anterior and posterior margin narrowing apically, apex rounded; brown. Wings subcycloid, somewhat yellowish red at the base, slightly infumated, posterior margin infumated with brown.

Anterior and median legs brown, with irregular dark points and spots.

Hind femora not reaching the top of abdomen, brown, the upper and outer area with indistinct and incomplete transverse yellowish brown bands, inner and lower area red; kneelobes brown, arcus black.

Hind tibiae pilose, brown from above, red from below; spines with black tips. Hind tarsi brown. pulvilli sometimes white.