

EENIGE SOORTEN UIT DE LIMBURGSCH LEPIDOPTERENFAUNA

door

C. Franssen, Roermond.

Lycaena corydon: Vele entomologen meenen dat deze soort in Limburg algemeen voorkomt, welke meening echter onjuist is. Vooral de laatste jaren heb ik in het bijzonder aan deze soort mijne aandacht geschonken en ben tot de conclusie gekomen, dat ze uiterst sporadisch in Limb. voorkomt. Aug. 1918 werd door mij een paartje gevangen te Herkenbosch midden in een uitgestrekt heideveld. Dit is het eenigste ♀, dat in Limburg gevangen is. Beide ex. bevinden zich in het museum te Steijl. Hoewel ik drie jaren lang zocht naar *corydon*, kon ik de soort niet meer vinden, totdat ik in 1921 een nieuwe vindplaats ontdekte, namelijk te Posterholt. Hier kwam *corydon* voor op moerassige weilanden. De heer Lückert en ik vingen op deze vindplaats een 12 stuks, allen ♂♂. Verder vingen wij in 1921 de soort te Roermond, Swalmen, St. Odiliënberg en Maasniel. De heer Latiers deelde mij onlangs mede, dat hij jaren geleden één ex. ving te Tegelen. Hoewel ter Haar in zijn bekende werk schrijft, dat de soort „meer algemeen b. Valkenburg en Maastricht” voorkomt, betwijfel ik dit laatste, daar de heer Latiers op beide plaatsen veel verzameld heeft, doch *corydon* daar nooit heeft aangetroffen. Ook andere entomologen, welke in Zuid-Limburg langen tijd verzameld hebben, hebben de soort daar nooit aangetroffen. Na 1921 werd wederom geen enkel ex. dezer soort in Limburg gevangen. *Corydon* komt dus uiterst sporadisch voor en schijnt sommige jaren geheel te ontbreken. Opmerkelijk is, dat alleen ♂♂ gevangen worden behoudens de bovenvermelde uitzondering.

De ex. zijn allen zeer licht van kleur en komen veel overeen met de beschrijving, welke Seitz geeft voor *Lycaena corydon* var. *apennina*.

Agrotis castanea Esp. De gewone vorm van deze soort voor Limburg is *Agrotis castanea* Esp. var. *neglecta*. Sommige jaren is *neglecta* zeer zeldzaam, terwijl ze andere jaren zeer gewoon is. Veel zeldzamer is echter de type van *castanea*. Ze werd door mij voor het eerst gevangen in 1923 in verscheidene ex. te Maasniel, Aug. 1921 werd door mij één ex. van de zeer zeldzame ab. *cerasina* Fw. gevangen, terwijl ik in 1923 nog twee ex. dezer vorm wist te bemachtigen. Andere variëteiten uit Limburg zijn mij niet bekend. In Zuid-Limburg schijnt de soort te ontbreken.

Agrotis sobrina Bod.

Voor het eerst werd deze soort gevangen te Melick in 1923 door den heer Lückert en mij.

Op deze vindplaats was ze zeer gewoon. Andere vindplaatsen zijn St. Odiliënberg en Maasniel. Onbegrijpelijk is, dat *sobrina* op verschillende plaatsen zoo gewoon was, terwijl ze nooit te voren gevangen werd. De ex. variëren sterk in tint: De meesten zijn rood aangevlogen, doch ook meer grijsachtige ex. komen voor. Deze laatste gelijken veel op de beschrijving, welke Seitz geeft voor ab. *Grüneri* Guen.

Hadena funera Hein.

Funerea schijnt niet zoo zeldzaam te zijn als aanvankelijk gemeend werd. Vooral de laatste jaren is het mij gelukt meerdere ex. dezer soort te bemachtigen. Het eerste ex. in Limburg werd gevangen door den heer Latiers te Tegelen. Dit is langen tijd het eenigste bekende ex. uit Limburg geweest, tot dat ik in 1922 te Maasniel één ex. ving en in 1923 te samen met den heer Lückert een 16 tal stuks. Onlangs vernam ik van den heer de Haan uit Weert, dat ook daar ter plaatse *funerea* voorkomt.

De soort vliegt op moerassige weilanden en komt vooral laat in den avond op smeer. Aangezien de streek tussehen Maasniel en Tegelen (en ook Noordelijk van Tegelen) langs de Duitse grens overal vrijwel hetzelfde is, meen ik hieruit te besluiten, dat *funerea* in het heele gebied van Roermond tot Tegelen (en Noordelijk) langs de Duitse grens voorkomt.

De Limburgsche exemplaren variëren zeer weinig.

Celaena Hawthorthii curt.

Een der zeldzaamste noctuiden van Limburg is wel *Haworthii*. Het eerste Limburgsche ex. dezer soort werd langen tijd geleden door den heer Latiers gevangen te Roermond. In 1922 gelukte het den heer Lückert en mij een drietal stuks te vangen te Maasniel, terwijl wij in 1923 nog 8 ex. op dezelfde vindplaats wisten te bemachtigen. Alle ex. behooren tot de vastelandsvorm *erupta* Guen, terwijl ik één ex. bezit, dat roodachtig aangevlogen is en waar-schijnlijk een overgang is tussehen de type en *erupta* Guen.

Er zijn mij te Maasniel twee vliegplaatsen dezer soort bekend, doch op beide plaatsen komt ze slechts sporadisch voor.

Anehocelis lunosa Hw.

Het eerste Limburgsche ex. *lunosa* werd gevangen door den heer Lückert te Linne in 1921. In 1923 ving ik te Maasniel 2 ex., terwijl de heer Lückert op dezelfde vindplaats ook nog één ex. bemachtigde. De vlinder komt reeds zeer vroeg in de schemering op smeer en gelijkt zeer veel op *Orthosia pistacina* F. Men doet goed alle *pistacina*'s mede te nemen bij het smeren, daar *lunosa* bij avond zeer moeilijk te onderscheiden is van *pistacina*.