

- De Groote alona is de meest voorkomende soort van het geslacht en ook in Limburg zeer verspreid. Van belang is o.a. de vindplaats, 1.
21. *Alona costata*. G. O. Sars. Geribde alona. Deze soort vond ik op plaats 19.
 22. *Alona guttata*. G. O. Sars. Druppel alona. Deze kleinste alona-soort vond ik op de plaats 2, 14 en 19.
 23. *Alona tenuicaudis*. G. O. Sars. Dunstaart alona. De Dunstaart alona werd door mij alleen op plaats 13 aangetroffen.
 24. *Alona rectangula*. Deze veel op *Alona costata* gelijkende soort kwam voor op plaats 13 en 14.
Rhynchotalona. Norman. Langsnuit.
 25. *Rhynchotalona rostrata*. Koch. Spitse langsnuit. Deze soort trot ik aan op de plaatsen 14 en 25. Ze is in Noordbrabant vrij algemeen en zal dus ook in Limburg wel meer te vinden zijn.
 26. *Rhynchotalona falcata*. G. O. Sars. Omgebogen langsnuit. Deze soort trot ik alleen in den Heelder Peel aan, maar hier ook in groot aantal.
Leydigia. Kurz. Breedstaart.
 27. *Leydigia leydigii*. Schödler. Leydigs breedstaart. Dit dier komt in den Welter vijver voor. 14.
Leydigia acanthocercoides, Fischer, heb ik in Limburg nog niet aangetroffen.
Graptoleberis. G. O. Sars. Griffelschaal.
 28. *Graptoleberis testudinaria*. Fischer. Gewone griffelschaal. De Griffelschaal komt zeer verspreid in Limburg voor. 3, 7, 19, 27, 31.
Alonella. G. O. Sars. Dwergkreeft.
 29. *Alonella excisa*. Fischer. Streepgrond. Voor dit dier is weder de Heelder Peel, 22, tot nog toe mijn eenige vindplaats in Limburg.
 30. *Alonella exigua*. Lilljeborg. Gladgrond. Deze werd meer dan de vorige aangetroffen en wel op de plaatsen 16, 22 en 30.
 31. *Alonella nana*. Baird. Ronde dwergkreeft. Deze dwergkreeftsoort heb ik het meest algemeen van alle drie aangetroffen en wel op de plaatsen 6, 21, 23, 25 en 27.
Peracantha. Baird. Kamdrager.
 32. *Peracantha truncata*. O. F. Müller. Gewone kamdrager. De kamdrager behoort weer tot de meest algemeene taksprieten. Ik heb ze in stilstaand water bijna overal aangetroffen.
Pleuroxus. Baird. Vederrand.
Pleuroxus laevis. G. O. Sars. Gladde vederrand.
Pleuroxus striatus. Schödler. Gestreepte vederrand. Geen van beiden heb ik tot nog toe gevonden.
 33. *Pleuroxus trigonellus*. O. F. Müller. Driehoek vederrand. Dit dier werd aangetroffen op de plaatsen 3 en 13.
 34. *Pleuroxus uncinatus*. Baird. Wipneus. Dit door den naar boven omgebogen snuitpunt gekenmerkte dier vond ik op de plaatsen 13, 15, 24 en 25.
 35. *Pleuroxus aduncus*. Jurine. Haviksneus. Met de vorige soort vond ik dit dier in den vijver bij het kasteel Eysden. 3.
Chydorus. Leach. Bolkreeft.
 36. *Chydorus globosus*. Baird. Bruine bolkreeft. Deze grootste soort van haar geslacht kwam voor op de plaatsen 16, 17, 20 en 26.
 37. *Chydorus sphaericus*. O. F. Müller. Gewone bolkreeft. Ook deze soort komt verspreid voor over het gansch gebied.
 38. *Monospilus dispar*. G. O. Sart. Gewone eenoog. Dit bodemdier vond ik op de plaatsen 22, 24, 26 en 27. In den Heelder Peel vond ik exemplaren, die in afwijking aan den hoofdvorm drie dikke doornen aan de rugzijde van den eindklaus droegen. Deze afwijking is door mij het eerste beschreven.
Anchistropus. G. O. Sars. Vlekkreeft.
Anchistropus emarginatus. G. O. Sars. Uitgesneden vlekkreeft. Deze werd in Nederland nog niet aangetroffen.
Onychopoda.
Polyphemidea.
 39. *Polyphemus pediculus*. Linne. Gewone grootoog. Dit roofdier is zeer algemeen. Ik heb slechts vondsten opgeteekend van de plaatsen 22 en 27. Daar het echter zeer spoedig atsterft en vergaat, zal ik het wel meerdere malen over het hoofd hebben gezien en zal het ook in Limburg wel veel algemeener voorkomen.
Bythotrephes. F. Leidig. Diepzwemmer.
Bythotrephes longimanus. Leidig. Langarmige diepzwemmer. Ook dit dier is in ons land nog niet aangetroffen.
Leptodoridae.
Leptodora. Lilljeborg. Glaskreeft.
Leptodora Kindtii. Focke. Glaskreeft. De Glaskreeft, de langste onzer Cladoceeren komt voor in de Helenavaart bij Helenaveen, maar zal waarschijnlijk wel meer algemeen zijn in de kanalen in dat gedeelte der provincie.

G. ROMIJN.

Boomkikker.

De heer J. Nypels te Scharn-Heer meldt de vondst van een boomkikker aldaar, ± Juli van dit jaar.

De heer A. J. Mertens, hoofd der O. L. school te Nederweert, schrijft dat hij 't beestje meermalen gezien en gevangen heeft in de lage moerassige weilanden, met veel houtgewas, te Kelpen (Grathem). Ook de schoolkinderen brachten meermalen exemplaren mede.

J. C.