

# Een invasie van grote en kleine barmsijzen in het Vechtplasseengebied

Rob Moolenbeek



Grote Barmsijs

Afgelopen najaar kwamen vele duizenden barmsijzen uit het noorden (Scandinavië) het oosten (via de Baltische staten uit Noord-Rusland) naar ons land. In de maand november werden er bijvoorbeeld meer dan 6000 geringd in Ventas Ragas, Litouwen. Het merendeel van de vogels betrof de grote barmsijs (*Acanthis flammea flammea*). Echter het verschil tussen de grote en kleine barmsijs is niet zo eenvoudig. Er is al heel veel gepubliceerd over de diverse soorten c.q. ondersoorten, maar het blijft lastig.



Rob Moolenbeek Kleine Barmsijs

In mijn tuin in Ankeveen lukte het om in de maanden november, december en januari enige tientallen barmsijzen te vangen. En dan is in de hand het verschil meestal wel te zien, zeker als je ze gelijktijdig vangt. Hierbij wat foto's van de grote en kleine barmsijs. De kleine (*Acanthis cabaret*) is broedvogel in Nederland, maar dan wel voornamelijk in de duingebieden en op de waddeneilanden. Hij heeft een beperkt verspreidingsgebied dat loopt van het Verenigd Koninkrijk tot Zuid-Zweden en Centraal-Europa.

Rob Moolenbeek

Afgezien van een klein verschil in grootte zijn dit de belangrijkste verschillen die mij opvielen. Bij de kleine barmsijs is de kleur van de kop (wangen en nek) meer bruin en de lichte eindbanden op de armpendekveren en tertials (elleboogpennen) meer bruinachtig. Verder is ook de rug meer bruin en is de stuit meestal minder licht dan bij de grote barmsijs. Bij de grote barmsijs zijn de eindbanden op de armpendekveren en tertials bijna wit. Ook lijken de wangen van de grote lichter te zijn. In het veld valt het meestal niet mee om barmsijzen goed in beeld te krijgen. Ze foerageren hoog in de bomen, vaak op elzenproppen en dergelijke. Maar mocht het u lukken om ze op de voertafel te krijgen let dan op bovengenoemde kenmerken. Aan de vorm van de staartveren kunt u dan ook zien of het een jonge of adulte vogel is. Bij jonge vogels zijn de staarteinden puntig en bij de adulte vogels meer afgerond. Het verschil tussen man en vrouw is ook lastig. Vooral bij jonge vogels. Meestal hebben mannen iets meer rood op de kop en zijn er roze veren op de bovenborst. Kortom, het is niet altijd eenvoudig om beide soorten te scheiden en het verschil tussen man en vrouw bij jonge vogels is ook lastig te zien. Mededeling VRS het Gooi no. 31



v.l.n.r  
Kleine en Grote barmsijs  
Rob Moolenbeek