

Korte mededelingen Korte mededelingen Korte me

Waarnemingen van *Zygaena viciae* (Lepidoptera: Zygaenidae)

In het oktobernummer van Entomologische Berichten wordt *Zygaena viciae* (Denis & Schiffermüller) als nieuw voor de Nederlandse fauna gemeld door Groenendijk & Van Oosterhout (1998) op basis van waarnemingen in de periode 1995-1997. De vindplaats is gelegen tussen Wijlre en Simpelveld in Zuid-Limburg.

In het verenigingsnieuws van juli 1996 (Koomen, 1996) heb ik *Zygaena viciae* echter reeds gemeld als nieuw voor de fauna uit Limburg onder de naam *Zygaena meliloti* (Esper). Deze waarneming is door Groenendijk & Van Oosterhout (1998) mogelijk over het hoofd gezien als gevolg van de door mij gebruikte naam voor dit bloeddrupje op basis van Forster & Wohlfahrt (1960).

Zygaena viciae werd door mij op 6 juli 1994 voor het eerst in Nederland waargenomen ten zuiden van Maastricht. Op 7 juli 1995 zag ik de soort bij Vaals. In dat zelfde jaar, op 30 juni en 6 juli, vloog een grote populatie van honderden exemplaren net over de grens in België nabij zuidwestelijk Zuid-Limburg, en wel op een ruderaal terrein in de omgeving van Ternaaien (Lanaye). Op 26 juli 1996 verzamelde ik *Zygaena viciae* opnieuw te Vaals. Kennelijk komt *Z. viciae* de laatste jaren op meerdere plaatsen in Zuid-Limburg voor.

Literatuur

- GROENENDIJK, D. & F. VAN OOSTERHOUT, 1998. *Zygaena viciae* nieuw voor de Nederlandse fauna (Lepidoptera: Zygaenidae). – *Entomologische Berichten, Amsterdam* 58: 201-204.
- KOOMEN, P., 1996. Verslag wintervergadering NEV 10 februari 1996 te Utrecht. – *Entomologische Berichten, Amsterdam* 56: xxxvii-xxxix.
- FORSTER, W. & TH. A. WOHLFART, 1960. *Die Schmetterlinge Mitteleuropas. Band III. Spinner und Schwärmer*: 1-239. Franckh'sch Verlagshandlung, Stuttgart.

D. A. Vestergaard, Van Goyenlaan 158,
3764 XM Soest.

De steltvlieg *Cnodacophora stylifera* nieuw voor Nederland (Diptera: Micropezidae)

In een monster uit een malaiseval van het museum Naturalis te Leiden vond ik een mannetje van de steltvlieg *Cnodacophora stylifera* (Loew). Het dier werd gevangen in de periode van 20 tot 27 juli 1998 te Groede (Zeeland) in de Groedsche Duintjes (Amersfoortcoördinaten 022-380) en is opgenomen in de verzameling van het museum.

Deze soort wordt van de omringende landen slechts vermeld van Groot-Brittannië (Schotland) en Zweden, en verder is ze bekend uit Oost-Siberië en Mongolië (Soós, 1984). Loew beschreef haar van Kultuk aan de zuidpunt van het Baikalsee (51°46' noorderbreedte). Stackelberg (1970) schrijft dat deze soort mogelijk in de middenstrook van Europees Rusland voorkomt en doet dat waarschijnlijk op grond van Siberische vondsten. Deze zone komt overeen met het deel van Europa waarin ook Nederland ligt.

Men kan *Cnodacophora stylifera* determineren met de spillebeenvliegtabel van Van der Goot in Van der Goot & Van Veen (1996). In dit boekje staan de mannelijke genitaliën van *C. sellata* (Meigen) afgebeeld, die identiek zijn aan die van *C. stylifera*. Deze laatste is 4,5-6 mm lang, de borststukrug is deels glimmend zwart en het tweede sprietlid is geel. *Cnodacophora sellata* is 6-8 mm lang met effen grijze borststukrug en zwartachtig tweede sprietlid.

Literatuur

- GOOT, V. S. VAN DER & M. P. VAN VEEN, 1996. *De spillebeenvliegen en wolzwevers van Noordwest-Europa*: 1-57. Jeugdbondsuitgeverij, Utrecht.
- SOÓS, Á., 1984. Micropezidae. In: *Catalogue of Palaearctic Diptera* (Á. Soós & L. Papp eds) 9: 19-24. Elsevier, Amsterdam.
- STACKELBERG, A. A., 1970. Calobatidae. In: *Determineertabellen voor de insecten van het Europese deel van de U.S.S.R.* (L.J. Bei-Bienko ed.): 112-114. Nauka, Leningrad [Russisch].
- V. S. van der Goot, N. Anslinstraat 42,
1068 WN Amsterdam.