

Korte mededelingen Korte mededelingen Korte me

Interessante Zeeuwse wantsenvangsten in 1992

In 1992 werden tijdens een veertiendaags verblijf in het westelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen een aantal vermeldenswaardige wantsen waargenomen. *Rhopalus tigrinus* Schilling, *Eurydema ornatum* (Linnaeus) (beide nieuw voor de Nederlandse fauna) en *Miridius quadrivirgatus* (Costa) worden elders behandeld (Aukema, 1993a, 1993b). Hier volgt een overzicht van de overige interessante vondsten, waaronder zes soorten die nog niet eerder uit de provincie Zeeland vermeld werden (zie Aukema, 1989).

Miridae

Psallus salicis (Kirschbaum) werd in aantal met larven geklopt van zwarte els (*Alnus glutinosa* (L.) Gaertner) te Sluis (27.vii en 29.vii.1992) en Aardenburg (3.viii.1992). Nieuw voor Zeeland.

Van *Orthotylus virescens* (Douglas & Scott) werden op 3 juli 1992 2 ♀♀ geklopt van brem (*Cytisus scoparius* (L.) Link) langs de weg tussen Aardenburg en St. Kruis. Nieuw voor Zeeland.

Agnocoris reclairei Wagner werd zowel in Sluis (26.vii.1992) als in Aardenburg (3.viii.1992) op zwarte els aangetroffen. Nieuw voor Zeeland.

Van *Polymerus nigrita* (Fallén) werd op 27 juli 1992 in Sluis één mannetje gesleept van kleefkruid (*Galium aparine* L.). Nieuw voor Zeeland.

Adelphocoris seticornis (Fabricius) werd sinds 1960 alleen nog in Midden- en Zuid-Limburg verzameld. Uit Zeeland is *A. seticornis* bekend van Hoek en Hoofdplaat in Zeeuws-Vlaanderen (Brakman, 1960), terwijl dezelfde auteur haar ook verzamelde in Zuid-Beveland (Nisse, 22.vii.1960, 1 ♀, coll. RMNH, Leiden). In Oostburg (De Munte) werd *A. seticornis* tussen 29 juli en 3 augustus 1992 in aantal gesleept van veldlathyrus (*Lathyrus pratensis* L.) in een ruig begroeide wegberm.

Lygaeidae

Peritrechus geniculatus (Hahn) werd op 31 juli 1992 verzameld langs het fietspad op de Zwindijk nabij Cadzand-Bad. Nieuw voor Zeeland.

Emblethis griseus (Wolff) was uit Nederland alleen bekend van één vindplaats in de duinen tussen Westkapelle en Domburg, die bovendien deel uitmaakt van de plaatselijke golf links en derhalve bedreigd wordt (Aukema, 1992). *Emblethis griseus* blijkt echter ook in Zeeuws-Vlaanderen voor te komen: eind juli en begin augustus was de soort massaal met larven aanwezig tussen de spaarzame pioniersvegetatie langs het recent gereconstrueerde fietspad op de Zwindijk bij Cadzand-Bad. In Sluis werd bovendien op 4 en 5 juli 1992 een vrouwtje van deze warmteminnende soort verzameld op het buiten de stadsmuren gelegen ruderaal terrein van het deels gesloopte jongenspensionaat St. Joseph.

Pentatomidae

Eysarcoris fabricii (Kirkaldy) kwam eveneens op het genoemde ruderaal terrein in Sluis voor: op 26 juli 1992 werd een larve verzameld, die op 1 augustus een volwassen vrouwtje opleverde. Nieuw voor Zeeland.

Literatuur

- AUKEMA, B., 1989. Annotated checklist of Hemiptera-Heteroptera of The Netherlands. – *Tijdschr. Ent.* 132: 1-104.
- AUKEMA, B., 1992. Interessante Zeeuwse wantsenvangsten (Hemiptera, Heteroptera). – *Ent. Ber., Amst.* 52: 121-127.
- AUKEMA, B., 1993a. *Rhopalus tigrinus* (Rhopalidae) en *Eurydema ornatum* (Pentatomidae) nieuw voor de Nederlandse fauna (Heteroptera). – *Ent. Ber., Amst.* 53: 19-22.
- AUKEMA, B., 1993b. Een nieuwe vondst van *Miridius quadrivirgatus* in Zeeland (Heteroptera: Miridae). – *Ent. Ber., Amst.* 53: 49-50.
- BRAKMAN, P. J., 1960. Zeeuwse Wantsenvangsten II. – *Ent. Ber., Amst.* 20: 21-25.
- Berend Aukema, Plantenziektenkundige Dienst, Sectie Entomologie, Postbus 9102, 6700 HC Wageningen.