

# *Oncomera femorata*, nieuw voor de Nederlandse fauna (Coleoptera: Oedemeridae)

A. P. J. A. TEUNISSEN

---

TEUNISSEN, A. P. J. A., 1993. *ONCOMERA FEMORATA*, NEW TO THE DUTCH FAUNA (COLEOPTERA: OEDEMERIDAE). – *ENT. BER., AMST.* 53 (10): 147-148.

*Abstract:* *Oncomera femorata* is recorded from The Netherlands for the first time. One specimen was caught near Heerde in the province of Gelderland.

Strausslaan 6, 5251 HG Vlijmen.

---

Van de heer B. van Aartsen ontving de auteur enkele kevers ter determinatie, waaronder een Oedemeridae van het genus *Oncomera* Stephens. Het betrof de soort *Oncomera femorata* (Fabricius), welke volgens Brakman (1966) niet bekend is uit Nederland. In de aanvullingen op deze lijst (Huijbregts & Krikken, 1985, 1988) wordt de soort eveneens niet voor ons land genoemd. Uit de aangrenzende gebieden wordt *O. femorata* door Lucht (1987) gemeld uit Duitsland met inbegrip van de voormalige DDR. Tsjecho-Slowakije, Oostenrijk, het noorden van Zwitserland, Oost-Frankrijk en de Benelux. Ganglbauer (1881) noemt als verspreidingsgebied Midden- en Zuid-Europa. Vasquez-Albalate (1985) geeft een groot deel van Europa, inclusief Engeland als verspreidingsgebied aan. De soort wordt als zeldzaam beschouwd.

*Oncomera femorata* werd naar alle waarschijnlijkheid op licht verzameld te Heerde (Gelderland) in de week van 14-21 september 1974 door de heer J. B. Wolschrijn. Dit exemplaar bevindt zich thans in het Nationaal Natuurhistorisch Museum (NNM) te Leiden. De kever, 13-18 mm lang, heeft opvallend smalle, parallelle en weke dekschilden, een geelbruine kleur en dunne lange voelsprietten. De kop is eveneens langgestrekt en de grote ogen puilen enigzins uit. Oppervlakkig beschouwd doet de kever denken aan een boktor.

Koch (1989) kenmerkt *O. femorata* als zijnde stenotoop en een nachtdier dat in bossen en aan bosranden op sterk geurende bloemen

te vinden zou zijn, waar het stuifmeel eet. Over het larvale stadium is volgens Vasquez-Albalate (1985) niets bekend.

*Oncomera femorata* wordt met grote regelmaat in het buitenland verzameld in licht- en malaisevallen door de heren A. C. Cox, H. W. van der Wolf, J. B. Wolschrijn en C. J. Zwakhals. De vangstdata voor Frankrijk (Ardèche, Drôme, Dordogne en Var) en Spanje (Huesca) zijn alle gelegen tussen 22 juni en 26 juli. Door mijzelf werd een aantal kevers verzameld in wijnvallen, welke op vijf tot zes meter hoogte waren opgehangen in eikebomen (*Quercus pubescens*) in de omgeving van Les Vans, Bois de Païolive (Frankrijk) op 22 juni 1986 en tussen 11 en 20 juli 1988.

De zeldzaamheid van de soort wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de nachtelijke levenswijze van de soort. Met bovengenoemde methoden wordt *O. femorata* echter (in het zuiden van Europa) regelmatig verzameld.

## Dankwoord

De auteur dankt de heren B. van Aartsen ('t Harde), A. C. Cox (Mook), H. W. van der Wolf (Nuenen), J. B. Wolschrijn (Twello) en C. J. Zwakhals (Arkel) voor het beschikbaar stellen van hun vangstmateriaal.

## Literatuur

- BRAKMAN, P. J., 1966. Lijst van Coleoptera uit Nederland en het omliggend gebied. – *Monogr. ned. ent. Ver.* 2: i-x, 1-219.
- GANGLBAUER, L., 1881. Bestimmungstabellen der europäischen Coleopteren. IVa. Oedemeridae. – *Verhandl. k.k. zool.-bot. Ges. Wien*: 97-116.

- HUIJBREGTS, J. & J. KRIKKEN, 1985. Overzicht van wijzigingen in de lijst van Nederlandse kevers (1966-1984). – *Nieuwsbrief EIS-Nederland* 16: 23-30.
- HUIJBREGTS, J. & J. KRIKKEN, 1988. Aanvullingen op de lijst van Nederlandse kevers (1985-1986). – *Nieuwsbrief EIS-Nederland* 18: 7-8.
- KOCH, K., 1989. *Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie* 2: 1-382. Goecke & Evers, Krefeld.
- LUCHT, W. H., 1987. *Die Käfer Mitteleuropas, Katalog*: 1-342. Goecke & Evers, Krefeld.
- VASQUEZ-ALBALATE, X., 1985. Consideraciones sobre algunos Oedemeridae nocturnos e la Peninsula Ibérica (Col.). – *Bolm. Soc. Port. ent.* 2: 351-357.

Geaccepteerd 7.v.1993.