

Korte mededelingen

Nieuwe melanistische vorm van *Cepphis advenaria* (Lepidoptera: Geometridae)

Op 21 juni 1989 ving ik op de Veluwe in de Loenermark een vlinder die ik opjoeg uit een gemengd loofbos met ondergroei van blauwe bosbes (*Vaccinium myrtillus* L.). Op het eerste gezicht kon ik de grijs-zwart gekleurde spanner niet thuisbrengen, hoewel de vleugelvorm me bekend voorkwam. Ik determineerde het dier als *Cepphis advenaria* (Hübner) f. *fulva*, doch voor alle zekerheid zond ik de vlinder aan de heer Lempke ter controle.

Deze deelde me mede dat tot nog toe slechts één verdonkerde vorm van *C. advenaria* was beschreven, nl. de bovengenoemde f. *fulva*; deze werd door Gillmer beschreven (*Arch. Ver. Freunde Naturg. Mecklenburg* 57: 183, 1903 [1904]) naar een exemplaar dat in 1902 bij Schwerin, Mecklenburg (Noord-Duitsland) was gevangen. De vorm wordt beschreven als eenkleurig donker geelbruin met als enige tekening de zwarte middelpunten op elke vleugel. Mijn exemplaar komt daarmee echter niet overeen. Het is egaal grijs-zwart, zij het ook weer met vier zwarte punten. De franje is echter bleekgeel met donkere blokjes op de aderen, zoals bij typische exemplaren. De onderzijde is eveneens van dezelfde zwarte kleur, maar het veld dat ligt tussen de basis en de buitenste dwarslijn is donkerder. Blijkbaar betreft het een nog onbekende melanistische vorm.

Op de hierbij geplaatste foto's is het verschil tussen de typische en melanistische vorm duidelijk zichtbaar.



Figs. 1-2. *Cepphis advenaria* (Hübner). 1, ♀ van de typische vorm (Apeldoorn, 31.v.1930, coll. Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Amsterdam); 2, melanistisch ♀ (Loenen, Veluwe, 21.vi.1989, coll. W. Oord). Foto's J. Huisenga.

Gaarne wil ik de heer Lempke hartelijk danken voor het vele werk dat hij voor de determinatie verrichtte, alsmede de heer Huisenga voor het maken van beide foto's.

W. Oord, Rembrandtkade 79, 7412 HE Deventer.