

De eerste Nederlandse waarneming van *Syrphus nitidifrons* Becker, 1921, buiten de Veluwe (Diptera: Syrphidae)

door

J. A. BOLDING & Th. ZEEGERS

ABSTRACT. — The first Dutch record of *Syrphus nitidifrons* Becker, 1921, outside the Veluwe [north-western part of the prov. of Gelderland] (Diptera: Syrphidae). This species has been captured near Amersfoort (prov. of Utrecht). The authors believe this species to be overlooked in some diluvial parts of the Netherlands.

Op het terrein van de begraafplaats Oud-Leusden, gemeente Leusden, provincie Utrecht, werd door J. A. Bolding op 20.VI.1984 een hem onbekende zweefvliegsoort uit de *Syrphus*-groep gevangen. Het dier werd spoedig daarna door de tweede auteur herkend als een vrouwtje van *Syrphus nitidifrons*.

Deze soort, die pas zeer recent als zodanig in Nederland herkend is, was tot nu toe alleen bekend van de Veluwe (Barendregt, 1983). Bovendien lag de laatst bekende vangdatum in de eerste decade van juni, zodat deze nieuwe vangst tevens later is dan alle voorgaande. Hierbij moet opgemerkt worden, dat de oude gegevens van Barendregt al sterk de indruk wekten dat althans de wijfjes ook later in juni nog wel moesten voorkomen. Bovendien was 1984 een vrij laat jaar, waarin soorten als *Parasyrphus punctulatus* (Verrall, 1873) ook later dan normaal voorkwamen (tot in midden juni).

Wij hebben sterk de indruk dat *Syrphus nitidifrons* meer in Nederland voorkomt dan nu doorgaans verondersteld wordt. Hoewel deze soort natuurlijk geenszins algemeen te noemen is, lijkt het toch onwaarschijnlijk dat hij wél op meerdere plaatsen op zowel de Noord- als de Zuid-Veluwe voorkomt, maar in het geheel niet op de Utrechtse Heuvelrug en andere zandgronden in Nederland.

Het verdient dan ook aanbeveling om ook juist buiten de Veluwe in het voorjaar de ogen wijd open te houden voor *Syrphus nitidifrons*. Zoals al eerder door Barendregt aangegeven is, kan men de soort het best zoeken in vrij open loofbossen of aan bosranden met bloeiende struiken als Lijsterbes, Vogelkers en Wilg. Het probleem van het zoeken naar *Syrphus nitidifrons* is dat de soort in vlucht doorgaans niet te onderscheiden is van *Parasyrphus punctulatus*. Het beste recept is dan ook iedere *Parasyrphus* te controleren op de zwarte middenstreep over het gezicht.

Het exemplaar van Leusden zal gedeponeerde worden in het Zoölogisch Museum, Amsterdam.

Graag willen wij de heer B. Brugge (Zoölogisch Museum, Amsterdam) bedanken voor zijn hulp bij het determineren, en de heer V. S. van der Goot (Amsterdam) voor het controleren van de determinatie.

LITERATUUR

- Barendregt, A., 1983. *Syrphus nitidifrons* Becker, 1921, from the Netherlands, with description of the male, and a key to the European *Syrphus* species (Diptera: Syrphidae). — *Ent. Ber., Amst.* 43: 59-64.

Kapelweg 85, 3818 BG Amersfoort.
Eikenlaan 24, 3768 EV Soest.