




Fig. 3, 4. Valve en aedeagus. 3. van *Borkhausenia fuscescens*; 4. van *Borkhausenia luridicomella*.

vankelijk ook werden gerangschikt. Bij het nauwkeuriger bekijken onder vergroting viel mij later op, dat ze niet overeenkwamen met deze soort. *B. fuscescens* heeft een zwarte kopbehaaringsring, terwijl de exemplaren die ik voor mij had, duidelijk een gele kopbehaaringsring bezaten. Bovendien waren de voorvleugels in vergelijking met die van *fuscescens*, langgerechter, glanzender en wat zuiverder grijs. Dit alles maakte duidelijk, dat ik met *B. luridicomella* te doen had (zie ook de beschrijving bij Spuler, 1906).

Een goed verschil is ook te zien in het genitaalapparaat. De aedeagus van *luridicomella* is slanker, met aan de top twee rijen kleine cornuti, terwijl dit orgaan bij *fuscescens* breder en korter is met één enkele vrij grote cornutus. Ook de valven verschillen iets van vorm, terwijl de clavus bij *luridicomella* veel sterker gebogen is dan bij *fuscescens*. Zie fig. 3-6.

De vliegtijd die door Palm (1978) voor Denemarken opgegeven wordt, is van eind juni tot eind augustus in twee elkaar overlappende generaties. Volgens deze auteur is de rups onbekend, maar leeft zij vermoedelijk in vogelnesten of verwelkte bladeren. Eckstein (1933) echter schrijft, dat ze leeft op Haagbeuk. De soort is van de meeste Europese landen bekend en nu dus ook van Nederland. Tot nu toe is ze echter nog niet op de Britse eilanden aangetroffen. Het verdient aanbeveling collectiemateriaal te controleren op de aanwezigheid van *B. luridicomella*.

LITERATUUR

- Eckstein, K., 1933. *Die Kleinschmetterlinge Deutschlands*: 1-223, pl. 1-32. Lutz, Stuttgart.
 Palm, E., 1978. De danske Oecophoridae. — *Lepidoptera, Saer Nummer* 4: 1-61, pl. 1-16.
 Spuler, A., 1903-1910. *Die Schmetterlinge Europas* 2: 1-523. (p. 347, 1906).

Moeregrebstraat 10, 4611 JC Bergen op Zoom.

CHLOROCLYSTA CHLOERATA (MABILLE) (LEPIDOPTERA: GEOMETRIDAE). Tijdens het doornemen van vroegere nummers van de Ent. Ber. voor aanvullingen van de Naamlijst en gegevens over voedselplanten stuitte ik op het artikel van G. R. Langohr in deel 37: 133-137 (1977) waarin hij de soort als nieuw voor de fauna vermeldt. Het toeval wil dat ik op 30.IV.1980 tijdens een excursie op de Sint Jansberg een rupsje heb gefotografeerd op *Prunus spinosa* L. (Sleedoorn), dat aan de beschrijving van Langohr voldoet. Het is de enige witachtige rups met dikke rode rugstreep die in de bloemen van Sleedoorn leeft, zodat geen verwarring met een andere soort mogelijk is. Dit was dus de tweede Nederlandse vindplaats voor de soort.

R. de Man, Meijhorst 64-21, 6537 LE Nijmegen.