

- Liston, A. D., 1982. Einige interessante und für die Fauna Holsteins (BRD) neue Blattwespen (Hymenoptera, Symphyta). — *Ent. Nachr. Dresden* 26: 73-74.
- Muche, W. H., 1969a. Die Blattwespen Deutschlands II. Selandriinae. — *Ent. Abh. Mus. Tierk. Dresden* 36, suppl. 2: 61-96.
- , 1969b. Die Blattwespen Deutschlands III. Blennocampinae. — *Ent. Abh. Mus. Tierk. Dresden* 36, Suppl. 3: 97-155.
- , 1977. Nachtrag. — *Ent. Abh. Mus. Tierk. Dresden* 41 Suppl.: 20.
- Ooststroom, S. J. van, 1976. De Nederlandse Symphyta (halm-, hout- en bladwespen). Naamlijst. — *Wet. Meded. K. ned. natuurh. Veren.* 114: 1-24.
- Oudemans, J. T., 1894. Naamlijst van Nederlandsche Tenthredinidae. — *Tijdschr. Ent.* 37: 89-152.
- Teunissen, J., 1970. Soorten en variëteiten van bladwespen, nieuw voor de Nederlandse fauna (Hymenoptera, Symphyta). — *Ent. Ber., Amst.* 30: 164-166.

Guldenvliesstraat 19, 5211 AM 's-Hertogenbosch.

---

ARASCHNIA LEVANA (LINNAEUS) IN DE ZAA NSTREEK (LEP.: NYMPHALIDAE). In het goede vlinderjaar 1982 werd het Landkaartje door mijn broer en mij voor het eerst in de Zaanstreek waargenomen en wel in het Jagersveld, een 150 ha groot gebied, gelegen tussen de Coentunnelweg, de snelweg Amsterdam-Purmerend en de nieuwbouwwijk Het Kalf (atlasblokken 25-1433 en 34). Vijf van de in totaal acht waarnemingen werden in de nabijheid van boomgroepen gedaan, tweemaal bij een bosje van Grauwe wilg (*Salix cinerea* L.) langs de Coentunnelweg, éénmaal langs een laan van aangeplante Schietwilgen (*S. alba* L.) en tweemaal in een uit diverse soorten bestaand wilgenbroekbosje op natte veengrond, omringd door een kruidenrijke rietruigte. De overige drie waarnemingen werden gedaan in de omvangrijke ruige kruidenvegetaties.

In mei werden drie exemplaren van de eerste generatie gezien, op 24 juli drie van de tweede en op 2 en 23.IX twee van de derde. Als voedselplanten voor de vlinders konden genoteerd worden: Akkerdistel (*Cirsium arvense* (L.) Scop.), Engelwortel (*Angelica sylvestris* L.) en Koninginnekruid (*Eupatorium cannabinum* L.).

Erik van der Hut, Hegermeer 14, 1509 HG Zaanstad.

---

EUBLEMMA OSTRINA (HÜBNER) (LEP.: NOCTUIDAE). Tot nog toe was slechts één exemplaar van deze kleine immigrant uit Nederland bekend, een ♂, dat 24.V.1958 te Overveen door J. H. Kuchlein werd gevangen (*Ent. Ber., Amst.* 19: 135, 1959). Tot mijn verrassing trof ik in de collectie van wijlen de heer M. H. A. Melchior (nu in het Instituut voor Taxonomische Zoölogie te Amsterdam) een mooi gaaf ♀ aan, dat 31 mei 1978 te Beusichem gevangen was, waarschijnlijk op licht. Blijkbaar had hij er niet aan gedacht de soort op zijn lijst van trekwaarnemingen voor dat jaar te vermelden. Opvallend is ook nu weer de vroege datum.

Op de Britse eilanden, bijna altijd een veel gunstiger gebied voor immigranten, werd in 1978 geen *ostrina* waargenomen, wel in 1977, toen er drie op verschillende plaatsen in het zuiden van Engeland werden aangetroffen, alle in de eerste week van maart, blijkbaar meegekomen met een warme luchtstroom uit west Spanje of van de Canarische eilanden (C. G. M. de Worms, *Entomologist's Rec. J. Var.* 90: 133, 1978).

B. J. Lempke, Plantage Middenlaan 64, 1058 DH Amsterdam.