

## **Rabocerus gabrieli (Gerhardt), nieuw voor de fauna van Nederland (Col.: Salpingidae)**

door

B. J. van VONDEL

**ABSTRACT.** — *Rabocerus gabrieli* (Gerhardt), new to the fauna of the Netherlands (Col.: Salpingidae). The new record is based upon a single specimen collected in the province of Limburg.

Bij het bekijken van materiaal van enige minder vaak door mij bestudeerde families in mijn collectie stuitte ik op een exemplaar van *Rabocerus gabrieli* (Gerhardt), verzameld door H. van der Werf te Schin op Geul op 18.X.1975. De soort was reeds in 1978 door mij gedetermineerd, doch ik had mij niet verder verdiept in verspreiding, biologie e.d. Bij nader onderzoek blijkt zij echter nog niet eerder uit Nederland gemeld te zijn en ook verder in Noord- en Midden-Europa wordt zij als zeldzaam beschouwd. Horion (1956: 41) meldt de tot dan bekende verspreiding. Op bijgaand kaartje heb ik ingetekend waar dit verspreidingsgebied Nederland het dichtst nadert. Het gebied heeft een uitloper naar België (Hautes Fagnes), waarvan de punt nu dan tot in Nederland doorloopt. Over de biologie zegt Horion (l.c.) o.a. dat de kevers leven op of onder de schors van oude of afstervende loofbomen zoals Berk, Beuk, Eik, Els, Esdoorn, Iep en Linde. Over de nauwverwante *Rabocerus foveolatus* (Ljungh) zegt Reitter (1911: 417): „Schmarotzt bei verschiedenen im dürren Holze bohrenden Insekten”. Van het hier besproken exemplaar heb ik niet kunnen achterhalen onder welke omstandigheden het gevangen is, waarschijnlijk is het van planten geslept, doch wellicht parasiteert het eveneens op in dood hout borende insecten.




Fig. 1. *Rabocerus gabrieli* (Gerhardt), schaal in mm.




Fig. 2. Verspreidingsgrens van *Rabocerus gabrieli* (Gerhardt).

Gezien de, zeker op het eerste gezicht, grote gelijkenis met soorten van het genus *Salpingus* lijkt het mij niet uitgesloten, dat in de Nederlandse collecties exemplaren van *Rabocerus gabrieli* en *R. foveolatus* (ook nog niet uit Nederland bekend, doch in Noord- en Midden-Europa minder zeldzaam) onder de namen *Salpingus castaneus* (Panzer), *S. ater* (Paykull) of *S. reyi* Abeille voorkomen.

#### LITERATUUR

- Horion, A., 1956. Faunistik der deutschen Käfer 5, Heteromera — *Ent. Arb. Mus. Georg Frey*: I-VIII, 1-336.
- Reitter, E., 1911. *Fauna Germanica, Die Käfer des Deutschen Reiches* 3: 1-436, pl. 81-128, Lutz' Verlag, Stuttgart.

Roestuin 78, 3343 CV Hendrik Ido Ambacht

TWEE VANGSTEN VAN TEMNOSTOMA VESPIFORME (LINNAEUS) UIT N.W.-OVERIJSEL (DIPTERA, SYRPHIDAE). Deze fraaie zweefvlieg wordt in het nieuwe boek van Van der Goot (De Zweefvliegen van Noordwest-Europa en van Europees Rusland, in het bijzonder van de Benelux, uitg. K.N.N.V.) vermeld als bekend uit Limburg en Twente, en van één vangst uit de Weerribben bij Kalenberg (♂, 25.VI.1973). Tijdens zomerkampen van de A.C.J.N. in de Wieden heb ik hem echter ook twee keer gevangen. De gevangen exemplaren bevinden zich nu in mijn privé collectie. Het eerste exemplaar, een ♀, is gevangen in de „Landen achter het Singel” bij Zwartsluis, op 6.VII.1979. Het andere exemplaar, een ♂, komt uit het bos bij het Kadoelermeer bij Vollenhove en is gevangen op 6.VII.1981.

De „Landen achter het Singel” zijn in 1973 en 1974 door de N.J.N. (vrij oppervlakkig) geïnventariseerd, maar *T. vespiforme* is toen niet waargenomen (Barendregt, *Ent. Ber.*, Amst. 40: 164).

Klaas Veenstra, Zwolseweg 68, 7412 AP Deventer.