

- Curtis, J., 1824-1840. *British Entomology*, London.
- Fabricius, J. C., 1775. *Systema entomologiae*: 1-832, Korte, Flensburgi et Lipsiae.
1793. *Entomologia systematica* 2: 1-519, Proft, Hafniae.
- 1798, *Supplementum Entomologiae Systematicae*: 1: 572, Proft et Storch, Hafniae.
1804. *Systema Piezatorum*: 1-439, Reichard, Brunsvigae.
- Foerster, A., 1862. Synopsis der Familien und Gattungen der Braconen. — *Verh. naturh. Ver. preus. Rheinl.* 19: 225-288.
- Gmelin, J. F., 1790. *Caroli a Linné Systema Naturae* (ed. 13) 4: 1517-2224, Beer, Lipsiae.
- Haliday, A. H., 1840. Braconides. — *An introduction to the modern classification of insects. Synopsis of the genera of British insects* (J. O. Westwood, ed.) 2: 61-65, Longmann, London.
- Latreille, P. A., 1810. *Considérations générales sur l'ordre naturel des animaux composant les classes des crustacés, des arachnides, et des insectes*: 1-444, Scholl, Paris.
- Nixon, G. E. J., 1970. A revision of the N.W. European species of *Microplitis* Förster (Hym., Braconidae). — *Bull. Br. Mus. nat. Hist. Entomology* 25 (1): 1-30, figs. 1-29.
- Shenefelt, R. D., 1969. Braconidae, pt. 1. — *Hym. Cat. (nov. ed.)* 4: 1-175.
1970. Braconidae, pt. 3. — *Hym. Cat. (nov. ed.)* 5: 307-427.
1973. Braconidae, pt. 5. — *Hym. Cat. (nov. ed.)* 9: 669-812.
1975. Braconidae, pt. 8. — *Hym. Cat. (nov. ed.)* 12: 1115-1262.
1978. Braconidae, pt. 10. — *Hym. Cat. (nov. ed.)* 15: 1425-1872.
- Viereck, H. L., 1914. Type species of the genera of ichneumon flies. — *Bull. U.S. nat. Mus.* 83: 1-186.
- Zimsen, E., 1964. *The type material of J. C. Fabricius*: 1-656, Munksgaard, Copenhagen.

Postbus 9517, 2300 RA Leiden, The Netherlands.

---

LYMANTRIA DISPAR (LINNAEUS) (LEP.: LYMANTRIIDAE). Op 29 mei 1981 ging ik weer eens een kijkje nemen in het natuureservaat „de Groote Peel” bij Ospel. Sinds 1975 was ik er niet meer geweest. In dat jaar wemelde het er van de rupsen, vooral bij de ingang van het reservaat. *Lymantria dispar*, *Euproctis chrysorrhoea* (Linnaeus) en *Malacosoma neustria* (Linnaeus) waren er toen zeer talrijk en schadelijk. In het reservaat zelf was *Leucoma salicis* (Linnaeus) schadelijk op wilg. Nu, zes jaar later, was er niets meer van dit alles. Ik vond geen *chrysorrhoea*, *neustria* of *salicis* en slechts vier rupsen van *dispar*. Twee daarvan waren bepara-siteerd, de andere twee leverden een fraai paartje. Het hoeft geen betoog dat de bomen en struiken in het reservaat er fris en groen uitzagen. Rupsenvrij waren ze echter niet. Kennelijk had *Euproctis similis* (Fuessly) de opengevallen plaatsen opgevuld, want deze was nu heel ge-woon, vooral op wilg. *E. similis* heeft trouwens een goed jaar achter de rug: in het reservaat „Hatertse en Overasseltse Vennen” bij Nijmegen vloog de vlinder heel goed in juli.

Op 26 december 1981 heb ik de bossen van Lierop weer opgezocht om te kijken hoe het daar met *L. dispar* stond. Ik vond nu bijzonder veel dode rupsen en lege poppen aan de bomen, alsmede veel eilegels, die echter zonder uitzondering lege eitjes bevatten. Het hele beeld deed me sterk denken aan de situatie die Van Frankenhuyzen (*Ned. Boschb. Tijdschr.* 53: 344-347 (1981)) beschreef voor een bosgebied bij Venray. Ook hier was *dispar* een plaag, totdat in 1980 de kolonie gedecimeerd werd door een virusinfectie. Het lijkt erop dat dit ook bij Lierop gebeurd is, maar dan een jaar later. Wat er in „de Groote Peel” is voorgevallen, is nog ondui-delijk, maar misschien weten verzamelaars in het oosten van Brabant er meer van.

M. C. R. Franssen, Parklaan 20, 6074 CL Melick.

---