



Fig. 2. Gal van *Dasineura thomasiana* Kieffer op *Tilia vulgaris* Hayne te Opheusden.

kaalkapterreinen. Zij voeden zich meestal met grassen, maar kunnen onder bepaalde omstandigheden zich ook wel met andere planten voeden. Zij kunnen daardoor soms enige schade aan kiemplanten veroorzaken. Over het algemeen is dit echter van weinig betekenis en is een bestrijding niet nodig.

#### LITERATUUR

- Adams, R. G., 1978. The first British Infestation of *Reesa vespulae* (Milliron) (Col. Dermestidae). — *Entomologist's Gaz.* 29: 73-75, 1 Plate.
- Kurosawa, M., 1937. Descriptions of four new Thrips in Japan. — *Kontyû* 9 (3): 266-275, 1 Plate.
- Lindinger, Leonhard, 1910. Afrikanische Schildläuse IV. Kanarische Cocciden, ein Beitrag zur Fauna der Kanarischen Inseln. — *Jahrb. Hamb. wiss. Anst.* 28, Beih. 3: 1-38, 3 Tafeln.

Geertjesweg 15, 6703 BJ Wageningen

---

**DIEFSTAL VAN LEPIDOPTERA.** In het weekeinde van 3 maart jl. zijn uit het atelier van de heer H. Stammeshaus acht laden met voornamelijk Indonesische Lepidoptera gestolen. Wie materiaal onder ogen krijgt, waarvan hij vermoedt dat het van deze diefstal afkomstig is, wordt verzocht contact op te nemen met de heer Stammeshaus, Grensstraat 15, 1091 SV Amsterdam, tel. 020-940634, of met de politie.