

licht bruingrijs. Het exemplaar werd op 4 oktober 1968 te Vlodrop gevangen als imago. De vliegtijd valt volgens de literatuur van augustus tot mei. De soort overwintert dus als volwassen insect.

Als biotoop wordt door Palm opgegeven: droge plaatsen en open plekken in bossen, maar ook wel elders, daar *emeritella* zwerft. Toen Stainton de soort beschreef (1849) kende hij geen exemplaar uit Engeland. In 1861 echter gaf hij een uitvoerige beschrijving van *emeritella* met gekleurde afbeeldingen van vlinder en rups (pl. 7) en vermeldde toen, dat een exemplaar in Engeland gevangen was. Hij schrijft dat de rups eind juni-begin juli leeft tussen de samengesponnen bladeren van Boerenwormkruid (*Tanacetum vulgare* L.). Hoewel hij dit niet vermeldt, heeft hij de rups en de kennis van de biologie (die door praktisch alle latere auteurs herhaald wordt) ongetwijfeld te danken aan Senator C. H. G. von Heyden, die de soort bij Frankfurt am Main ontdekt had en de rups had gekweekt. Ook was de vlinder toen al bekend van Hannover (zie ook Zeller, 1854: 322-324). Hannemann (1953, pl. XIX, fig. 102) beeldt het genitaalapparaat van een ♂ van de Pfalz af. Grabe (1955: 90) vermeldt diverse vangsten in Westfalen en in het Ruhrgebied, waar ook rupsen gevonden werden.

In Denemarken is de soort pas ruim een tiental jaren bekend en was er de eerste 5-6 jaar uiterst zeldzaam. Nu is *emeritella* plaatselijk op Bornholm en Sjaelland een gewone verschijning. Van Jutland is tot nog toe maar één exemplaar bekend.

Gaarna dank ik de heer B. J. Lempke voor het bevestigen van de determinatie en voor zijn bereidwillige hulp bij het opzoeken van literatuurgegevens, alsmede de heer J. Huisenga voor het vervaardigen van de foto.

#### LITERATUUR

- Grabe, A., 1955. Kleinschmetterlinge des Ruhrgebietes. — *Mitt. Ruhrlandmus. Stadt Essen* 177: I-XV, 1-159.
- Hannemann, H. J., 1953. Natürliche Gruppierung der Europäischen Arten der Gattung *Depressaria* s. l. (Lep. Oecoph.) — *Mitt. zool. Mus. Berlin* 29: 269-372, 21 pl., 1 fig.
- Palm, E., 1973. De danske depressarier. — *Lepidoptera*, suppl. 1: 1-61, pl. 1-4, 1-18.
- Stainton, H. T., 1849. On the species of *Depressaria*, a Genus of Tineidae and the allied Genera *Orthotaelia* and *Exeraetia*. — *Trans. ent. Soc. Lond.* 5: 151-173.
- , 1861. *The natural history of the Tineina* 6: I-VII, 1-283, pl. 1-VIII. John van Voorst, London.
- Zeller, P. C. Z., 1854. Die Depressarien und einige ihnen nahe stehende Gattungen. *Linn. Ent.* 9: 189-403, pl. II-III.

Huybergseweg 24, 4631 GE Hoogerheide.

---

SPHAEROPHORIA ABBREVIATA ZETTERSTEDT. De vorm, indertijd door mij ontdekt tussen het Nederlandse materiaal van *S. picta* (Meigen) sensu Bańkowska (*Ent. Ber., Amst.* 31: 176-177, 1971) is inmiddels tot soort verheven en als *S. abbreviata* voor ons land vermeld door Torp Pedersen (*Ent. Meddr.* 41: 28, 1973). Van deze soort zijn de volgende vindplaatsen: Duurswoude, Veenhuizen, Noordoostpolder, Ermelo, Otterlo, Wooldse Veen, Leusden (Trekermeer), Best, Beegden en Bunder Bos. Data van 20.IV-23.VIII. De in Nederland wat minder talrijke naaste verwant *S. interrupta* (J. C. Fabricius) bleek afkomstig te zijn van Noordoostpolder (S 66), Gelderse Vallei tussen Veenendaal en Wageningen, Amsterdamse Bos, Bodegraven, Den Haag, Best, Oirschot, Nuenen en Budel. De Noordoostpolder stond per abuis onder *S. menthastri* (Linnaeus) sensu Bańkowska. Data van 24.IV-30.VIII. Dit alles betreft (bijna) uitsluitend materiaal van vindplaatsen van *S. picta* (Mg.) sensu Bańkowska reeds ter sprake gekomen in mijn publicatie van 1971, waarvan ik maar een gedeelte (30 ♂♂) voor de tweede maal heb bekeken.

V. S. van der Goot, N. Anslijnstraat 42, 1068 WN Amsterdam.