

REFERENCES

- Ball, I. R., 1975. Nature and Formulation of Biogeographical Hypothesis. — *Syst. Zool.* 24: 407—430.
- Coryndon, S. C. & R. J. G. Savage, 1973. The origin and affinities of African mammal faunas, *Organisms and continents through time. Special Papers in Paleontology*, 12 (Systematics Association Publ. 9): 121—136.
- Schmithüsen, J., 1976. *Atlas zur biogeographie*. — B. I.-Hochschulatlanten 303, Bibliographisches Institut, Mannheim.
- Smith, A. G. & J. C. Briden, 1977. *Mesozoic and Cenozoic Paleocoastal Maps*: 1—64, Cambridge University Press. P. Oosterbroek

POPE, R. D., 1977. A CHECK LIST OF BRITISH INSECTS. Part 3: Coleoptera and Strepsiptera (2nd revised edition). — 105 pp.

Dit is een nieuw deeltje uit deze ook voor de Nederlandse faunistiek onontbeerlijke reeks, uitgegeven door de Royal Entomological Society of London. De auteur, chef van de keverafdeling in het British Museum (Natural History), heeft er samen met enkele collega's jaren over gedaan om tot deze geheel gerevideerde naamlijst te komen, die, naar de vroegere auteurs, ook wel bekend staat als „Kloet & Hincks”. Pope c.s. hebben alle verwijzingen naar de eerste beschrijvingen van genera en soorten gecontroleerd, revisies zijn in de lijst verwerkt, etc. De familieclassificatie van Crowson (1968) is gevolgd. Het resultaat is een lijst van wetenschappelijke namen die nomenclatorisch nauwelijks kritischer kon zijn. Het onderzoek van Pope heeft zelfs tot verandering van een familienaam geleid: Scirtidae (= Cyphonidae, Elodidae, Helodidae, Dascillidae part.). Tal van namen waarmee problemen zijn of waren (vooral primaire homonymen) staan duidelijk aangegeven in de lijst zelf en in de zeer leerzame inleiding. Het al genoemde controleren van de originele beschrijvingen heeft, dunkt me, zoveel tijd en moeite gevraagd, dat daarvoor het nomenclatorische werk van anderen soms over het hoofd is gezien. Twee voorbeelden, één betrekking hebbend op een genusnaam, en één betrekking hebbend op een soortnaam. De Amerikanen gebruiken al jaren *Bolboceras* Kirby 1819 in plaats van *Odontaeus* Dejean 1821 (Geotrupidae), namelijk sinds Cartwright (1953, Proc. U.S. Nat. Mus., 103: 101); de type-soorten van beide namen zijn identiek. Door Pope en tal van anderen in Europa (ook in Die Käfer Mitteleuropas, 8: 274) wordt het jongere synoniem gebruikt. Misschien kan Pope zelfs nog beter *Odontaeus* Samouelle 1819 gebruiken, maar dat hangt af van de vraag of we voor dat werk („The entomologist's useful compendium”) een meer gedetailleerde publicatie-datum kunnen vinden. In de Halipidae mist Pope de hele geschiedenis rond *Halipus transversus* Thomson 1870, en gebruikt *H. heydeni* Wehnke 1875 (zie hiervoor bijv. Brinck, 1942, Kungl. fys. Sällsk. Lund Föreläs., 12 (11): 5). Er zijn natuurlijk nog wel meer dergelijke gebreken te vinden, maar ze vallen in het niet bij de hoeveelheid werk door Pope c.s. verzet. De nieuwe „Check List” geeft, in tegenstelling tot onze „lijst van Brakman”, geen verspreidingsgegevens (daarvoor moet men de andere Handbooks, voor zover verschenen, raadplegen). Het aantal Britse keversoorten bedraagt nu blijkbaar 3845, plus nog 15 soorten Strepsiptera.

Inmiddels heeft Pope op zijn lijst enkele aanvullingen en wijzigingen gegeven in het nieuwe Bulletin van de Londense entomologische vereniging, Antenna 1 (1977): 23—24, 53—54. Pope's naamlijst is voor de prijs van ca £ 8.25 bij de Royal Entomological Society of London te koop, of bij hun agent E. W. Classey, Faringdon, Oxon. — J. Krikken.

LOZOTAENOIDES FORMOSANA (GEYER) IN DE AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN (LEP., TORTRICIDAE). Deze soort, die in 1959 voor het eerst hier te lande werd waargenomen en sindsdien van steeds meer plaatsen wordt vermeld, blijkt nu ook in de A.W.D. voor te komen. Op verschillende plaatsen verschenen de vlinders op de hiernagenoemde data op de lamp: 13 juli 1976, 1 ex.; 31 juli 1976, 1 ex.; 16 juli 1977, 1 ex.; 6 augustus 1977, 4 exx. Verscheidene dieren waren prachtig gaaf en konden onmogelijk grote afstanden hebben afgelegd.

Het is te hopen, dat de soort zich in ons land zal kunnen handhaven. Bij alle verschijnselen van achteruitgang van de fauna is dit een fraaie aanwinst!

I. A. Kaijndoe, Regentesselaan 16, 2341 KP Oegstgeest.