

Anaspis (Anaspis) garneysi Fowler nieuw voor de Nederlandse fauna (Col., Mordellidae)

door

R. BATTEN

ABSTRACT. — *Anaspis (Anaspis) garneysi* Fowler is recorded for the first time from the Netherlands.

INLEIDING

Bij het revideren van de Mordellidae van het Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum) te Amsterdam, bleek dat deze collectie verschillende exemplaren bevatte van *Anaspis (Anaspis) garneysi* Fowler.

Everts (1922) meldde dat de soort voorkomt aan de Franse kust; Ermisch (1956) noemde Noordwest Europa: Engeland, Noord-Frankrijk, Denemarken, Zuid-Zweden, en later (1969) twee vondsten in het Rijnland (Duitsland). Nederland was tot dusver een witte plek op de kaart.

De soort lijkt op het eerste gezicht op *Anaspis (Anaspis) frontalis* (Linnaeus), doch wijkt daarvan duidelijk af door de vorm van de sprieten, de voortarsen en het aanhangsel van de derde sterniet. In de Amsterdamse collectie waren alle exemplaren als *frontalis* gedetermineerd, en wel twee exemplaren door D. Mac Gillavry, drie exemplaren door P. van der Wiel en de overige door onbekenden.

De Mordellidae van Nederland zijn door mij (1976) faunistisch bewerkt. Op de determinatietabel en het faunistische overzicht kunnen nu de volgende aanvullingen worden gegeven.

Aanvulling determinatie-tabel


- Op pagina 20 na (7) — Aanhangsels van 3e sterniet sterk gebogen, vaak verder reikend dan achterlijfspunt, toevoegen: 8
8. Dekschilden tweekleurig behaard, enz. *regimbarti* Schilsky (p. 32)
- Dekschilden eenkleurig behaard, anders gekleurde soorten. De aanhangsels van de 3e sterniet iets langer en anders gevormd. — Voelsprieten draadvormig, leden 4-7: lengte bijna twee maal de breedte, leden 8-10: korter en nauwelijks breder. Zwart, alle poten (behalve achterdijen), basale sprietleden, monddelen en clypeus geelrood. Voortarsen zwak verbreed, 1e lid bijna zo lang als 2e-4e lid samen. Aanhangsels van 3e sterniet aanliggend, nagenoeg recht naar het einde convergerend en reikend tot de achterlijfspunt (fig. 1) 3-3.5 mm *garneysi* Fowler (p. 32).

Aanvulling faunistisch overzicht

Anaspis (Anaspis) garneysi Fowler (2669). Na dit hoofd op pagina 32 aan het slot toevoegen:

Deze soort is volgens de hiervoor vermelde literatuur van Everts en Ermisch, alsmede Buck (1954) steeds gevangen op meidoorn (*Crataegus*). Bij de hierna vermelde vangsten is geen opgave van welke plant de kever is gevangen; voorzover vangdata zijn vermeld, vallen deze in de maand mei (1 exemplaar in maart), de laatste vangst dateert uit 1948. In totaal elf exemplaren gezien.

Vindplaatsen. — Gelderland: Wamel. Utrecht: Breukelen. Noord-Holland: Amsterdam, Texel, Den Burg (Texel). Zuid-Holland: Rotterdam, Den Haag, Leiden. Een overzicht geeft fig. 2.



Figs. 1-2: 1. Sternieten van *Anaspis garneysi*; 2. Verspreiding van *A. garneysi* in Nederland.

DANKZEGGING

Vanaf deze plaats dank ik Dr. J. P. Duffels van het Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum) te Amsterdam voor het beschikbaarstellen van het materiaal, alsmede voor het afstaan van een exemplaar voor mijn collectie.

LITERATUUR

Voor een opgave van de literatuur, die hierboven genoemd wordt, verwijs ik naar: Batten, R. 1976. De Nederlandse soorten van de keverfamilie Mordellidae. *Zoöl. Bijdr.* 19: 1-37, figs. 1-43, 2 platen (= Bijdragen tot de Faunistiek van Nederland, IV). Spreucklaan 3, 4333 HC Middelburg.

GUNST, J. H. DE, 1978. DE NEDERLANDSE LIEVEHEERSBEESTJES (COLEOPTERA-COCCINELLIDAE). Wetensch. Meded. Kon. Nederl. Natuurh. Veren. 125: 1—120; 106 figs, 220 refs. Bureau KNNV, Hoogwoud. Gebrocheerd, prijs f 8,50.

Dit is waarschijnlijk de dikste WM die tot nu toe is uitgekomen en zonder twijfel is het een van de beste. Lieveheersbeestjes hebben van oudsher folkloristisch, systematisch, faunistisch en niet te vergeten genetisch de aandacht getrokken, en al deze aspecten krijgen ruim de aandacht. Er zijn uitvoerige tabellen en uitstekend geïllustreerde beschrijvingen, en bovenal uitgebreide reeksen schetsen waaruit de variabiliteit van de vlekken-tekening naar voren komt. In de inleiding wordt kort maar goed de anatomie van kevers besproken, en de techniek van het maken van een genitaal preparaat. Van iedere soort worden details gegeven van levenswijze en verspreiding in Nederland. De kwaliteit van de tekeningen is bijzonder goed. Dit is een kostelijke uitbreiding van de Nederlandse entomologische literatuur, die naar ik hoop velen zal stimuleren aandacht te besteden aan deze opvallende en interessante insecten. — W. N. Ellis.