

Limnephilus hirsutus (Pictet). Zeldzaam in stilstaand water. Bekend uit Limburg en Zeeland. Oudemolen, lichtvangst, 18.VII.1972, 1 ♂; 1.VIII.1973, 4 ♂, 1 ♀; 26.VIII.1973, 2 ♂, 1 ♀; 5.VIII.1975, 4 ♂, 2 ♀.

Limnephilus incisus Curtis. Oudemolen, lichtvangst, 26.VI.1973, 1 ♂, 1 ♀; 5.VIII.1975, 1 ♂, 2 ♀.

Limnephilus lunatus Curtis. Oudemolen, lichtvangst, 7.IX.1972, 1 ♀; 26.VIII.1973, 1 ♂, 4 ♀.

Limnephilus luridus Curtis. Zeldzaam, in laagveenplassen. Oudemolen, lichtvangst, 18.VII.1972, 1 ♀; 1.VIII.1973, 3 ♂.

Limnephilus marmoratus Curtis. Oudemolen, lichtvangst, 18.VII.1972, 2 ♀; 7.VIII.1972, 1 ♂; 7.IX.1972, 14 ♂, 4 ♀; 26.VI.1973, 1 ♂; 1.VIII.1973, 3 ♂; 26.VIII.1973, 15 ♂, 8 ♀.

Limnephilus politus MacLachlan. Oudemolen, lichtvangst, 6.X.1972, 1 ♂.

Limnephilus rhombicus (Linnaeus). Oudemolen, lichtvangst, 7.VIII.1972, 1 ♂; 1.VIII.1973, 1 ♂; 5.VIII.1975, 2 ♀.

Limnephilus sparsus Curtis. Oudemolen, lichtvangst, 7.IX.1972, 2 ♂, 1 ♀; 18.V.1973, 1 ♀; 1.VIII.1973, 1 ♂; 26.VIII.1973, 10 ♂, 6 ♀; 5.VIII.1975, 1 ♂, 2 ♀.

Stenophylax permistus MacLachlan. In zuid Nederland vrij algemeen, elders lokaal voorkomend, in stromend water. Oudemolen, lichtvangst, 18.V.1973, 1 ♀.

Notidobia ciliaris (Linnaeus). Gasteren, Achterste Veen, 11.V.1972, 2 ♀.

Bereodes minutes (Linnaeus). Zeldzaam, ontwikkelt zich in stromend water. Gasteren, Achterste Veen, 11.V.1972, 1 ♂, 1 ♀.

LITERATUUR

Albarda, H., 1889. Catalogue raisonné et synonymique des Névroptères, observés dans les Pays-Bas et dans les Pays limitrophes. *Tijdschr. Ent.* 32: 211-376.

Fischer, F. C. J., 1934. Verzeichnis der in den Niederlanden und dem Nachbargebiete vorkommenden Trichoptera. *Tijdschr. Ent.* 77: 177-201.

Geijskes, D. C., 1940. Verzeichnis der in den Niederlanden vorkommenden Plecoptera mit einigen geschichtlichen, ökologischen und systematischen Bemerkungen. *Tijdschr. Ent.* 83: 3-16.

Geijskes, D. C. & F. C. J. Fischer, 1971. Een nieuwe naamlijst van de Nederlandse Trichoptera met een faunistische literatuurlijst vanaf 1934. *Ent. Ber., Amst.* 31: 235-244.

Kiauta, B., 1964. Notes on some field observations on the behaviour of *Leucorrhinia pectoralis* Charp. (Odonata: Libellulidae). *Ent. Ber., Amst.* 24: 82-86.

Moller Pillot, H. K. M., 1971. *Faunistische beoordeling van de verontreiniging in laaglandbeken*. Diss. Nijmegen.

Hengelo (Ov.), Beukweg 2 I.

LASPEYRESIA SERVILLANA (DUPONCHEL) (LEP., TORTRICIDAE). Bentinck & Diakonoff geven in hun monografie (1968: 79) bij de uit Nederland bekende vindplaatsen Limburg zonder nadere gegevens. Bij het materiaal uit de collectie-Van den Brandt, ondergebracht in het Instituut voor Taxonomische Zoölogie te Amsterdam, bevond zich een ♂ van Venlo, 21.V. Bovendien een ♂ van Vierssen, even over de grens, 25.V.1895, P. J. Schuijt leg. — B. J. Lempke.

RUPS VAN SPHINX LIGUSTRI LINNAEUS OP KAMPERFOELIE (LEP., SPHINGIDAE). De normale voedselplanten van op bomen en struiken levende rupsen zijn over het algemeen wel goed bekend. Toch blijkt niet zelden, dat een rups op een voor ons gevoel volkomen vreemde plant wordt aangetroffen en daarop ook uitstekend gedijt. Zo schreef de heer J. H. Stolk te Linschoten me, dat hij in 1976 in zijn tuin een rups van *Sphinx ligustri* op *Lonicera* L. aantrof, waarvan ook flink gegeten werd. Nu is deze voedselplant niet nieuw. Tutt geeft een hele lijst van in de literatuur vermelde planten en daarop komt ook Kamperfoelie voor (Brit. Lep. 4: 322, 1904). Maar het is wel goed als dergelijke opgaven weer eens bevestigd worden. — B. J. Lempke.