

Een nieuwe wegvesp in Nederland en België (Hymenoptera: Pompilidae)

door

Br. V. Lefeber

ABSTRACT. — Attention is drawn to a newly described species of Pompilidae, viz. *Arachnospila virgilabnormis* Wolf, 1976, collected in the southern part of the Netherlands and in Belgium.

Tussen de vele Pompilidae die ik in 1975 op de Maasduintjes tussen Bergen en Well ving bevonden zich enkele exemplaren die ik met geen mogelijkheid thuis kon brengen. De heer H. Wolf, Plettenburg, ontdekte dat het een nieuwe soort betrof, die hij ter ere van de ontdekker als *Arachnospila virgilabnormis* heeft beschreven. Van deze nieuwe soort zijn door Wolf (1976) diverse vindplaatsen opgegeven: Aayen (Nederlands Limburg, U.T.M.-coördinaten KC 91), 1 ♂ (holotype) en 1 ♀ (allotype), beide verzameld op 31.VII.1975, en 1 ♀ (paratype) verzameld op 30.VII.1975; voorts nog twee paratypen uit Well (Nederlands Limburg, KC 91), 1 ♂ op 9.VII.1975, en Gruitrode (Belgisch Limburg, FS 86) 1 ♂, 14.VI.1975, alle verzameld door Lefeber.

De nieuwe soort behoort tot de *abnormis*-groep. Voorlopig is hij slechts in de mannelijke sexe met zekerheid te herkennen. Voor de verschillenmerken met de verwante soorten *A. abnormis* (Dahlbom) en *A. bohembabnormis* (Wolf) verwijs ik naar de fraaie tekeningen van Wolf, die hier met toestemming van de auteur zijn overgenomen. De wijfjes zijn zeer moeilijk te onderscheiden van die van *A. trivialis* (Dahlbom). Het propodeum is iets ruwer gechagrineerd, zoals bij *A. pseudabnormis* (Wolf), en dus veel minder gechagrineerd dan bij *A. anceps* (Wesmael); evenals bij het ♂ is de derde radiale cel gemiddeld iets groter dan de tweede, zij het niet zo opvallend als bij *A. pseudabnormis*; en de pubescentie van gezicht, pronotum, pleuren en coxae is meer lichtgrijs dan grijsbruin zoals bij *trivialis*.

LITERATUUR

Wolf, H., 1972. Hymenoptera Pompilidae. *Insecta helvetica* 5: 1—176.

———, 1976. *Arachnospila virgilabnormis* n. sp., eine neue Wegvespe aus Holland und Belgien (Hymenoptera: Pompilidae). *Senckenberg. biol.* 57 (1): 61—62.

Brusselsestraat 38, Maastricht 5001.

PALAEODREPANA HARPAGULA (LINNAEUS) (LEP., DREPANIDAE). Eén van de zeer opvallende vlindervangsten in 1976 is ongetwijfeld die van een exemplaar van *Pal. harpagula* geweest. De heer F. J. van Oosterhout te Gulpen berichtte mij, dat hij op 10 augustus een exemplaar aldaar gevangen had. Dat is dan eindelijk de eerste vermelding na de vondsten door Heylaerts in de omgeving van Breda in de periode 1886—1888 (zie Cat. Ned. Macrolep. 2: (142) (1938)).

Een niet zo spectaculaire vangst, maar zeker ook vermeldenswaard, is die van een exemplaar van *Chloroclysta miata* (Linnaeus), eveneens te Gulpen, op 10.X.1976. De meeste vermeldingen van deze soort stammen uit Zuid-Limburg, maar ook daar komt *miata* toch slechts sporadisch voor. Overigens kende ik tot voor kort slechts één aanvulling op de in supplement 14 van de Catalogus (1967) vermelde gegevens: een exemplaar te Oostvoorne op 21.XI.1969 (D. Vestergaard). Onlangs echter trof ik in de collectie van wijlen G. Dijkstra Hzn (nu in het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden) een *miata* aan, die 10.IX.1961 op Terschelling gevangen was. Ze stond abusievelijk gedetermineerd als *C. siterata* (Hufnagel), maar van deze vroeger zeker niet zo zeldzame soort ken ik geen enkele moderne waarneming meer. — B. J. Lempke.