

Entomologische Notities VIII: Aanvullende gegevens over twee Cercopiden (Rhynchota, Homoptera) in Nederland

door

C. DE JONG

Sedert de publikatie in dit tijdschrift (*Ent. Ber.*, *Amst.* 15: 325—330, 1955) over in Nederland verzameld materiaal van *Haematoloma dorsatum* (Ahr.), welke soort oorspronkelijk bekend was van het Iberisch schiereiland, met latere vermelding uit Frankrijk, Duitsland en uiteindelijk via ZO-Nederland ook meer uit het centrale gebied, zijn er enkele gegevens bij gekomen.

1e *Haematoloma* blijkt geen vrouwelijk, maar een onzijdig woord te zijn, zodat de naam van de soort moet luiden: *Haematoloma dorsatum* (Ahr.).

2e *Haematoloma dorsatum* (Ahr.) is sedert het vorige bericht over deze soort verzameld te Bilthoven (Ut.) (op licht), Putten (G.), Garderen (G.), Hoge Veluwe (G.), oostelijk van Dwingelo (Dr.) en bij Kampina (N. Br.). De vangsten van Garderen en Putten dateren van 10 en 11 juni 1972 (Zomervergadering te Garderen), die van Dwingelo zijn van 9 en 10 juni 1974 (Zomervergadering te Dwingelo). De meeste vangsten betroffen slechts één exemplaar, zoals Putten, Bilthoven en Kampina, twee exemplaren bij Garderen en twee op de Hoge Veluwe (H. H. de Vuyst, 1966). De oogst te Dwingelo was veel gunstiger, nl. 22 exemplaren. Daarbij waren ook de verschillende kleurvormen vertegenwoordigd, nl.:

dorsatum Ahr. s.str., tien exemplaren (9 ♀, 1 ♂).

f. *quinquemaculatum* Germ., zeven exemplaren, alle ♀.

f. *lugens* Horvath, drie exemplaren (2 ♂, 1 ♀).

Verder bevatte deze vangst twee ♀ exemplaren, die ik bij f. *quinquemaculatum* moet onderbrengen, doch ze hebben een zwarte buik, terwijl die bij de andere exemplaren van deze vorm rood is (♀).

De dieren bij Dwingelo werden gevangen in een tamelijk wijd staande dennenaanplant van Staatsbosbeheer op *Molinia caerulea* (L.) Moench, het zg. pijpestrootje, dat daar in een overdadige ondergroei vormt.

Het ♂ exemplaar van Kampina (N.Br.), 6.V.1975, leg. D. A. Vestergaard, toont het patroon van f. *quinquemaculatum* Germ. De hierboven niet speciaal genoemde exemplaren behoren tot de nominaatvorm.

3e In dezelfde biotoop bij Dwingelo werden eveneens verscheidene exemplaren gevonden van *Cercopis vulnerata* Rossi. Ik verzamelde deze soort ook te Spier (Dr.) een paar km oostelijk van Dwingelo, en bij Linde in zuid-Drenthe, ten z.o. van Zuidwolde. Ook bij Winterswijk, Bilthoven en Den Dolder trof ik de soort in eenzelfde biotoop.

SUMMARY

New data on the distribution of *Haematoloma dorsatum* (Ahr.), and *Cercopis vulnerata* Rossi in the Netherlands.
Bilthoven, Bilderdijklaan 69.

LOZOTAENIODES FORMOSANA (FRÖLICH) (LEP., TORTRICIDAE). Van een vakantie te Zoutelande (Walcheren) bracht de heer J. J. van Oort ook een paar „micro's" mee. Hierbij was een exemplaar van bovengenoemde soort, dat op 28 juni 1974 op licht gevangen werd. Dat is dus de vijfde vindplaats die we nu in ons land kennen. Overigens strekt het Nederlandse areaal zich slechts uit over het kustgebied van Cadzand tot Oostvoorne, bijna geheel samenvallend met dat van *Aspitates ochrearia* (Rossi).

De nu bekende vliegtijd begint ook iets vroeger dan aangegeven wordt door Bentinck & Diakonoff (1968, *De Nederlandse Bladrollers*, p. 38). — Lpk.