

515.706412
E 61
Ent.

NOV 2 1976

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSE ENTOMOLOGISCHE VERENIGING

Officiële afkorting (World List): Ent. Ber., Amst.

Deel 36

1 juni 1976

No. 6

Adres van de Redactie:

B. J. LEMPKE, Plantage Middenlaan 64, Amsterdam 1004 — Nederland

INHOUD: P. OOSTERBROEK, *Nephrotoma lamellata* (Riedl, 1910) (Diptera, Tipulidae), nieuw voor de Nederlandse Fauna (p. 81). — A. DIAKONOFF, Aantekeningen over de Nederlandse Microlepidoptera 3 (Glyphipterigidae) (p. 82). — G. VAN ROSSEM, H. C. BURGER en C. F. VAN DE BUND, Schadelijke insekten in 1975 (p. 85). — GERFRIED DESCHKA, Lithocolletidae von Madeira (Lepidoptera) (p. 90). — Literatuur (p. 84: J. VAN DER VECHT; p. 87: W. N. ELLIS). — Korte mededeling (p. 87: Nieuwe aanwinsten voor de bibliotheek).

***Nephrotoma lamellata* (Riedel, 1910) (Diptera, Tipulidae), nieuw voor de Nederlandse Fauna**

door

P. OOSTERBROEK

Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum), Amsterdam

ABSTRACT

The first record of *Nephrotoma lamellata* (Riedel, 1910) for the Netherlands is discussed.

Van de in Europa zeldzame *Nephrotoma lamellata* (Riedel, 1910) geeft Mannheims in 1951 de volgende vindplaatsen: Tsjecho-Slowakije: Karlovy-Vary (Karlsbad), 1 ♂ (Type ex.), VI. Frankrijk: Fontainebleau, 1 ♂. Latvia (Letland): Liepaja (Libau, Kalwen), 1 ♂, 18.VI.1932. Uit latere notities in het archief van Mannheims blijkt dat de soort ook bekend is uit Duitsland, waaronder een copula paartje (Stuttgart, Chiemgau bei Wössen en Israëlsdorf).

De nu uit Nederland bekende exemplaren, 1 ♂ en 1 ♀, werden door N. van der Vliet op 7.VI.1952 verzameld te Nijmegen of omstreken en met nog een aantal *Nephrotoma*'s opgestuurd naar het Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum) te Amsterdam. Dat ze aanvankelijk niet als *N. lamellata* zijn herkend komt door het feit, dat deze soort zeer veel overeenkomst vertoont met *N. analis* (Schummel, 1833) en *N. flavipalpis* (Meigen, 1830). Bovendien was toendertijd het wijfje van deze soort nog niet bekend.

Buiten Europa komt *N. lamellata* voor in Oost-Azië en wel in Buiten-Mongolië, het Sikhote gebied ten noorden van Wladiwostok, Zuid Sachalin en de zuidelijke Koerilen.

Van de Europese exemplaren is het biotoop onbekend. Savtchenko (1973) schrijft over de Oostaziatische populaties: 'voornamelijk in loof- en gemengde bossen, soms in vochtige weiden'. De vliegtijd is zowel in Europa als in Oost-Azië de maand juni.

LITERATUUR

Mannheims, B., 1951. In E. Lindner: *Die Fliegen der Palaearktischen Region*, Fam. 15, Tipulidae, A. Westpaläarktische Arten: 56.

Savtchenko, E. N., 1973. *Fauna SSSR*, N.S. 105, Diptera 2 (5), Tipulidae: 56—58.