

Umänderung des Untergattungsnamens *Dimorphiella* auf *Dimorphotoma*

von

A. GRINBERGS

(Riga)

Im Jahre 1968 wurde von mir eine neue Untergattung *Dimorphiella* in der Gattung *Proisotoma* beschrieben. Wie es sich später erwies, war dieser Name preoccupiert (Ellis & Bellinger, 1973). Deswegen schlage ich für *Dimorphiella* Grinbergs, 1968, nec Valkanov, 1928, den Namen *Dimorphotoma* vor. Kurze Diagnose der neubenannten Untergattung:

Körperbau *Proisotoma*-ähnlich. Abd. V—VI dorsal getrennt. Furca gut entwickelt, Mucro dreizählig. Sexuell dimorph, darin bestehend, daß die Männchen auf den Körpersegmenten, dem Kopf und den Fühlergliedern kräftige, bräunlichgelbe Dornen von verschiedener Länge haben. Die Behaarung des Weibchens ist einheitlich, ziemlich kurz und ohne differenzierte Härchen.

Typus subgeneris: *Proisotoma (Dimorphotoma) muriphila* Grinbergs, 1968.

LITTERATUR

- Ellis, W. N. & P. F. Bellinger, 1973. An annotated list of the generic names of Collembola (Insecta) and their type species. *Monogr. ned. ent. Veren.* 7: 1—74.
- Grinbergs, A., 1968. Über die Collembolen der Sowjetunion. III. *Proisotoma (Dimorphiella) muriphila* n. subgen., n. sp. aus Novosibirsk. *Opusc. ent.* 33 (1—2): 139—142.

DAGVLINDERS IN 1974. Merkwaardig was dat ik niettegenstaande het slechte seizoen verschillende dagvlinders toch in redelijke aantallen aantrof.

Inachis io L. Vrij regelmatig gesignaleerd; het eerste exemplaar op 10.IV te Meijendel.

Aglais urticae L. Zeer matig, alleen op 13.VI tien verse exemplaren op bloeiende distels te Delft en verschillende op bloeiende *Sedum* eind augustus - half september.

Polyommatus icarus Rott. Zeer matig te Delft in de voorzomer, maar talrijk te Hoek van Holland op 24.VIII.

Polygonia c-album L. Vrij veel waargenomen in juli tot in het westen van Noord-Brabant: Helvoirt, Kaatsheuvel, Loon op Zand.

Limenitis camilla L. Vrij veel in juli op dezelfde vindplaatsen als de vorige soort.

Maculineaalcon L. Vrij talrijk te Hulshorst en Staverden op 7.VIII.

Gonepteryx rhamni L. Talrijk te Leuvenum, Hulshorst en Staverden in augustus.

Hipparchia statilinus Hufnagel. Op de Hoge Veluwe even talrijk als *semele*.

Pieris-soorten. Alle soorten meest matig in aantal. Te Delft op 18.IX op *Sedum* uitsluitend *P. rapae* L.

Coenonympha pamphilus L. Eind augustus vrij veel op de Veluwe en te Delft, talrijk te Hoek van Holland.

Pararge aegeria L. Op .VIII vrij veel op de Veluwe.

Maniola jurtina L. Talrijk te Hoek van Holland op 24.VIII.

Dira megera L. Eind augustus vrij talrijk op de Veluwe, op 24.VIII talrijk te Hoek van Holland.

A. M. van Oosten, Wielewaalstraat 26, Maassluis.