

wel dat we geen overhaaste conclusies uit het oude collectie-materiaal moeten trekken betreffende de oecologie en de verspreiding van de Nederlandse loopkevers, en ook dat we ons in de toekomst meer op dergelijke gebieden moeten richten.

Daarom mondt dit stukje ook uit in een oproep aan verzamelaars om hun gegevens van deze „onderverzamelde gebieden” te noteren en ter beschikking te stellen. Hen die hiertoe bereid zijn zal ik graag nadere inlichtingen geven over de voor dit doel meest geschikte wijze van noteren op speciale formulieren. Dit geldt niet alleen voor de loopkeververzamelaars, maar tevens voor de bezitters van verzamelingen van andere diergroepen.

In een volgende aflevering van Entomologische Berichten zal een gedetailleerder artikel over de European Invertebrate Survey verschijnen.

Summary

Discussion of the distribution maps of the European Invertebrate Survey. Our map gives the distribution of the Carabidae in the Netherlands according to the data from collections and literature. It shows the intensity of collecting in the period 1900—1973.

Literatuur

HEATH, J., 1971. The European Invertebrate Survey. *Acta ent. fenn.* 28: 27—29.

HEATH, J. & F. H. PERRING, 1970. Biological Records Centre (stencil).

Herkomst van het materiaal gebruikt voor de kaart:

collectie Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Amsterdam.

collectie Natuurhistorisch Museum, Enschede.

particuliere collecties: J. A. Blokland; Th. Heyerman; F. v. Stuivenberg; A. Teunissen; H. Turin; K. Vegter en W. J. Veldkamp.

kaartsysteem P. v. d. Wiel betreffende de waddeneilanden (veel vanggegevens uit literatuur en excursies van 1900—1940).

De statistische gegevens betreffende het bodemareaal komen van het C.B.S.

Arnhem, Kemperbergerweg 11.

Nieuwe naam voor mineervlieg. Een van de in het blad van Kamperfoelie minerende Diptera staat in navolging van HERING bekend als *Phytagromyza lonicerae* (R.-D.). GRIFFITHS heeft nu het holotype van ROBINEAU-DESVOIDY kunnen onderzoeken en vond dat dit een exemplaar is van *Napomyza xylostei* (Kaltenbach). De door HERING vermelde en ook bij ons voorkomende soort bleek nog niet beschreven te zijn. De correcte naam ervoor is nu *Paraphytomyza cornigera* Griffiths, 1973.

De mijn van de larve is afgebeeld in W.M. no. 94 van de K.N.N.V. Deze figuur komt goed overeen met die van GRIFFITHS. De larve moet vroeg in het jaar gezocht worden (eind april tot begin juni). De geciteerde literatuur is:

FRANKENHUYZEN, A. VAN & G. HOUTMAN, 1972. Bladmineerders op bomen en struiken (p. 23; no. 60 op fig. 22).

GRIFFITHS, G. C. D., 1973. Description of an unnamed *Paraphytomyza* (Diptera, Agromyzidae). *Ent. Gazette* 24: 307-310, fig. 1-3. — LPK.