

## Naamlijst van Nederlandse Sluipwespen (Fam. Ichneumonidae II) Subfam. Ichneumoninae

door

H. G. M. TEUNISSEN

(slot)

### Thyrateles Perk.

164. *T. camelinus* (Wesm.). Het door LINDEMANS vermelde exemplaar (1920, *Ent. Ber., Amst.* 5: 201) is de var. *bipunctatus* Schmied. T: 1 ♀ Weert, 3.IX.1936; 1 ♂ Tilburg, Schayk, Teteringen, Cromvoirt. L: 1 ♂ Valkenburg. A: 1 ♀ Tiel. ♂ 11.VI—19.VIII.

*T. camelinus* (Wesm.), var. *bipunctatus* (Schmied.). Nieuw voor de fauna. L: 1 ♂ Wamel, 2.VII.1916.

### Patroclus Cress.

Hiervan zegt WALKLEY 1967: Type species is neo-tropical. Het genus hoort niet in N.-Amerika thuis. Alle soorten moeten worden overgebracht naar het genus *Patrocloides* Heinr.

### Patrocloides Heinr.

165. *P. sputator* (F.). T. zegt, dat alle oude publicaties niet op deze soort slaan. Het ♀ van V. uit het duin Den Haag, 18.VII, is een *Ichneumon culpator*. Ook S. ving deze soort niet. DEN HOED noemt haar inlands wegens vondsten in Blerick en Maastricht (1967, *Ent. Ber., Amst.* 27: 108).

### Limerodops Heinr.

166. *L. elongata* (Brischke). Zeer algemeen. ♀ 1.VI—29.VIII, ♂ 2.VI—1.VII.

167. *L. subsericans* (Grav.). T: ♂ Schayk 11, 14 en 29.VI; Oploo 4.VI.

168. *L. unilineatus* (Grav.). Nieuw voor de fauna. W: 1 ♀ Kesteren, 8.VIII. 1927, ex *Archanara geminipuncta* Haworth.

### Triptognathus Heinr.

169. *T. amatorius* (Müll.). Gewone soort, gevangen in het midden en zuiden van het land. ♀ 17.IV—11.V, ♂ 15.VII—27.IX.

170. *T. atripes* (Grav.). T: Mechelen, Swalmen, Maastricht, Baarlo, Herpen, Roermond. L: 1 ♂ Mechelen, 31.VII. W: Den Haag, Gilze-Rijen. ♀ 23.V—17.VIII, ♂ 23.VII—22.VIII.

*T. atripes* (Grav.), var. *goedarti* (Grav.). V: Middelburg, Holland. T: 1 ♀ Melick, 30.V.1946; 1 ♂ 'Spar' bij Roermond, 22.VIII.1946.

*T. atripes* (Grav.), var. *fumigator* (Grav.). Nieuw voor de fauna. T: 1 ♀ Helenaveen, 15.V.1947 (BENNO leg.).

*T. atripes* (Grav.), var. *flavifemur* (Tischb.). Nieuw voor de fauna. T: 3 ♂ 'Spar' bij Roermond, 19.VIII.1946; 1 ♂ Tilburg, 15.VIII. L: 1 ♂ Vorden. A: 1 ♂ Oisterwijk, 2.VIII.1895.

*T. atripes* (Grav.), var. *sibilans* (Grav.). Nieuw voor de fauna. T: 2 ♂ 'Spar' bij Roermond, 12 en 19.VIII.1946.

Opm.: *T. atripes*, var. *interjecta* (Tischb.) vervalt, omdat het exemplaar van S. tot de hoofdvorm behoort. Ook de var. *cingulatus* (Grav.) vervalt.

*T. uniguttatus* (Grav., 1829). Hiervan zegt H. TOWNES (1965, *Polskie*

*Pismo ent.* 35: 410), dat deze soort synoniem is met *atripes* Grav., 1820. Ze behoort dus *T. atripes* Grav. te heten, waarvan *uniguttatus* Grav. dan een var. wordt.

171. *T. pulchellus* (Christ.) (*negatorius* F.). V: Utrecht, Texel. T: 2 ♀ Venlo en Baarlo. L: 1 ♂ Epen. (Het ♂ van V. uit Utrecht bevindt zich in Wageningen).

#### Amblyteles (Wesm.)

172. *A. armatorius* (Först.). T: Venlo, Exaeten, Oploo, Eygelshoven, Geertruidenberg. A: Amsterdam, Putten, Venlo, Rottum, Beek bij Nijmegen. L: Epen. W: Burgst, Ulvenhout, Utrecht. M: Exaeten. ♀ 18.VI—29.IX, ♂ 30.VI—29.VII.

#### Achais Cam. (*Pseudamblyteles* Ashm. partim).

173. *A. oratorius* (F.). Zeer gewoon. ♀ 10.VI—11.X, ♂ 5.VI—29.VIII.  
*A. oratorius* (F.), var. *marginalis* (Hab.). Nieuw voor de fauna. W: 2 ♂ Burgst, VIII.  
*A. oratorius* (F.), var. *bella* (Hab.). Nieuw voor de fauna. L: 2 ♂ Hulshorst, 11 en 18.VII.  
*A. oratorius* (F.), var. *bipunctatus* (Berth.). L: Hulshorst. W: Burgst. T: Stein, Laren N.H., Schayk. A: Brielse Nieuwland, Venlo. ♀ 8.VI—27.X.  
*A. oratorius* (F.), var. *atramentarius* (Grav.). Plaatsnamen kan ik hiervan niet opgeven, hoewel deze var. in de literatuur voor ons land werd vermeld.

#### Eutanyacra Cam. (*Pseudamblyteles* Ashm., partim)

174. *E. glaucatoria* (F.). V: Utrecht, Driebergen. T: Tilburg, Belfeld, Oisterwijk, Schayk, Oploo. L: Ermelo, Venlo. W: Wageningen. ♀ 2.VI—28.IX, ♂ 9.V—11.IX.  
*E. glaucatoria* (F.), var. *spoliata* (Berth.). Nieuw voor de fauna. L: 2 ♂ Ermelo, 13.V.1936.  
*E. glaucatoria* (F.), var. *nigroscutellata* (Ulbr.) Nieuw voor de fauna. L: 5 ♂ Putten, Ermelo. 11.V—26.V.  
175. *E. picta* (Schrank) (*vadatorius* Ill.). V: Leiden, Utrecht, Middelburg, Rotterdam. T: Wageningen, de 'Spar' bij Roermond, St. Pietersberg, Tilburg, Udenhout, Tegelen. Sa: Horn. ♀ 6.X—15.X, ♂ 27.V—26.VIII.

#### Pseudamblyteles Ashm.

176. *P. castanopyga* (Steph.). T: 1 ♀ Den Dolder, 27.VIII.1948 (VERHOEFF leg.).  
177. *P. crispatorius* (L.). Nieuw voor de fauna. L: 1 ♀ Drie, 9.IV.1919.  
178. *P. equitatorius* (Panz.). V: Den Haag, 8.XI, Breda, Wassenaar, Arnhem. L: 1 ♀ Ermelo, 9.VIII. T: 2 ♀ Exaeten en Blaricum, 13 en 29.IV. A: 1 ♀ Venlo, 25.V; 1 ♀ Oisterwijk, 1.VIII.  
*P. equitatorius* (Panz.), var. *nigricauda* (Berth.). Nieuw voor de fauna. T: 2 ♀ Exaeten en Laren-N.H. L: 1 ♀ Ermelo. A: 1 ♀ Hilversum. ♀ 28.IV—15.VIII.  
*P. glaucatorius* (F.) behoort tot *Eutanyacra* Cam.  
179. *P. indocilis* (Wesm.). T: Dwingelo, Oploo, Oisterwijk, Helenaveen. L:



- Hulshorst. W: Burgst. A: Apeldoorn. Sa: Roermond. ♀ 25.VI—25.X, 2 ♀ 12 en 13.IV; ♂ 25.VI—25.VII.
180. *P. luctatorius* (L.) (*culpatorius* auct.). De exemplaren van V. in Wageningen blijken *palliatorius* Grav. te zijn. 1 ♂ van S. is eveneens *palliatorius*. Het ♂ van LINDEMANS is eveneens een andere soort. Alle oude opgaven vervallen dus. De soort staat genoemd in de lijst van DEN HOED (1961, *Ent. Ber., Amst.* 21: 229) zonder verdere uitleg. Mogelijk zijn er elders toch nieuwe vangsten geweest.
181. *P. mercatorius* (F.) (*infractorius* Panz. nec L.). V: Utrecht, Den Haag, Walcheren, Worth-Rheden. Alleen dit laatste exemplaar kon ik controleren, het bleek een echte *armatorius* Först. te zijn. Bevestiging door verdere vondsten is dus gewenst.  
*P. oratorius* (F.) behoort tot *Achais* Cam.
182. *P. palliatorius* (Grav.). Groot aantal plaatsen. ♀ 2.VIII—3.IX, ♂ 23.VI—25.IX.  
*P. palliatorius* (Grav.), var. *erythropygus* (Grav.). V: Rotterdam. T: Schayk, Oosterwijk, Oploo. L: Epen. W: Gilze-Rijen. In museum Tilburg: Tilburg. 23.VII—22.VIII.  
*P. palliatorius* (Grav.), var. *spoliator* (Wesm.). T: Helenaveen, Oosterwijk, Tilburg, Schayk, Hilversum. A: Putten, Oosterbeek, Venlo, Heino. ♀ 26 en 29.VIII, ♂ 15.V—21.VIII.  
*P. palliatorius* (Grav.), var. *ochraceus* (Tischb.). T: 2 ♂ Tilburg, 17.VIII. W: Hilvarenbeek, Helenaveen, ♂ 22 en 4.VIII.  
*P. palliatorius* (Grav.), var. *subniger* (Hab.). Nieuw voor de fauna. W: 1 ♂ Helenaveen, 24.VIII.1927. T: 1 ♂ Schayk, 28.VII.1948.  
*P. palliatorius* (Grav.), var. *defensorius* (Vill.). MAURISSEN vermeldt deze var. van Limburg (1882, *Tijdschr. Ent.* 25: CXV).
183. *P. pallidicornis* (Grav.). T: 1 ♂ 'Spar' bij Roermond, 23.VIII.1946; ♂ Best, 12.VI; ♂ De Bilt 28.VIII.  
*P. pictus* (Schrank) behoort tot *Eutanyacra* Cam.
184. *P. punctus* (Grav.). V: Den Haag. W: 1 ♂ omgeving Breda, V.1912.
185. *P. quadripunctorius* (Müll.). V: Groningen, Schothorst (landgoed bij Den Ham ten n. van Amersfoort), Leiden. T: Exaeten, Tilburg, Den Dolder. M: Exaeten. W: 2 ♀ van V. zijn bewaard gebleven. ♀ 18.VII—1.IX.
186. *P. trifasciatus* (Grav.) (*fasciatorius* F.). V. vermeldt deze soort van verschillende plaatsen, maar de enkele ♂ die bewaard zijn gebleven, o.a. van Wolfheze en Driebergen, behoren tot *palliatorius* Grav., zodat zijn determinaties onzeker zijn. T: 1 ♀ Stein. A: 2 ♂ Venlo, 25.VII.

#### Spilichneumon Thoms.

187. *S. ammonius* (Grav.) (*nonagriæ* Holmgr.). Nieuw voor de fauna. L: 5 ♀ en 9 ♂ Wolvega en Zevenhuizen, gekweekt uit *Archanara geminipuncta* en *A. algæ*, Delden, Markelo. T: 1 ♀ Velp, Terlet, 1 ♂ Lent en Oosterwijk. W: 2 ♂ Roermond en Wageningen uit *Nonagria typhae*. A: 1 ♂ en 3 ♀ Amsterdam uit *Nonagria typhae* en *Gortyna flavago*. ♀ 30.VI—27.VIII, ♂ 10.VIII—24.VIII.



188. *S. jobansoni* (Holmgr.). L: 1 ♂ Ermelo, door LINDEMANS als *I. caloscelis* Wesm. gedetermineerd.
189. *S. occisor* (F.) (*occisorius* F.). Talrijk. ♀ 5.V—15.VIII, ♂ 5—31.VIII.  
*S. occisor* (F.), var. *nigrinus* (Berth.). W: 1 ♂ Burgst. L: 1 ♂ Epen, 22.VIII.  
*S. occisor* (F.), var. *rufinus* (Berth.). Nieuw voor de fauna. L: Epen, Vorden. T: Roermond. W: Burgst. A: Putten. Alles ♂ 21.VIII—11.IX.
190. *S. quadriguttatorius* (Thunb.). T: Exaeten, IX.1887. Ook 4 ♀ in Maas-tricht aanwezig, IX—XI. V. vermeldt deze soort van Zuid-Holland.
191. *S. stagnicola* (Thoms.). A: 1 ♀ Lochem, 23.VIII.1900 (J. Th. OUDEMANS leg.).

#### Tricholabus Thoms.

192. *T. strigatorius* (Grav.). W: 1 ♀ en 1 ♂ Burgst, VII—VIII. T: 2 ♂ Hilversum, 8 en 15.VII; Den Dolder, VII.

#### Hepiopelmus Wesm.

193. *H. melanogaster* (Gmel.) (*leucostigmus* Grav.). T: Valkenburg, Herpen, Venlo, Horn, Roermond, Tilburg, Oisterwijk. W: Ulvenhout, Burgst. L: Epen, Breda, Hulshorst. Sa: Melick. ♀ 7.VIII—3.IX, ♂ 7.VII—22.VIII.
194. *H. variegatorius* (Panz.). OUDEMANS vermeldt ♀ en ♂ met interessante beschrijvingen en waarnemingen. (1908, *Tijdschr. Ent.* 51: LIX). V: Utrecht. A: 2 ♀ VII en 20.IX en 1 ♂ 7.VII uit *Spilosoma lutea*. T: 1 ♀ Valkenburg (niet meer aanwezig). W: 1 ♂ Utrecht, dit is het ♂ van SNELLEN VAN VOLLENHOVEN.

*H. variegatorius* (Panz.), var. *obscurus*, nov. var. Abdomen entirely dark, without yellow spots. A: 2 ♀ VII.1908 ex *Spilosoma lutea*. Holotype is in the Amsterdam collection.

#### Acolobus Wesm.

195. *A. sericeus* (Wesm.). L: 1 ♀ Putten, 7.X.1935.

#### Probolus Wesm.

196. *P. concinnus* (Wesm.). T: 1 ♀ Moergestel, 11.V.1945; 1 ♀ Roermond, 14.IX.1944. L: 1 ♂ Harderwijk, 15.VIII.1933.
197. *P. culpatorius* (L.) (*alticola* Grav.). V: Den Haag, Empe, Oisterwijk. A: Rotterdam. T: bij Roermond, Herpen, Voorburg, Best, Haaren, Babberich. W: Burgst. L: Markelo, Bergen op Zoom, Schiedam, Plasmolen. ♀ 10.VI—23.IX, 1 ♀ 26.IV; 1 ♂ 18.VIII.

#### Hoplismenus Grav.

198. *H. albifrons* (Grav.) (*armatorius* F.). T: Laren, Hilversum, Meyendel, Haaren, Schayk, Raamsdonksveer. L: Ermelo, Hulshorst. A: Diemen. W: Cromvoirt. ♀ 1.IV—1.X, ♂ 26.VII—28.VIII.
199. *H. bispinatorius* (Thunb.) (*perniciosus* Grav.). T: Schayk, Epen, Lent, Steijl. W: Ulvenhout. ♀ 16.IV—27.IX, ♂ 26.VI—25.VIII.  
*H. bispinatorius* (Thunb.), var. *moestus* (Grav.). Nieuw voor de fauna. T: 1 ♂ Lent, 13.VIII.1945; 1 ♂ Schayk, 26.VII.1949 (dit laatste bestaat niet meer).  
*H. uniguttatus* Grav. behoort tot genus *Pseudoplatylabus* Smits v. Burgst.  
*H. violentus* Grav. behoort tot *Pseudoplatylabus* Smits v. Burgst.



**Chasmias** Ashm.

800. *C. motatorius* (Grav.). Veel plaatsen uit zuid- en midden-Nederland. ♀ 8.III—11.X, ♂ 11.VII—6.X.  
*C. motatorius* (Grav.), var. *transitorius* (Berth.). Nieuw voor de fauna. T: 1 ♂ Schayk, 13.VIII.1947; 1 ♂ Venlo, 29.IX.1941. W: Burgst.
201. *C. paludator* (Desv.). L: Zevenhuizen, Wolvega, Breda, een var. met segment 1—3 bruinrood. T: 1 ♀ Babberich. A: 1 ♀ en 1 ♂ Rotterdam, 3.VIII.1892.

**Exephanes** Wesm.

202. *E. femoralis* Brischke. W: 1 ♀ Burgst, VIII.1914.
203. *E. ischioxanthus* (Grav.) (*hilaris* Grav.). V: Leiden, Rotterdam uit *Photodes elymi* Fr., waarvan exemplaren nog in Wageningen aanwezig zijn. A: 1 ♀ Roermond. I: 2 ♂ Geertruidenberg, 21.VI en 4.VII. Sa: Horn.
204. *E. occupator* (Grav.). A: Rotterdam, Amsterdam, Zevenhuizen, Vorden, Warga. T: Weert, Drimmelen, Tilburg. L: Markelo. ♀ 8.V—21.VIII, ♂ 28.VII—28.IX.  
*E. occupator* (Grav.), var. *unipunctatus* Strobl. Nieuw voor de fauna. L: 1 ♂ Vorden, VIII.1921; 1 ♂ idem var. met zwart schildje. A: 1 ♂ var. Amsterdam, met zwarte streep op de achterdijen.  
*E. occupator* (Grav.), var. *mediofulvus* Ulbr. Nieuw voor de fauna. A: 2 ♂ Rotterdam, uit *Arenostola phragmitidis*.  
*E. occupator* (Grav.), var. *carbonarius* Elbr. Nieuw voor de fauna. A: 1 ♂ Amsterdam, 1887 uit *Archana sparganii*. T: 1 ♂ Lent, 13.VIII.1945.  
*E. occupator* (Grav.), var. *contaminatus* (Grav.). V: Haarlemmermeer. Dit exemplaar heb ik niet in de collecties gevonden. A: 1 ♂ Amstelveen, 10.VIII.1881; 1 ♂ Oosterwijk, 2.VIII.1895, segment 2 en 3 rood, achter zwart, schildje met 2 gele punten, gezichts zijden geel, segment 7 met gele punt.
205. *E. ulbrichti* Hinz. Nieuw voor de fauna. T: 2 ♂ Geertruidenberg, 24.VI en 11.VII.  
*E. fulvescens* Voll. Deze soort is moeilijk thuis te brengen. Als er meer materiaal van dit genus gevangen wordt, kan er mogelijk klaarheid komen.

**Diphyus** Kriechb.

*D. tricolor* Kriechb. KOORNNEEF vermeldt deze soort van Hilversum. (*Ent. Ber., Amst.* 10: 133, 1939). Dit exemplaar bleek bij controle een *Amblyteles palliatorius* te zijn. Vervalt dus voor de fauna.

**Anisopygus** Kriechb.

206. *A. pseudonymus* (Wesm.). V: 1 ♂ uit „*Bombyx*” *reclusa* (nu *Clostera pigra*). Dit exemplaar ging verloren. A: 1 ♀ Amsterdam, VII.1881 (J. Th. OUDEMANS leg.).

**Pseudoplatylabus** Smits van Burgst

207. *P. uniguttatus* (Grav.). Nieuw voor de fauna. L: 3 ♀ Ermelo, Hulshorst en 1 ♂ 30.VIII. T: 1 ♀ Den Dolder (VERHOEFF leg.). ♀ 26.VI—18.X.
208. *P. violentus* (Grav.) (*caudatus* Smits v. Burgst). W: 1 ♀ Laren-N.H., VIII. Dit ♀ is de type van *P. caudatus* Smits v. Burgst (1921, *Ent. Ber.*,

*Amst.* 5: 282). L: Hulshorst. T: Oploo, Venlo, Berghem, Oss. 1 ♂ 15.VIII. 1942, ♀ 8.VIII—3.X.

*P. violentus* (Grav.), var. *nigricornis* Ulbr. Nieuw voor de fauna. L: 1 ♂ Hulshorst, 21.VI.1934. T: 1 ♂ Venlo, 13.IX.1942.

#### Heresiarchini

##### Heresiarches Wesm.

209. *H. eudoxius* Wesm. Nieuw voor de fauna. L: 1 ♂ Drie, 26.VII.1933 HEINRICH det.). T: 2 ♂ Den Dolder, VII, in insektenval gevangen door P. VERHOEFF. Zeer zeldzaam.

#### Listrodromini

##### Neotypus Först.

210. *N. melanocephalus* (Gmel.). Nieuw voor de fauna. In de collectie-KOORNNEEF bevindt zich een ♀ van deze soort, Blerick, 19.VIII.1924. T: 1 ♀ Vlodrop, 5.IX; 1 ♀ Maasbracht, 4.VIII. Ook in de collectie-SANDERS enkele ♀.

##### Listrodromus Wesm.

211. *L. nycthemerus* (Grav.). T: Oploo, Berghem, Schayk, Oisterwijk, Vught. W: Buunderkamp, Wolfheze. L: Hulshorst, Ermelo, Harderwijk, Vorden. Sa: Azenraij. ♀ 16.VII—6.IX, ♂ 24.VII—5.VIII.

##### Anisobas Wesm.

212. *A. cingulatorius* (Grav.). T: 1 ♀ Gulpen 7.VIII.1948. W: ♀ VIII uit *Nonagria typhae* Thb.

213. *A. hostilis* (Grav.). Nieuw voor de fauna. L: 1 ♀ Ermelo, 1.VIII.1936, 1 ♀ Friesland, 11.VII.1934 uit *Lycaena dispar* Hw. W: 1 ♂ Wolvega uit *L. dispar*, 1 ♀ Hattem, 1.VIII.1869.

#### Eurylabini

##### Goedartia Boie.

214. *G. alboguttata* (Grav.). V: Den Haag, Utrecht, Empe, Arnhem. T: Schayk, Den Dolder, Tilburg. L: Hulshorst, Putten, Ermelo. A: Nijmegen, Bergen op Zoom. W: Rotterdam, Burgst. ♀ 21.VI—27.IX, ♂ 14.VI—28.IX.

##### Eurylabus Wesm.

215. *E. torvus* Wesm. W: 4 ♂ Westernieland, 13.VI—10.VIII, gesleept op zebies en riet; ♀ Burgst, VI—IX. A: 1 ♀ Alkmaar, 12.VIII. T: 1 ♀ Oisterwijk, 22.V; 1 ♀ Den Dolder, 25.V. L: Valkenburg, Vorden, Alkmaar.

216. *E. tristis* (Grav.). V: 1 ♀ Katwijk Binnen, VI. (1879, *Tijdschr. Ent.* 23: XV). T: 1 ♀ 1 ♂ Duinrel (Wassenaar), VI.1943.

#### Platylabini

##### Rhyssolabus Berth.

217. *R. bassicus* Tischb. Nieuw voor de fauna. T: 1 ♀ Laren-N.H., 11.IX.1944 (VERHOEFF leg.). 1 ♂ Brunssum, 6.VIII.1937 op de heide.



**Asthenolabus** Heinr.

218. *A. vitratorius* (Grav.). V: 1 ♂ Molencate. W: 1 ♂ Ulvenhout, V.1920. T: 2 ♂ Mechelen, 4.VIII.1947, 1 ♂ Geertruidenberg, 2.IX.1949. L: 1 ♂ Vorden, VIII.1932. A: 1 ♂ Venlo.  
*A. vitratorius* (Grav.), var. *coxalis* (Hab.). Nieuw voor de fauna. T: 1 ♀ Goirle, 15.VIII.1947. In museum Tilburg 1 ♀ Tilburg, 30.VIII.

**Pristicerus** Grav.

219. *P. infractorius* (L.) (*leucogrammus* Wesm.). L: 1 ♂ Epen, 2.VIII.1924, door HABERMEHL als *Acolabus sericeus* Wesm. gedetermineerd. Inderdaad bezit de clypeus een minimaal klein tandje, waardoor de vergissing verklaarbaar is. 1 ♂ Schiedam, VII.1918. A: 1 ♂ Brielse Nieuwland, 23.VIII.  
 220. *P. serrarius* (Grav.). T: 1 ♀ Oploo, 23.VII.1947, 1 ♂ 22.VII. L: 1 ♀ Hulshorst, 20.IX.1937. A: 1 ♀ Putten (G.), 18.VI.1895 uit „*Boarmia*” sp. W: 1 ♀ Beek, 26.VII. Dit exemplaar was door SNELLEN VAN VOLLENHOVEN als *nigrotarius* opgegeven.

**Poecilostictus** Ratz.

221. *P. cothurnatus* (Grav.). L: Hulshorst, Drie. T: Beek bij Nijmegen, Schayk, Venlo. ♀ 30.VI—18.X, ♂ 21.VI—26.VII.

**Platylabus** Wesm.

222. *P. concinnus* (Thoms.). L: Schiedam. T: Herpen (ROMAN det.), parasiet van spanrupsen op elzestruiken. W: Burgst. ♀ 31.VII—1.IX, ♂ 24.VIII—3.IX.  
 223. *P. decipiens* Wesm. W: 1 ♂ Hattem VIII. L: 1 ♂ Amsterdam, VII. T: 1 ♀ Oploo, 23.VII.  
*P. decipiens* Wesm., var. *exannulata* Haberm. Nieuw voor de fauna. T: 1 ♂ Oploo, 28.VI.1947. L: Ermelo, 11.V.1936.  
 224. *P. dolorosus* (Grav.). V: 1 ♀ Oirschot, VI, MAURISSEN (1879, *Tijdschr. Ent.* 23: XV). L: 1 ♂ Hulshorst, 1.VI.1934. A: 1 ♂ Rotterdam, 24.IV. 1892.  
 225. *P. gigas* Kriechb. W: 1 ♂ omgeving Breda, V.1912.  
 226. *P. histrio* Wesm. Nieuw voor de fauna. L: ♂ Hulshorst, 25.V en 1.VI. 1934.  
 227. *P. intermedius* Holmgr. (DEN HOED, 1961, *Ent. Ber., Amst.* 21: 231).  
 228. *P. irridipennis* (Grav.). W: Breda, Den Haag. T: Voorburg, Schayk, Oploo, Raamsdonksveer, Geertruidenberg. L: Ermelo. A: Exaeten. In museum Tilburg: Tilburg. ♀ 15.V—30.IX, ♂ 9.V—19.IX.  
 229. *P. opaculus* Thoms. Nieuw voor de fauna. T: 1 ♀ Venlo, 7.IX.1942; 1 ♀ var. Oisterwijk (HEINRICH det.).  
 230. *P. pallidens* Wesm. Nieuw voor de fauna. De meeste exemplaren behoren tot de var. 1 van WESMAEL. L: Hulshorst. T: Schayk, Oploo. W: Utrecht. ♀ 23.VIII—5.XI, ♂ 15.VII—28.IX.  
 231. *P. pedatorius* (F.). V: Den Haag (1879, *Tijdschr. Ent.* 23: XV). T: Laren, Drimmelen, Kijfhoek. L: Schiedam. W: Burgst, Haagse Bos. ♀ 17.V—1.IX, ♂ 31.V—31.VIII.  
 232. *P. pullus* Wesm. V. noemt 1 var., Den Haag, IV, van HANET (1879,

*Tijdschr. Ent.* 23: XV). Bevestiging van deze vondst lijkt mij noodzakelijk, vooral omdat er van een var. sprake is.

233. *P. pumilio* Holmgr. L: 1 ♀ Vorden, 30.VIII.1932. T: 2 ♀ Oisterwijk, 22.VIII en 9.IX.
234. *P. punctifrons* Thoms. (DEN HOED, 1961, *Ent. Ber., Amst.* 21: 230).
235. *P. rufiventris* Wesm. V: 1 ♀ Rotterdam, VII (1879, *Tijdschr. Ent.* 23: XV). L: Hulshorst. L: Den Dolder, Oploo, Schayk, plaatselijk niet zeldzaam. ♀ 18.V—27.IX, ♂ 30.V—15.VII, 1 ♂ 22.IX.
236. *P. rufus* Wesm. T: 1 ♀ Roermond, 18.VIII.
237. *P. tenuicornis* (Grav.) (*niger* Wesm.). V: Arnhem, VII (1879, *Tijdschr. Ent.* 23: XV). T: 1 ♂ Voorburg, VIII.1941 (ROMAN det.). A: 1 ♂ Naarden, 2.VIII.1895 (J. Th. OUDEMANS leg.).
238. *P. variegatus* Wesm. Nieuw voor de fauna. L: 1 ♂ Epen, VIII.1926. T: 1 ♂ Den Dolder, 25.VII; 1 ♂ Venlo, 2.VI.1942.
239. *P. vibratorius* (Thunb.) V: Utrecht, een donkere var. T: Venlo, Haaren, Herpen, Tilburg. ♀ 2.VI—11.X, ♂ 31.VIII.1938.  
*P. vibratorius* (Thunb.), var. *persecutor* (Grav.). Nieuw voor de fauna. T: 1 ♂ Venlo, 24.VIII.1942; 1 ♂ Schayk, 23.VIII.1949.  
Opm.: *P. daemon* Wesm. vervalst voor de fauna, daar de exemplaren van S. tot *Stenolabus concinnus* Wesm. behoren.

#### Cyclolabus Heinr.

240. *C. dubiosus* Perk. (DEN HOED, 1961, *Ent. Ber. Amst.*, 21: 230).
241. *C. nigricollis* (Wesm.). W: Burgst. T: Venlo, Heino Tilburg. L: Epen. ♀ 14.VIII en 15.VIII, ♂ 9.V—1.VII.
242. *C. pactor* (Wesm.). Nieuw voor de fauna. T: Venlo, Tilburg, Oploo. ♀ 15.VIII—20.IX. ♂ 6.VIII en 7.VIII.

#### Ectopius Wesm.

243. *E. rubellus* (Grav.) (*Diadromus rubellus*). V: bij Groningen. Dit exemplaar ging verloren. *E. rubellus* Smits v. Burgst nec Grav. is *Diadromus troglodytes*.

#### Lyncus Cam.

244. *L. exhortator* (F.) (*dimidiatus* Grav.). V: Voorst, Leiden, Haarlemmerhout, Den Haag, Arnhem. T: Venlo, Mechelen, Den Dolder. L: Bergen op Zoom, 1 ♂ Epen VIII. A: Naarden. W: Burgst, Rotterdam. W: slechts 1 ♂ van Voorst.

#### Hypomecus Wesm.

245. *H. quadriannulatus* (Grav.) (*albitarsis* Wesm. sec. TOWNES). V: 1 ♂ Den Haag (1879, *Tijdschr. Ent.* 23: XV). W: 6 ♂ Burgst. T: 1 ♀ Oisterwijk, 25.VIII; 1 ♀ Venlo, 20.IX.

#### Apaeleticus Wesm.

246. *A. bellicosus* Wesm. L: Hulshorst, Ermelo, Putten, Epen. ♀ 24.VIII—11.X. ♂ 24—25.VIII.
247. *A. inimicus* (Grav.) (*flammeolus* Wesm.). L: 1 ♀ Meyendel, 10.VIII. 1924. V: 1 ♀ Leiden.
248. *A. mesostictus* (Grav.). Nieuw voor de fauna. T: 1 ♀ Herpen, 31.VIII. 1941 (ROMAN det.).



**Pyramidophorus** Tischb.

TOWNES, MEMOI en TOWNES stellen dit genus synoniem met *Platylabus* (1965, *Mem. Am. ent. Inst.* 5: 515).

## P h a e o g e n i n i

**Heterischnus** Wesm.

249. *H. anomalus* (Wesm.). Nieuw voor de fauna. T: 1 ♂ Berghem, 28.IX; 1 ♂ Geertruidenberg, 31.VIII.
250. *H. solitarius* (Hab.). Nieuw voor de fauna. T: 1 ♂ Oss, 3.X.1948. Tot heden (1950) was het ♂ onbekend. Bij controle (1970) bleek het uit de collectie verdwenen.
251. *H. thoracicus* (Grav.). V: Walcheren, Venlo. L: Putten, Epen, Harderwijk, Gilze. W: Burgst, Ulvenhout. T: Herpen. ♀ 26.VII—5.IX. ♂ 3.VII—1.IX.
252. *H. truncator* (F.). V: Rotterdam, Heemstede. I: Groesbeek, Gilze, Harderwijk. W: Burgst. T: Haaren, Tilburg, Schayk, Corle, Raamsdonksveer. ♀ 14.II—1.X.

**Misetus** Wesm.

253. *M. oculatus* Wesm. L: Hulshorst, Groesbeek, Vorden. T: Schayk. ♀ 20.VIII—26.IX, ♂ 2.VI—20.VII.

**Hemichneumon** Wesm.

254. *H. elongatus* (Ratz.). L: Amerongen, Ermelo, Overveen, Hulshorst. W: Ulvenhout, Breda, Wageningen 1 ♀ uit *Psyche viciella* (determinatie van de vlinder onjuist, komt niet in Nederland voor). T: Venlo, Tilburg, Stein, Den Dungen. A: Plasmolen. ♀ 5.V—5.VI, ♂ 14.V—18.VI.

**Trachyarus** Thoms.

255. *T. corvinus* Thoms. Nieuw voor de fauna. L: Overveen, Amerongen uit *Solenobia lichenella*. T: 1 ♂ Meyendel. ♀ 28.V—8.VI, ♂ 31.V—6.VI.

**Nematomicrus** Wesm.

256. *N. tenellus* Wesm. A: 1 ♂ Lochem, 22.VI.1896. (SCHMIEDEKNECHT det.).

**Stenodontus** Berth.

257. *S. marginellus* (Grav.). Nieuw voor de fauna. L: Hulshorst, Groesbeek, Venlo. T: Schayk, Venlo, Oploo. ♀ 1.V—25.VIII, ♂ 27.V—28.IX.  
*S. marginellus* (Grav.) var. *albicoxis* Hab. Nieuw voor de fauna. L: Venlo. T: Venlo. 29.V—8.VI.
258. *S. theresae* Pic. (*ardator* Seyr.). Nieuw voor de fauna. T: 4 ♀ Oploo, 1 ♀ Tilburg en 1 ♀ Schayk. ♀ 5.IX—10.IX.

**Herpestomus** Wesm.

259. *H. arridens* (Grav.). DEN HOED, 1961, *Ent. Ber., Amst.* 21: 232).
260. *H. brunnicornis* (Grav.). V: Exemplaren gekweekt uit *Hyponomeuta padella*, *variabilis* en *rosella*. L: Epen, Groesbeek, Vorden, Overveen. W: Buunderkamp, Noordwijk. T: De Rips, Schayk, Venlo, Roermond. ♀ 29.VII—4.XI, ♂ 25.VII—25.VIII.  
*H. brunnicornis* (Grav.), var. *bisignatus* (Grav.). Nieuw voor de fauna. T: 1 ♀ Schayk, 29.VII; 1 ♀ Oploo, 23.VII.
261. *H. furunculus* Wesm. Nieuw voor de fauna. T: 1 ♂ Epen, VIII.1926, door



HABERMEHL gedetermineerd als *Ocotylus mitis* Wesm. Het exemplaar is zwaar beschadigd. T: 1 ♂ Tilburg, 19.V.1944. W: 1 ♂ Den Haag.

262. *H. xanthops* (Grav.) (*facialis* Grav.). V: 1 ♂ Haarlemmerhout, VI. L: Ermelo, Hulshorst, Epen. W: 1 ♀ Putten. T: 1 ♀ Schayk, 22.VIII en 1.IX. ♀ 1.V—1.IX.

#### Dicaelotus Wesm.

263. *D. cameroni* Bridgm. L: Hulshorst, Wassenaar. ♀ 1.IX—28.IX.  
Ik beschouw dit als een goede soort. ROMAN houdt haar voor een var. van *pumilus* Grav. Ook volgens PERKINS een goede soort.
264. *D. erythrogaster* (Holmgr.). L: 1 ♂ Epen, VIII. W: 1 ♀ Burgst, IX.
265. *D. gaullei* Berth. Nieuw voor de fauna. T: 1 ♀ Den Dolder, 29.V.1946, 1 ♀ Geertruidenberg, 6.X. (Dit laatste ♀ bestaat niet meer). Waarschijnlijk is dit de *Herpestomus gaullei* van SCHMIEDEKNECHT. Ik kan niet beoordelen of het in het genus *Dicaelotus* thuishoort, aangezien het exemplaar geen kop meer heeft..
266. *D. morosus* Wesm. Nieuw voor de fauna. T: 1 ♀ Schayk, 5.VIII; 1 ♀ Venlo, 25.VIII.
267. *D. pictus* Schmied. Nieuw voor de fauna. T: 2 ♀ Tilburg, 14 en 28.VIII; 1 ♂ Schayk, 26.VII.1949. (Het exemplaar van 14.VIII bestaat niet meer).
268. *D. pumilus* (Grav.). V: Scheveningse bosjes, Den Haag, Valkenburg. L: Hulshorst, Epen, Tonsel (bij Harderwijk), Meyendel. T: Venlo, Oosterwijk, Herpen, Tilburg, Schayk. ♀ 3.VII—5.X, ♂ 24.V—7.VI.
269. *D. ruficoxatus* (Grav.). Nieuw voor de fauna. T: 2 ♀ Haaren-N.B., 12.III. 1938; 2 ♂ Schayk, 19 en 23.V.1944.
270. *D. rufilimbatus* (Grav.). Nieuw voor de fauna. T: Schayk, Oploo, Hulshorst, Den Dolder. L: Hulshorst (HABERMEHL det.), Ermelo. ♀ 5.IX—3.X, ♂ 4—28.VI.
271. *D. rufoniger* Berth. Nieuw voor de fauna. T: 1 ♀ Oosterwijk, 3.IX.1941.
272. *D. suspectus* Perk. (DEN HOED, 1961, *Ent. Ber.*, *Amst.* 21: 232).

#### Epitomus Först.

273. *E. parvus* Thoms. (DEN HOED, 1961, *Ent. Ber.*, *Amst.* 21: 232).

#### Oronotus Wesm.

274. *O. binotatus* (Grav.). V: 1 ♂ Scheveningen, 13.VII. L: 1 ♀ Groesbeek, 31.VIII. T: 2 ♀ Geertruidenberg, 27.VIII en 18.IX; 1 ♂ Venlo, 13.IX. W: 1 ♂ Burgst, VIII.

#### Notosemus Först.

275. *N. bohemani* (Wesm.). Nieuw voor de fauna. L: enkele ♂ Putten, 24—28.V.

#### Mevesia Holmgr.

276. *M. arguta* (Wesm.). V: 1 ♂ Sterkenburg (Driebergen), heeft wit schildje; Overveen, Wikkenburg (bij Schalkwijk), Wassenaar, 12.IX. In onze collecties is geen exemplaar meer voorhanden.

#### Thyraeella Holmgr.

277. *T. collaris* (Grav.). V: IJsselstein, Utrecht. L: Hulshorst, Ermelo, Schiedam, Meyendel, Groesbeek. T: Venlo, Schayk, Geertruidenberg, Beek bij Nijmegen, Oploo. A: Putten. Ik zag slechts 1 ♂ uit Schayk, 26.VIII.



*T. collaris* (Grav.) var. **brischkei** (Berth.). Nieuw voor de fauna. T: 1 ♀ Raamsdonksveer, 4.V.1949 (Dit exemplaar bestaat niet meer).

#### Diadromus Wesm.

278. *D. albinotatus* (Grav.). Nieuw voor de fauna. T: 1 ♀ Venlo, 30.IX; 1 ♀ Schayk, 23.VII.
279. *D. arrior* Wesm. Nieuw voor de fauna. T: 1 ♀ Venlo, 11.IX; 1 ♂ Venlo, 10.VIII; 2 ♂ Burgst, VII.
280. *D. intermedius* Wesm. Nieuw voor de fauna. T: Venlo, Schayk, Meyendel, Kijfhoek. L: Hulshorst. ♀ 12.V.—4.X, ♂ 23.VI—9.VIII.  
*D. rubellus* (Grav.). Zie onder *Ectopius rubellus* (Grav.).
281. *D. subtilicornis* (Grav.) (*ustulatus* Holmgr.). Nieuw voor de fauna. T: Venlo, Oss, Roermond, Oirschot. W: Valkenburg, Burgst. ♀ 30.VI—30.X, ♂ 3.VIII—28.X.
282. *D. tenax* Wesm. W: 1 ♀ Burgst, VII.1912. T: 1 ♀ Venlo, 7.VIII.1942; 1 ♀ Seters (gem. Oosterhout), 19.IV.1950.
283. *D. troglodytes* (Grav.). V: Noordwijk, Haagse Bos, uit *Cerostoma*. L: Vorden. W: Burgst, Liesbos, Buunderkamp. T: Haaren, Kijfhoek, Meyendel. M: Exaeten. A: 1 ♀, SNELLEN, uit *Cerostoma parenthesesella*. In museum Tilburg: Tilburg, Udenhout. ♀ 24.V—19.X.
284. *D. varicolor* Wesm. Nieuw voor de fauna. L: 1 ♂ Vorden, 21.VIII (HABERMEHL det.).

#### Colpognathus Wesm.

285. *C. celerator* (Grav.) Zeer gewoon.
286. *C. divisus* Thoms. L: Epen, Hulshorst, Breda. W: Burgst. T: Herpen, Tilburg. ♀ 11.VII—28.VIII, ♂ 21.VI—17.VIII.

#### Micrope Thoms.

287. *M. macilenta* (Wesm.). W: Rotterdam, 15.VIII.1867 uit *Elachista* sp.

#### Centeterus Wesm.

288. *C. confector* (Grav.). V: Den Haag, Texel, Valkenburg (1882, *Tijdschr. Ent.* 25 : CXXXVII). In onze collecties is de soort niet meer vertegenwoordigd.
289. *C. opprimator* (Grav.). L: Hulshorst, Vorden. W: Burgst. A: Venlo. T: Schayk. ♀ 31.VII—27.IX, ♂ 5.VI—27.VIII.

#### Oiorhinus Wesm.

290. *O. pallipalpis* Wesm. V: Haarlem. L: Hulshorst. W: Burgst, Den Haag. T: Venlo, Haaren, Voorburg, Geertruidenberg, Herpen, Berghem. ♀ 1.V—28.X, ♂ 1.IX—15.X.

#### Orotylus Holmgr.

291. *O. mitis* (Wesm.). T: 3 ♂ Kijfhoek, 17.VII; 4 ♀ Geertruidenberg, 11 en 12.IX en 3.X.

#### Aethecerus Wesm.

292. *A. discolor* Wesm. T: 1 ♂ Meyendel, 20.VII. W: 1 ♂ Epen, VIII.1926 (HABERMEHL det.), verder een aantal ♀ Meyendel, 6.XI.1926. W: Burgst, VIII en IX.1912.
293. *A. dispar* Wesm. V: 1 ♂ Hilversum, 25.VII.1875. T: Kijfhoek, Meyendel, 1 ♂ De Rips, 5.VIII. ♀ 22.VII—15.VIII.



294. *A. longulus* Wesm. W: 1 ♂ Burgst, VIII.1912, postpetiolus en segment 2—5 rood.
295. *A. nitidus* Wesm. T: Venlo, Oss, Oploo, Schayk, Teteringen. L: Putten, Epen, Vorden, Delden. W: Burgst. ♀ 6.VIII—28.IX, ♂ 1.VII—1.VIII.
296. *A. pallicoxa* Thoms. Nieuw voor de fauna. L: 1 ♂ Delden, VIII.1930, (HABERMEHL det.).
297. *A. placidus* Wesm. Nieuw voor de fauna. L: Ermelo, Meyendel. T: Meyendel, Den Dolder. ♀ 2.VIII—21.IX, ♂ VI—21.VIII.

### Phaeogenes Holmgr.

298. *P. anderi* nom. nov. (*montanus* Pfeff. nec. Thoms.; syn. nov.). Nieuw voor de fauna. T: 3 ♀ Vught, 15.V.1940 (hiervan gingen 2 ♀ verloren). I name this species after Mr. KJELL ANDER from the Stockholm Museum, in honour of his merit for the assistance, which he has given me in the examination of the material of THOMSON's collection.
299. *P. bellicornis* Wesm. W: 1 ♂ Burgst, VII.1912.
300. *P. callopus* Wesm. (DEN HOED, 1961, *Ent. Ber., Amst.* 21: 233).
301. *P. cephalotes* Wesm. T: 1 ♀ Venlo, 7.IX.1942; 1 ♀ Schayk, 2.VII.1952; 1 ♂ Horn, 13.VIII.1944.
302. *P. flavidens* Wesm. T: Venlo, Schayk, Den Dolder. L: Meyendel, Delden. ♀ 24.VII—6.IX, ♂ 29.VI—14.VIII.
303. *P. fulvitaris* Wesm. Het enige ♂ van SMITS VAN BURGST was een *Ichnemon varipes* Grav.; de soort was dus ten onrechte als inlands opgegeven. L: Harderwijk, Hulshorst, Tonsel (bij Harderwijk), Ermelo, Epen, Overveen, Meyendel, Groesbeek. T: Schayk, Geertruidenberg, Venlo, Oss, Heino, Haaren-N.Br., Tilburg, Kijfhoek, ♀ 4.V—9.X, ♂ 15.VII—19.X.
304. *P. fuscicornis* Wesm. L: Groesbeek, Epen, Aalten. W: Burgst. T: Venlo, Oisterwijk. In museum Tilburg: 1 ♀ Ulvenhout, 28.III.
305. *P. heterogonus* Wesm. Nieuw voor de fauna. L: 3 ♂ Epen, VIII.1926 waren gedetermineerd als *nigridens* Wesm., welke soort bij ons evenwel nog niet werd gevonden.
306. *P. impiger* Wesm. W: 1 ♀ Putten. A: 1 ♀ Utrecht, gekweekt uit *Tinea* sp. M.i. kan men verschillende soorten onderscheiden onder de exemplaren, die in de collecties aanwezig zijn.
307. *P. invisior* (Thunb.) (*stimulator* Grav.). V: 1 ♀ Noordwijk, VII. T: Venlo, Hoge Veluwe, Terlet. L: Hulshorst. ♀ 7.VIII—29.X, ♂ 7.VI—1.VII.
308. *P. ischiomelinus* (Grav.). V: Aerdenhout, Den Haag; het ♂ van Beverwijk is een *Cubocephalus* sp. T: Venlo, Kijfhoek, Meyendel. W: Burgst, Liesbos, Beekbergen. L: Delden, Hulshorst, Epen, Markelo, Putten. ♀ 20.V—5.X, ♂ 26.VI—21.VIII.
309. *P. limatus* Wesm. (DEN HOED, 1961, *Ent. Ber., Amst.* 21: 233).
310. *P. maculicornis* (Steph.). (DEN HOED, 1961, *Ent. Ber., Amst.* 21: 233).
311. *P. melagonus* (Grav.). De ♀ uit „Holland” en Den Haag zijn *fulvitaris* Wesm.; nog een ♀ en ♂ uit *Depressaria nervosa*, VIII, SNELLEN. Gezien de beide andere foutieve determinaties is het waarschijnlijk, dat ook deze gekweekte exemplaren geen *melanogonus* Grav. zijn. L: Hulshorst, Vorden,



- Meyendel, Ermelo. T: Haaren, Venlo, Schayk, Terlet. In museum Tilburg: Tilburg. ♀ 2.VIII—14.X, ♂ 30.VI—19.VII.
312. *P. muricifer* Holmgr. (DEN HOED, 1961, *Ent. Ber., Amst.* 21: 233).  
*P. nigridens* Wesm. moet vervallen voor de fauna. *P. nigridens* Smits v. Burgst nec Wesm. is een mengsoort. Zijn inlands ♂ is een *Diadromus arrisor* Wesm.
313. *P. osculator* (Thunb.). (DEN HOED, 1961, *Ent. Ber., Amst.* 21: 233).
314. *P. parvulus* Pfeff. Nieuw voor de fauna. T: Een aantal ♂ Schayk, 29.VI, en 6 ♀, 23.VIII—24.IX.
315. *P. planifrons* Wesm. Nieuw voor de fauna. L: 1 ♂ Epen, VIII.1926. Alle exemplaren van SMITS VAN BURGST behoren tot andere soorten, drie tot *Aethecerus*, een tot een andere *Phaeogenes*-soort, zodat deze soort door hem ten onrechte als inlands was opgegeven.  
*P. rusticatus* Wesm. = *Dirophanes rusticatus* Wesm.
316. *P. semivulpinus* (Grav.) (*primarius* Wesm.). V: Utrecht, Leiden, Breda. De ♂, waarop de beschrijving volgens SNELLEN VAN VOLLENHOVEN niet geheel paste, behoren tot een cryptinen-species; het ♀ van Helpman (gem. Groningen) is een *Colpognathus*. W: Utrecht. L: Epen, Hulshorst, Groesbeek, Oosterbeek. T: Venlo, Den Dungen, Cromvoirt, Tilburg. A: Nijmegen. ♀ 10.VII—27.IX, ♂ 13.VII—5.VIII.
317. *P. socialis* (Ratz.). Nieuw voor de fauna. L: 1 ♀ dat niet geheel zeker tot deze soort behoort, 27.IX.1933. (HABERMEHL det.).
318. *P. stipator* Wesm. W: 1 ♀ en ♂ VIII.1866 uit *Depressaria nervosa*, 1 ♀ Driebergen, X; 1 ♀ Rotterdam uit *Orthotaelia sparganella*, 26.VII.1864; 1 ♂ Burgst, VIII. A: 1 ♀ gekweekt uit *Depressaria nervosa*, SNELLEN.
319. *P. subulifer* Holmgr. Nieuw voor de fauna. T: 1 ♀ Kijfhoek, 5.VIII.1941. (ROMAN det.).
320. *P. suspicax* Wesm. T: 1 ♀ en 3 ♂ Meyendel, 24.V; 1 ♀ Venlo, 9.IV, 1 ♂ Venlo 20.VII. Deze exemplaren zijn niet meer in de collectie T. aanwezig. L: 1 ♀ Meyendel (HABERMEHL det.), 1 ♀ Hulshorst, 26.IX.
321. *P. tibiator* (Thunb.). Nieuw voor de fauna. T: Venlo, Voorburg, Haaren, Geertruidenberg, Schayk. ♀ 10.IX—23.IX, ♂ 3.VIII—19.X.
322. *P. trepidus* Wesm. Reeds vermeld van Nuth door Mr. MAURISSEN (1882, *Tijdschr. Ent.* 25: CXV). T: 3 ♀ Venlo, 1 ♀ Geijsteren (ROMAN det.). ♀ 20.VI—8.X.
323. *P. vafer* Wesm. Nieuw voor de fauna. T: Venlo, Schayk, Den Dolder. ♀ 24.IV—29.V en 15.IX—27.X, ♂ 11.VIII—24.VIII.  
Opm.: *P. pfefferi*, nom. nov. (*minimus* Pfeff. nec Berth.).  
This species does not occur with us, but has to change the name.

#### *Dirophanes* Först.

324. *D. rusticatus* Wesm. T: 1 ♂ Schayk, 29.VII.1948; 1 ♂ Oploo, 17.VII.1947.

#### Summary

Check list of the Ichneumonidae, subfam. Ichneumoninae, known to the author as occurring in the Netherlands, with the localities and dates of appearance. Names of species and varieties in bold type are new to the Netherlands fauna.



Newly described is *Hepiopelmus variegatus* (Panz.), var. *obscurus*, and a new name is given to *Phaeogenes montanus* Pfeff. nec Thoms., viz. *P. anderi* and to *Phaeogenes minimus* Pfeff. nec Berth., viz. *P. pfefferi*.

#### Literatuur

- DILLER, E., 1966. Zur Differenzierung der Männchen von *Patrocloides sputator* (F.) und *Stenichneumon culpator* (Schrank). *Ent. Z. Frankf. a. M.* 76: 249—254, fig. 1—8.
- DINTHER, J. B. M. VAN, 1951. Enkele observaties van *Barichneumon peregrinator* L. *Ent. Ber., Amst.* 13: 353—354.
- HEINRICH, G., 1949a. Ichneumoniden des Berchtesgadener Gebietes. *Mitt. Münch. ent. Ges.* 35—39: 1—101.
- , 1949b. Neue und interessante Schlupfwespen aus Bayern. *L.c.*: 101—127.
- , 1951a. *Barichneumon tegelensis* spec. nov. ♀. *Ent. Ber., Amst.* 13: 351.
- , 1951b. Ichneumoniden der Steiermark. *Bonn. zool. Beitr.* 2: 235—290.
- HOED, G. DEN, 1961. Bijdrage tot de studie der Ichneumoniden 1. *Ent. Ber., Amst.* 21: 225—233.
- , 1962. Bijdrage etc. 3. *Op. cit.* 22: 225—233.
- , 1963. Bijdrage etc. 4. *Op. cit.* 23: 82—84.
- , 1964. Bijdrage etc. 5. *Op. cit.* 24: 61—62.
- , 1965a. Bijdrage etc. 6. *Op. cit.* 25: 1—4.
- , 1965b. Bijdrage etc. 8. *Op. cit.* 25: 185—186.
- , 1966. Bijdrage etc. 7. *Op. cit.* 26: 74—76.
- MAURISSEN, A. H., 1882. Lijst van insecten, in Limburg en niet in andere provinciën van Nederland waargenomen. *Tijdschr. Ent.* 25: CX—CXX.
- SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, S. C., 1873. Nieuwe naamlijst van Nederlandsche vliesvleugelige insecten (Hymenoptera), Tweede stuk. *Tijdschrift Ent.* 16: 147—220.
- TOWNES, H., 1965. Nomenclatural notes on European Ichneumonidae. *Polskie Pismo ent.* 35: 409—417.
- TOWNES, H. & M., 1951, in C. MUESEBECK, K. KROMBEIN & H. TOWNES, Hymenoptera of America North of Mexico. Synoptic Catalog. Agriculture monograph 2: 1—1420.
- TOWNES, H. S., S. MOMOI & M. TOWNES, 1965. A Catalogue and Reclassification of the Eastern Palearctic Ichneumonidae. *Mem. Amer. ent. Inst.* 5: 1—602.
- WALKLEY, L. M., 1958, in K. KROMBEIN, Hymenoptera of America North of Mexico, Synoptic Catalog, first supplement, Agriculture Monograph 2: 1—305.
- , 1967, in K. KROMBEIN & B. D. BURKS, Hymenoptera of America North of Mexico, Synoptic Catalog, second supplement. Agriculture Monograph 2: 1—584.

Best, Hoofdstraat 31.

† Willemse, C., *De in Nederland voorkomende oorwormen*. Vierde druk, herzien door Dr. G. KRUSEMAN. Wetenschappelijke Mededeling nr. 4 van de K. N. N. V., pp. 16, 11 fig., 4 kaarten. December 1971.

De vierde druk van deze bekende W. M. is geheel bijgewerkt wat de faunistische gegevens betreft, terwijl naast de door Dr. WILLEMSE zelf samengestelde determinatietabel nog een tweede voorkomt, die van Dr. KRUSEMAN afkomstig is. Met behulp van deze twee tabellen moet het zeker mogelijk zijn alle oorwormen op naam te brengen, voor zover het tenminste geen larven zijn. Nieuw zijn de vier verspreidingskaarten, die duidelijker dan woorden aangeven welke de thans bekende verspreiding der vijf soorten in Nederland is.

Slechts één opmerking: het zou aanbeveling verdienen bij een volgende druk in de literatuurlijst de titels van de tijdschriften af te korten volgens de World List. Een afkorting als E. B. is alleen voor ingewijden begrijpelijk!

De prijs is voor leden van N. E. V. en K. N. N. V. f 2,65 en voor anderen f 3,15. Bestellen door storting van het verschuldigde op postrekening 13028 van Bureau K. N. N. V. te Hoogwoud N.H. — LPK.