

595.706492

E61
Ent.

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSE ENTOMOLOGISCHE VERENIGING

Deel 32

1 juni 1972

No 6

Adres van de Redactie:

B. J. LEMPKE, Oude IJselstraat 12 III, Amsterdam 1010 — Nederland

INHOUD: Jean Belle: Nederlandse Odonata verzameld in de afgelopen vijf jaren (1966-1971) (p. 105). — B. J. Lempke: Trekvinders in 1970 (p. 113). — R. C. H. M. Oudejans: Studies on Coleophoridae (Lepidoptera) II. A new name for Coleophora icterella Toll 1949 (p. 120). — J. T. Wiebes: A new species of Agaon from Nigeria (Hymenoptera, Chalcidoidea) (p. 122). — Literatuur (p. 112, 121: W. N. Ellis). — Korte mededelingen (p. 112: Nieuwe aanwinsten voor de bibliotheek; p. 124: Aangeboden).

Nederlandse Odonata verzameld in de afgelopen vijf jaren (1966-1971)

door

JEAN BELLE

In augustus 1965 keerde ik terug na een dertienjarig verblijf in Suriname. De resterende maanden van hetzelfde jaar had ik volledig nodig om me weer in te burgeren. Het onderzoek naar het voorkomen van de Odonata in de daarop volgende vijf jaren werd door mij hoofdzakelijk in zuid-oost Nederland gedaan. Verder ook in Overijssel, het midden van ons land en bij de Nieuwkoopse Plassen. Meestal ging ik op stap op zonnige weekends en vakantiedagen.


Het leek me nuttig de resultaten van dit recent onderzoek, hoe beperkt ook in sommige opzichten, in een publikatie vast te leggen. Ik wil dat dan doen aan de hand van alle uit Nederland bekende libellen, dat zijn 68. De soorten van een bepaalde familie heb ik alfabetisch gerangschikt.

Totaal werden door mij in die vijf jaren 47 soorten verzameld, 19 Zygoptera en 28 Anisoptera, behorende tot 8 families en 21 geslachten. Alleen van de imagines die ik heb opgezet zijn de vindplaatsgegevens vermeld; de libellen in papillotten alsmede het larvenmateriaal moeten bij gelegenheid nog eens worden uitgewerkt. Tenslotte heb ik ook nog mijn indrukken over het voorkomen van een bepaalde soort in het onderzochte gebied in het kort gegeven.

ZYGOPTERA

Calopterygidae

1. *Calopteryx splendens* (Harris, 1782). — Talrijk langs sommige beken van Noord-Brabant (Dommel, Beerze, enz.), veel minder langs de beken van de



Achterhoek. Ook langs de Maas bij Elsloo. Een enkele ook bij stilstaand water (Ommen).

Winterswijk (G.), Slinge, 26.VI.1966, 1 ♂, 1 ♀.

2. *Calopteryx virgo* (Linnaeus, 1758). — Op dezelfde plaatsen als *C. splendens*, maar niet langs de Maas bij Elsloo aangetroffen. De soort komt in de Achterhoek talrijker voor dan *C. splendens*, daarentegen komt *C. splendens* langs de beken van Noord-Brabant veel talrijker voor dan *C. virgo*.

Winterswijk (G.), Slinge, 26.VI.1966, 1 ♂, 1 ♀.

hualisboN

Lestidae

3. *Lestes barbarus* (Fabricius, 1798). — Niet verzameld.

4. *Lestes dryas* Kirby, 1890. — Op verschillende plaatsen aangetroffen, maar altijd sporadisch.

Blijenbeek (L.), 4.IX.1969, 1 ♂; Malpieven (N.Br.), 9.VII.1970, 1 ♂; Loener Mark (G.), 12.VIII.1970, 1 ♂; Tongerense Heide (G.), 5.IX.1971, 1 ♂.

5. *Lestes sponsa* (Hansemann, 1823). — Algemeen. Bij Heijen vond ik naast exemplaren van normale afmetingen ook zeer kleine (♂: abdomen 25 mm, achtervleugel 17 mm!).

Loener Mark (G.), 19.VII.1966, 1 ♂, 1 ♀; Borkel (N.Br.), 22.VI.1969, 1 ♀; Blijenbeek (L.), 8.VIII.1969, 1 ♂; Heijen (L.), 2.VIII.1970, 2 ♂; Grebbeberg (U.), uiterwaarden, 22.VII.1971, 1 ♂; Nieuwkoopse Plassen (Z.H.), 17.VIII.1971, 1 ♀; Tongerense Heide (G.), 5.IX.1971, 1 ♀.

6. *Lestes virens vestalis* Rambur, 1842. — Plaatselijk talrijk bij vennen.

Melickerven (L.), 27.VII.1966, 1 ♂, 1 ♀; 27.VIII.1967, 1 ♂, 1 ♀; Blijenbeek (L.), 13.VII.1969, 1 ♂; 2.VIII.1969, 1 ♂; Assel (G.), 12.VIII.1969, 1 ♂; Afferden (L.), 29.VIII.1970, 1 ♀.

7. *Lestes viridis* (van der Linden, 1825). — Algemeen.

Oploo (N.Br.), 25.VII.1967, 1 ♂, 1 ♀; Velp (G.), 23.VIII.1967, 1 ♂; Melickerven (L.), 27.VIII.1967, 1 ♀; Plasmolen (L.), 7.VIII.1969, 1 ♂; Ommen (O.), 10.VIII.1969, 1 ♂; Wolfheze (G.), 22.VIII.1971, 1 ♂.

8. *Sympecma braueri* (Bianchi, 1902). — Niet verzameld.

9. *Sympecma fusca* (van der Linden, 1823). — Tamelijk veel jonge exemplaren werden aangetroffen in de buurt van Bergeijk. Eén overwinterd exemplaar werd verzameld in America. De soort kan dus worden toegevoegd aan de lijst van KIAUTA (1964) voor dit Peelgebied.

Bergeijk (N.Br.), 26.VII.1968, 1 ♀, 26.VII.1969, 1 ♂; America (L.), 30.V.1971, 1 ♂.

Coenagrionidae

10. *Cercion lindeni* (Selys, 1840). — Niet verzameld.

11. *Ceriagrion tenellum* (de Villers, 1786). — Alleen in Limburg aangetroffen bij vennen omringd door bos.

Plasmolen (L.), 15.VI.1969, 1 ♂, 1 ♀; 4.VII.1969, 1 ♂, 1 ♀; Melickerven (L.), 8.VIII.1971, 1 ♂.

12. *Coenagrion armatum* (Charpentier, 1840). — Niet verzameld.
13. *Coenagrion bastulatum* (Charpentier, 1825). — Talrijk in de Achterhoek bij het Wooldse Veen.
Wooldse Veen (G.), 20.V.1971, 1 ♂; 29.V.1971, 2 ♂, 3 ♀.
14. *Coenagrion mercuriale* (Charpentier, 1840). — Niet verzameld.
15. *Coenagrion puella* (Linnaeus, 1758). — Algemeen.
Loener Mark (G.), 19.V.1966, 1 ♂, 1 ♀; Ommen (O.), 16.V.1967, 1 ♂; Heelsum ((G.)), 2.VI.1968, 1 ♂; Leur (G.), 25.V.1969, 1 ♀; Woezik (G.), 11.VI.1969, 1 ♂, 1 ♀.
16. *Coenagrion pulchellum* (van der Linden, 1825). — Algemeen.
Arnhem (G.), 18.V.1966, 1 ♂; Herwen (G.), 14.V.1967, 1 ♀; Ommen (O.), 16.V.1967, 1 ♂, 1 ♀; Heelsum (G.), 2.VI.1968, 1 ♂, 1 ♀; Bergeijk (N.Br.), 26.VII.1968, 1 ♂; Leur (G.), 22.V.1969, 1 ♀; Plasmolen (L.), 15.VI.1969, 1 ♀.
17. *Coenagrion vernale* (Hagen, 1839). — Plaatselijk talrijk.
Hatert (G.), Uiversnest, 13.V.1967, 1 ♂, 1 ♀; Meddo (G.), 9.VI.1968, 1 ♂; Borkel (N.Br.), Molenven, 1 ♂; 30.V.1971, 1 ♀; Winterswijk (G.), steenfabriek „De Vlijt”, 20.V.1971, 1 ♂; Korenburger Veen (G.), 20.V.1971, 1 ♂; Heeze (N.Br.), 30.V.1971, 1 ♂.
18. *Enallagma cyathigerum* (Charpentier, 1840). — Algemeen.
Loener Mark (G.), 19.V.1966, 1 ♂, 1 ♀; Deelse Was (G.), 5.VI.1966, 1 ♂, 1 ♀; Winterswijk (G.), steenfabriek „De Vlijt”, 16.VII.1969, 1 ♂; Blijenbeek (L.), 8.VIII.1962, 2 ♂.
19. *Erythromma najas* (Hansemann, 1823). — Plaatselijk talrijk bij vennen en vijvers met drijvende waterplantbladeren.
Velp (G.), 4.VI. 1966, 1 ♂; 15.VI.1966, 1 ♂, 1 ♀; Ommen (O.), 16.V. 1967, 1 ♀; Heelsum (G.), 2.VI.1968, 1 ♂; Heteren (G.), 14.VI.1969, 1 ♂; Malpieven (N.Br.), 30.V.1971, 1 ♂; Plasmolen (L.), 4.VI.1971, 1 ♀; Grebbeberg (U.), uiterwaarden, 22.VII.1971, 1 ♂.
20. *Erythromma viridulum* Charpentier, 1840. — Talrijk in de uiterwaarden van de Rijn bij de Grebbeberg. Een verrassende ontdekking! De soort staat bekend als zeer zeldzaam. LIEFTINCK (1925) vermeldt één onuitgekleurd ♂ uit Heerlen verzameld in 1917. In het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden bevinden zich één ♂ en één ♀ uit Wageningen. Beide werden verzameld door ons medelid de heer GEIJSKES in 1938. Het inheems karakter van het ♂ van „Nederland” uit de collectie van VAN DER WEELE (LIEFTINCK 1925, voetnoot op pag. 128) wordt, nu de soort in centraal Nederland talrijk blijkt voor te komen, wel zeer aannemelijk. *E. viridulum* komt evenals *E. najas* voor in de vijvers met drijvende waterplantbladeren.
Grebbeberg (U.), uiterwaarden, 22.VII.1971, 7 ♂, 2 ♀ (één paar in copula).
21. *Ischnura elegans* (van der Linden, 1823). — Algemeen.
Arnhem (G.), 18.V.1966, 2 ♂, 2 ♀; Meddo (G.), 10.IX.1967, 2 ♀; Woezik (G.), 11.VI.1969, 1 ♂; Grebbeberg (U.), uiterwaarden, 22.VII.1971, 1 ♀.
22. *Ischnura pumilio* (Charpentier, 1825). — In de Achterhoek niet zeldzaam, maar nooit talrijk. De meest westelijke vindplaats is Woezik, Land van Maas en

Waal. Het zou interessant zijn na te gaan hoe ver deze soort in ons land westelijk doordringt.

Meddo (G.), 10.IX.1967, 1 ♀; 17.IX.1967, 1 ♀; 9.VI.1968, 1 ♂; Woezik (G.), 11.VI.1969, 1 ♂; Winterswijk (G.), steenfabriek „De Vlijt”, 16.VII.1969, 1 ♂.

23. *Nehalennia speciosa* (Charpentier, 1840). — Niet verzameld.

24. *Platycnemis pennipes* (Pallas, 1771). — Talrijk zowel bij stilstaand water (Achterhoek, Belfeld) als bij verschillende beken (Dommel, Beerze, enz.). Ook langs de Maasoever bij Elsloo.

Meddo (G.), 9.VI.1968, 1 ♂; Borkel (N.Br.), Dommel, 25.VII.1967, 1 ♀; Belfeld (L.), 30.VII.1971, 1 ♂.

25. *Pyrrhosoma nymphula* (Sulzer, 1776). — Algemeen. De soort heeft een langere vliegtijd dan doorgaans wel wordt aangenomen. Ook deze soort kan worden toegevoegd aan de lijst van KIAUTA (1964) voor het Peelgebied in de omgeving van Mariaveen.

Loener Mark (G.), 19.V.1966, 1 ♂, 1 ♀; Leur (G.), 25.V.1969, 1 ♀; Plasmolen (L.), 15.VI.1969, 1 ♂; America (L.), 30.V.1971, 1 ♀; Wolfheze (G.), 22.VIII.1971, 1 ♂.

ANISOPTERA

Aeshnidae

26. *Aeshna affinis* van der Linden, 1823. — Niet verzameld.

27. *Aeshna cyanea* (Müller, 1764). — Algemeen.

Loener Mark (G.), 10.VII.1966, 1 ♂, 1 ♀; Winterswijk (G.), steenfabriek „De Vlijt”, 16.VI.1969, 1 ♀; Plasmolen (L.), 7.VIII.1969, 1 ♂.

28. *Aeshna grandis* (Linnaeus, 1785). — Algemeen.

Velp (G.), 12.VIII.1966, 1 ♀; Loener Mark (G.), 1.VIII.1969, 1 ♀; Ommen (O.), 10.VIII.1969, 1 ♂.

29. *Aeshna isosceles* (Müller, 1767). — In aantal aangetroffen bij de vennen van de Plasmolen.

Plasmolen (L.), 13.VI.1969, 1 ♂; 15.VI.1969, 1 ♀.

30. *Aeshna juncea* (Linnaeus, 1758). — Talrijk bij sommige vennen in hoogveenstreken. Ook in aantal aangetroffen in de bossen ten oosten van Valkenswaard.

Loener Mark (G.), 19.VIII.1966, 1 ♂; 20.VIII.1966, 1 ♀; Borkel (N.Br.), 21.VII.1967, 1 ♀; Meddo (G.), 10.IX.1967, 1 ♀; Heijen (L.), 13.VII.1969, 1 ♂; Blijenbeek (L.), 2.VIII.1969, 1 ♂; 3.VIII.1969, 1 ♀; Tongerense Heide (G.), 5.IX.1971, 1 ♂.

31. *Aeshna mixta* Latreille, 1805. — Algemeen.

Doorwerth (G.), 17.VIII.1966, 1 ♂, 1 ♀; Loofles (G.), 22.VIII.1967, 1 ♂; Blijenbeek (L.), 3.VIII.1969, 1 ♂; Plasmolen (L.), 7.VIII.1969, 1 ♂; Loener Mark (G.), 18.VIII.1969, 1 ♀; Tongerense Heide (G.), 5.IX.1971, 1 ♂.

32. *Aeshna subarctica elisabethae* Djakonov, 1922. — Niet verzameld.

33. *Aeshna viridis* (Eversmann, 1836). — Niet aangetroffen in het zuiden en oosten van ons land, hoewel KIAUTA (1964) larven van deze soort uit Mariaveen

vermeldt. Ik vond de soort bij de Nieuwkoopse Plassen vliegend boven de rietvelden.

Nieuwkoopse Plassen (Z.H.), 17.VIII.1971, 1 ♂.

34. *Anax imperator* Leach, 1815. — Algemeen, vooral bij grote open plassen en vennen.

Velp (G.), 11.VI.1966, 1 ♂; Meddo (G.), 7.VII.1968, 1 ♀; Winterswijk (G.), steenfabriek „De Vlijt”, 16.VII.1969, 1 ♂; Loener Mark (G.), 1.VIII.1969, 1 ♀; Blijenbeek (L.), 3.VIII.1969, 1 ♀.

35. *Anax parthenope* (Selys, 1839). — Niet verzameld.

36. *Brachytron hafniense* (Müller, 1764). — Algemeen. Talrijk bij de vennen van de Plasmolen.

Arnhem (G.), 4.VI.1966, 1 ♀; Heelsum (G.), 15.VI.1968, 1 ♀; Leur (G.), 25.V.1969, 1 ♀; Plasmolen (L.), 13.VI.1969, 1 ♂; Heteren (G.), 14.VI.1969, 1 ♂.

G o m p h i d a e

37. *Gomphus flavipes* (Charpentier, 1825). — Niet verzameld.

38. *Gomphus pulchellus* Selys, 1840. — Niet zeldzaam bij grote open plassen, vooral in leengebieden.

Velp (G.), 11.VI.1966, 1 ♀; 15.VI.1966, 1 ♂; Meddo (G.), 9.VI.1968, 1 ♂; Leur (G.), 11.VI.1969, 1 ♂; 22.VI.1969, 1 ♀; Heteren (G.), 20.VI.1969, 1 ♂; 21.VI.1969, 1 ♀; Winterswijk (G.), steenfabriek „De Vlijt”, 18.VI.1970, 1 ♂.

39. *Gomphus vulgatissimus* (Linnaeus, 1758). — Vrij zeldzaam, maar in aantal aangetroffen langs de Beerze bij Lennisheuvel.

Lennisheuvel (N.Br.), Beerze, 31.V.1971, 4 ♂.

40. *Onychogomphus forcipatus* (Linnaeus, 1758). — Niet verzameld.

41. *Ophiogomphus cecilia* (de Fourcroy, 1785). — Niet verzameld.

C o r d u l e g a s t e r i d a e

42. *Cordulegaster boltoni* (Donovan, 1807). — In aantal aangetroffen in het natuurreservaat bij Borkel (Belle, 1971, 9 ♂ moet zijn 11 ♂). Eenmaal ook bij stilstaand water (Belle, 1971).

Borkel (N.Br.), 21.VII.1967, 11 ♂, 2 ♀; 22.VII.1969, 2 ♂; Melickerven (L.), 8.VI.1969, 1 ♀.

C o r d u l i i d a e

43. *Cordulia aenea* (Linnaeus, 1758). — Vrij talrijk bij vennen omringd door bos.

Hatert (G.), Uiversnest, 13.V.1967, 2 ♂, 1 ♀; Plasmolen (L.), 24.V.1969, 1 ♂; Melickerven (L.), 8.VI.1969, 1 ♂; Borkel (N.Br.), 7.VI.1970, 1 ♂, 1 ♀; Winterswijk (G.), steenfabriek „De Vlijt”, 18.VI.1970, 1 ♂.

44. *Epithecina bimaculata* (Charpentier, 1825). — Niet verzameld.

45. *Oxygastra curtisi* (Dale, 1834). — Niet verzameld.

46. *Somatochlora arctica* (Zetterstedt, 1840). — Zeldzaam, slechts één exemplaar werd verzameld.

Melickerven (L.), 8.VI.1969, 1 ♂.

47. *Somatochlora flavomaculata* (van der Linden, 1825). — Talrijk boven de moerassen van het natuurreservaat bij Borkel.

Borkel (N.Br.), 7.VII.1970, 3 ♂.

48. *Somatochlora metallica* (van der Linden, 1825). — Algemeen.

Velp (G.), 1.VII.1966, 1 ♂; Borkel (N.Br.), 21.VII.1967, 1 ♂; Plasmolen (L.), 4.VII.1969, 1 ♂; Blijenbeek (L.), 13.VII.1969, 1 ♂; Heteren (G.), 14.VII.1969, 1 ♀; Bergeijk (N.Br.), 26.VII.1969, 1 ♀.

Libellulidae

49. *Crocothemis erythraea* (Brullé, 1832). — Niet verzameld. Wel werd een mannelijk exemplaar van deze opvallende „Feuerlibelle” aangetroffen langs de rechter Maasoever bij Elsloo (L.) op 30.VI.1968 (Belle, 1971).

50. *Leucorrhinia albifrons* (Burmeister, 1839). — Niet verzameld.

51. *Leucorrhinia caudalis* (Charpentier, 1840). — Niet verzameld.

52. *Leucorrhinia dubia* (van der Linden, 1825). — Algemeen.

Loener Mark (G.), 30.VI.1966, 1 ♂; Hatert (G.), Uiversnest, 13.VI.1967, 1 ♂; Someren (N.Br.), 22.VI.1969, 1 ♀; Blijenbeek (L.), 8.VIII.1969, 1 ♂; Borkel (N.Br.), 7.VI.1970, 1 ♂, 1 ♀.

53. *Leucorrhinia pectoralis* (Charpentier, 1825). — Sporadisch voorkomend.

Blijenbeek (L.), 14.VI.1970, 2 ♂, 1 ♀, één paar in copula; 27.VI.1970, 1 ♂; Plasmolen (L.), 4.VI.1971, 1 ♂, 1 ♀ (in copula).

54. *Leucorrhinia rubicunda* (Linnaeus, 1758). — Algemeen.

Deelense Was (G.), 5.VI.1966, 1 ♂, 1 ♀; Loener Mark (G.), 7.VI.1969, 1 ♀; Borkel (N.Br.), 7.VI.1970, 1 ♂; Blijenbeek (L.), 2.VIII.1970, 1 ♂.

55. *Libellula depressa* Linnaeus, 1758. — Algemeen.

Meddo (G.), 14.VII.1968, 1 ♂; Woezik (G.), 2.VI.1969, 2 ♂; 11.VI.1969, 1 ♀; Valkenswaard (N.Br.), 12.VII.1970, 1 ♂; Lexkesveer (G.), 9.VII.1971, 1 ♀; Belfeld (L.), Mariahoef, 30.VII.1971, 1 ♂.

56. *Libellula fulva* Müller, 1764. — Niet verzameld.

57. *Libellula quadrimaculata* Linnaeus, 1758. — Algemeen.

Loener Mark (G.), 19.V.1966, 1 ♂, 1 ♀; Oploo (N.Br.), 25.VII.1967, 1 ♂; Hatert (G.), Uiversnest, 22.V.1969, 1 ♂; Woezik (G.), 11.VI.1969, 1 ♀; Melickerven (L.), 8.VI.1969, 1 ♂; Plasmolen (L.), 13.VI.1969, 1 ♂; Winterswijk (G.), steenfabriek „De Vlijt”, 18.VI.1970, 1 ♂.

58. *Orthetrum brunneum* (de Fonscolombe, 1835). — Niet verzameld.

59. *Orthetrum caerulescens* (Fabricius, 1798). — Vrij zeldzaam, alleen aangetroffen langs een smal slootje in de buurt van Belfeld.

Belfeld (L.), Mariahoef, 30.VII.1971, 3 ♂.

60. *Orthetrum cancellatum* (Linnaeus, 1758). — Algemeen.

Velp (G.), 11.VI.1966, 1 ♂; Meddo (G.), 9.VI.1968, 1 ♂; Bergeijk (N.Br.), 22.VII.1968, 1 ♀; Heteren (G.), 21.VI.1969, 1 ♂; Heijen (L.), 13.VII.1969, 1 ♂; Winterswijk (G.), steenfabriek „De Vlijt”, 18.VI.1970, 1 ♀; Belfeld (L.), 30.VII.1971, 1 ♂.

61. *Sympetrum danae* (Sulzer, 1776). — Algemeen.
Melickerven (L.), 27.VII.1966, 1 ♂; Loener Mark (G.), 18.VIII.1967, 1 ♂;
Meddo (G.), 10.IX.1967, 2 ♀.
62. *Sympetrum depressiusculum* (Selys, 1841). — Niet verzameld.
63. *Sympetrum flaveolum* (Linnaeus, 1758). — Algemeen.
Melickerven (L.), 27.VIII.1967, 3 ♂, 1 ♀; Velp (G.), 30.VIII.1967, 1 ♀;
Loener Mark (G.), 6.IX.1967, 1 ♂; 12.VIII.1970, 1 ♀; Heelsum (G.), 10.VIII.
1968, 1 ♂, 2 ♀; Blijenbeek (L.), 29.VII.1969, 1 ♂.
64. *Sympetrum fonscolombeii* (Selys, 1840). — Zeldzaam. Slechts in Velp in
1966 aangetroffen.
Velp (G.), 22.VI.1966, 1 ♂; 2.VIII.1966, 1 ♀.
65. *Sympetrum meridionale* (Selys, 1841). — Niet verzameld.
66. *Sympetrum sanguineum* (Müller, 1764). — Algemeen.
Velp (G.), 12.VIII.1966, 1 ♂; Heelsum (G.), 10.VII.1968, 1 ♀; Plasmolen
(L.), 7.VIII.1969, 1 ♂; Bemmelen (G.), 15.VIII.1970, 1 ♂.
67. *Sympetrum striolatum* (Charpentier, 1840). — Algemeen.
Meddo (G.), 10.IX.1967, 1 ♂, 1 ♀.
68. *Sympetrum vulgatum* (Linnaeus, 1758). — Algemeen.
Velp (G.), 12.VIII.1966, 1 ♂, 1 ♀; Loener Mark (G.), 18.VIII.1967, 1 ♂,
1 ♀; Meddo (G.), 10.IX.1967, 1 ♂; Bergeijk (N.Br.), 1 ♂, 1 ♀; Stein (L.),
9.VIII.1970, 1 ♀; Ommen (O.), 10.VIII.1969, 1 ♂.

Geciteerde literatuur

- BELLE, J., 1971. De libellenpopulatie van een bijzondere biotoop (Odonata). — *Ent. Ber.*,
Amst. 31: 140—142.
- KIAUTA, B., 1964. Over de libellenfauna van het hoogveen in het Peelgebied (Odonata). —
Levende Nat. 67: 12—17. 3 fig.
- LIEFTINCK, M. A., 1925. Odonata Neerlandica. I Zygoptera. — *Tijdschr. Ent.* 68: 61—174,
59 fig.

Abstract

A report on the Odonata collected mainly in south-east Netherlands during 1966—1971, by the author himself. Special attention may be paid to the "rare" Zygopterous species *Erythromma viridulum* Charp., which was abundantly encountered in central Netherlands near the Grebbeberg.

Velp (Gld.), Onder de Beumkes 35.