

## Saldula melanoscela Fieb., een vermeldenswaardige Saldula van Terschelling (Hem., Heteroptera)

door  
J. H. WOUDESTRA

Bij mijn jaarlijkse bezoeken aan dit eiland ving ik in augustus 1965 enige exemplaren van een oeverwants, waarvan ik dacht dat het de reeds lang door mij gezochte en reeds eerder van de eilanden vermelde soort *S. arenicola* Sch. zou zijn. De door mij gevonden exemplaren waren echter veel kleiner en bleken na determinatie door de heer GRAVESTEIN te behoren tot de soort *S. melanoscela* Fieb., die tot nu toe alleen vermeld is uit Zuid-Limburg door FOKKER, vindplaats Eijsden, en door MAC GILLAVRY, vindplaats Valkenburg, VII.1907.

De heer COBBEN deelde mij mede, dat hij de soort wel verwachtte in Z.O.-Nederland, maar zeker niet van de eilanden. Het is, in vergelijking met de andere *Saldula*'s, een zeer vlugge en daardoor moeilijk te vangen soort, gemakkelijk in het veld te herkennen aan de grote lichte vlekken aan de zijkant van het corium alsmede aan de geringe grootte. De vleugeltekening lijkt op die van *S. arenicola*. *S. melanoscela* is van deze laatste soort onderscheiden door de onderbroken streep op de tibia van de voorpoot en de uniform donkere basishelft van de achterfemur. De dieren werden hoofdzakelijk gevonden in het karrespoor evenwijdig aan de stuifdijk op de Bosplaat ongeveer ter hoogte van paal 24, terwijl enkele exemplaren echter ook in de directe omgeving van het karrespoor voorkwamen. Tijdens een excursie met de heren VISSER en DE SMIDT van het „Biologisch Station” in juli 1968 werd *melanoscela* wederom aangetroffen. De heer CHR. G. VAN LEEUWEN van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer maakte de hierna volgende vegetatie-opname van de vindplaats. „De begroeiing bestaat uit een mozaïek van het *Carex extensa*-*Juncus gerardi* gezelschap en *Festuca rubra*-eilanden, afgewisseld met tot het Loto-Trifolion te rekenen fragmenten, waarin soorten optreden als *Leontodon autumnalis*, *Trifolium repens*, *T. fragiferum*, *Juncus anceps* en *Schoenus nigricans*. Het *Carex extensa*-gezelschap omvat, behalve de dominante Gestrekte Zegge en de abundante *Juncus gerardi*, verder de abundante soorten *Odontites littoralis* en *Centaureum pulchellum*, de frequente soort *Trichlogia maritima* en schaars voorkomend *Glauca maritima* en *Armeria maritima*.”

### Summary

*Saldula melanoscela* Fb. was captured in 1965 and 1968 on the Island of Terschelling off the north coast of the Netherlands. The species was only known from a few localities in the extreme south-eastern part of the province of Limburg.

Zaandam, Noordse Bos 13.

---

Dagvlinder op licht. In 1969 trof ik in mijn vlinderval te Annendaal (Echt) een vers exemplaar aan van *Lasionmata megera* L.

A. W. P. MAASSEN, Julianastraat 2, Montfort (Lb.).