

vondst betreft. De naam „E. J. Kortenoever” op het eerstgenoemde etiket is wel zeer misleidend.

Ik heb een mannelijk exemplaar van *Crocothemis erythraea* ontmoet op de rechter Maasoever bij Elsloo, Limburg. Die dag, 30 juni 1968, was het droog en warm maar niet erg zonnig, omdat de lucht op grotere hoogte heilig was. Behalve nog enige Zygoptera-soorten (*Calopteryx*, *Platycnemis*, *Ischnura*) was geen andere libel in de omgeving te zien. Het dier, dat door zijn helder rode kleur bijzonder sterk opviel, gaf niet de indruk schuw te zijn. Het rustte tenslotte uit tegen een laaghangend dood takje toebehorend aan één van de vele bomen die daar de Maasoever sieren en kon zeker wel een minuut of vijf lang nauwkeurig worden bestudeerd. Het bevond zich juist iets te hoog om gevangen te kunnen worden.

### Summary

The author would invite special attention to the Odonata fauna of some artificial ponds in the Netherlands. In the one near Herkenbosch (Melickerven) (Netherlands Limburg) the species *Somatochlora arctica* (Zett.) and *Cordulegaster boltoni* (Donov.) seem to breed.

### Geciteerde literatuur

ROBERT, P. A., 1958. Die Libellen. Creatura Naturkundliche K + F-Taschenbücher 4. Kümmerly & Frey, Geographischer Verlag, Bern.

Velp (Gld), Onder de Beumkes 35.

Verzoek. Namens de afdeling Allergologie van het Academisch Ziekenhuis te Leiden bereikte mij het verzoek mee te willen werken aan de verlichting van de ernstige overgevoeligheid voor de prik van de Regendaas bij één van hun patiënten. Het betreft hier één of alle soorten van het genus *Haematopota* (in K.N.N.V.-tabel 38: „De Nederlandse dazen (Tabanidae) en horzels (Oestridae)” abusievelijk *Chrysozona* genoemd). De meest algemene soort is *H. pluvialis* (L.), de Gewone Regendaas, die vooral bij regenachtig weer probeert u als bloeddonor te gebruiken. De 6-10 mm grote dieren zijn gemakkelijk te herkennen — en dat geldt voor alle inheemse soorten uit het genus — aan de grijze habitus en aan de gevlekte of gemarmerde vleugels (niet gebandeerd!).

Daar voor de bereiding van het desensibiliserings-agens enkele honderden exemplaren van de Regendaas nodig zijn, doe ik langs deze weg een beroep op uw medewerking. Als u de goede plek bij de juiste weersgesteldheid treft kunt u snel grote aantallen vangen. Na verdooving in normale aetherbuis gaarne droog opsturen aan: Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Raamsteeg 2, Leiden, of een berichtje per telefoon (01710-43844). — P. J. VAN HELSDINGEN.

*Odezia atrata* L. (Lep., Geometridae). Bij uitzondering dringt deze soort wel eens tot in het zuiden van Limburg door. Zie Catalogus-LEMPKE 8 : 560, 1949, en suppl. 15 : 1127, 1969. Een vindplaats geheel buiten dit gebied is Bergeijk, waar ik 28.VI.1970 een paartje ving. Toen ik na een week nog eens ging kijken, vloog er weer één. Later heb ik de vlinder er niet meer gezien.

W. VERHAAK, Bosdijk 1004, Eindhoven.

[Deze vangst maakt het wel zeer waarschijnlijk, dat Ir. HARDONK toch gelijk had, toen hij me vertelde, dat hij *atrata* bij Bergeijk had zien vliegen en dat hij zich niet vergist had met *Minoa murinata*. Cf. suppl. 15 : 1131. — LPK.]