

- 1963a. Penetration of *Coptotermes hyaloapex* Holmgr. into an underground cable in West New Guinea. — *Ent. Ber., Amst.* 23 : 30—31, 1 fig.
- 1963b. Ecological data on some neotropical Scolytidae, Platypodidae and Bostrychidae (Coleoptera), mainly of Surinam. — *Beaufortia* 9 : 232—240.
- 1963c. *Coptotermes curvignathus* causing the death of trees in Indonesia and Malaya. — *Ent. Ber., Amst.* 23 : 90—100, 6 figs.
- 1963d. Termite problems. — *Tropical Abstr.* 18 (5) : 289—294.
- 1963e. Notes on the biology of Indonesian Bostrychidae (Col.). — *Ent. Ber., Amst.* 23 : 242—257, 8 figs.
- 1964a. Observations on Lymexylonidae in Indonesia and Malaya. — *Ent. Ber., Amst.* 24 : 184—186.
- 1964b. Fruits of *Podocarpus imbricata* bored by an Anthribid and a microlepidopteron in Java. — *Ent. Ber., Amst.* 24 : 254—255, 1 fig.
- 1964c. The occurrence of *Xyleborus perforans* (Woll.) and *X. similis* in Java (Col., Scolytidae). — *Beaufortia* 11 : 131—142, 3 figs.
- 1964d. Notes on the biology of Indomalayan weevils (Curculionidae). — *Ent. Ber., Amst.* 25 : 64—67, 3 figs.
1965. Notes on some injurious Lepidoptera from Java. — *Tijdschr. Ent.* 108 : 73—93, 2 figs., pls. 6 (col.), 7—10.
1966. The biology of *Casmara kalshoveni* Diakonoff, an Oecophorid borer. — *Tijdschr. Ent.* 109 : 87—88, 1 fig.
1970. Observations on the blood-sucking Reduviid *Triatoma rubrofasciata* (DeGeer) in Java. — *Ent. Ber., Amst.* 30 : 41—47.

Enkele goede vangsten van Lepidoptera in de zomer van 1969. In 1968 had ik een kweek van *Ochrostigma velitaris* Hufn. De poppen werden buiten overwinterd. Terwijl de drukste vangst in 1968 omstreeks 1 juli was, kwamen de gekweekte exemplaren bijna alle al in juni uit. In de val ving ik ze op 13.VI, 18.VI 20.VI en 1.VII en tenslotte nog een exemplaar op 22.VII.

*Actinotia polyodon* Clerck. De eerste verscheen op 12 mei. Daarna kwamen er op 26.V (drie), 28 en 29.V, 21 en 22.VI, 1.VII en 30.VII. 3 en 4.VIII. Aangezien de drie laatste dieren zeer vers waren, vermoed ik, dat op 30 juli de tweede generatie begon te vliegen. Deze was veel schaarser dan de eerste.

Met de heer VAN DER LINDEN uit Belfeld, die over een aggregaat en een auto beschikt, kwam ik verscheidene malen in Vlodrop, Geulle en Vijlen. Op 3.VIII ving we in Geulle een ♂ van *Notodonta tritophus* Esper. De houding van de vlinder op het laken leek geweldig veel op die van *Notodonta dromedarius* L., die in veel exemplaren verscheen. Het dier had zeker een uur op het laken gezeten, toen de heer RHEIS alle exemplaren met een scherpe zaklantaarn bescheen en zo de *tritophus* ontdekte. Via de heer VAN DER LINDEN kwam het exemplaar in mijn verzameling.

Begin augustus ving we in Geulle meer dan 100 *Craniophora ligustri* L., waaronder verscheidene ♀♀. Enkele daarvan legden eitjes, die reeds na 3 tot 4 dagen de rupsjes leverden. De kweek was zeer makkelijk en voorspoedig. Reeds op 4 september waren alle rupsen verpopt, niet meer dan 3 à 4 weken na het uitkomen.

*Ateibia centrago* Haworth (*xerampelina* Hübner). Eind augustus ving ik met de heer VAN DER LINDEN meer dan 100 exemplaren bij Geulle. Onze vangplaats grensde aan een essenbos. De fraaie vlinder bleek nogal variabel te zijn. Ook van deze soort verkregen we verscheidene eitjes.

E. J. E. LÜCKER, Willem II Singel 28, Roermond.

Dagvlinder op licht. In *Ent. Ber.* 28: 100 (1968) deelde CAMPING mee, dat hij in 1967 een *Thecla betulae* op licht ving. Op 1 (of eigenlijk al 2) augustus 1969 maakten de heer VAN AARTSEN en ik iets dergelijks mee. Op deze lauwe avond hadden we het scherm opgesteld bij Overveen. Omstreeks half één 's nachts verscheen plotseling een exemplaar van *Quercusia quercus* L. op het laken. — LPK.