

10. 10679 Z
E6'
NY

X-12

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSE ENTOMOLOGISCHE VERENIGING

Deel 30

1 juni 1970

No. 6

Adres van de Redactie:

B. J. LEMPKE, Oude IJselstraat 12 III, Amsterdam 1010 — Nederland

INHOUD: S. van Heijnsbergen: Coleoptera, nieuw voor de Nederlandse fauna (p. 109). — N. Nieser: Additions au chapitre Heteroptera de „Limnofauna Europaea” (p. 111). — P. Mijzen: Pyralidae van Texel (2) (p. 119). — A. L. Cox en A. W. P. Maassen: Een notitie over *Endromis versicolora* L. (Lep., Endromididae) (p. 120). — H. J. G. Meuffels: Aantekeningen over Nederlandse Diptera (p. 122). — J. J. van Oosterhout: *Nonagria nexa* Hübner ook in Limburg (p. 126). — S. R. Wadhi & B. R. Verma: First record of phytophagous *Systasis* (Hymenoptera: Pteromalidae) p. 217). — Korte mededelingen (p. 121: B. J. Lempke; p. 125: D. F. Cupedo; p. 126: W. Hogenes).

Coleoptera, nieuw voor de Nederlandse fauna

door

S. VAN HEIJNSBERGEN



De nummers tussen haakjes geven de plaats van de betreffende soort aan in de lijst van BRAKMAN.

1. *Hydroporus fuscipennis* Schaum (431 a). 1 exemplaar in een poeltje aan de zuidkant van de Dwingelose Heide, 29.VII.1967.

2. *Quedius balticus* Korge (1279 a). 1 ♂ aan de IJselmeerkust ten N. van Naarden, 27.V.1967, onder aangespoelde algen. Dit is precies het milieu, waaruit het dier wordt vermeld van de kusten van de Oostzee, met dit verschil dat het water bij onze vindplaats geheel zoet is.

3. *Bolitochara mulsanti* Sharp (1424 a). Gronsveld, Rijkholt en Vijlen, 19—20.V.1964. Enige exemplaren, in gezelschap van *B. obliqua* Er. in *Polyporus squamosus*.

4. *Atheta (Hygroecia) elongatula* Grav. (1484), ssp. *balcanica* Brundin. Deze is uitsluitend (maar wel duidelijk) te herkennen aan de vorm van de aedeagus; ♀♀ leveren geen verschillen op. Het hoofdverspreidingsgebied ligt in Z.O. Europa, maar heeft verschillende uitstralingen naar het Westen. BRUNDIN zag exx. uit Beieren en 1 ex. uit Aken. Ik vond deze zomer aan de Gulp bij Euverem (gem. Gulpen) 1 ♂ tussen ruim 100 van de nominatvorm.

5. *Atheta (Hygroecia) debiloides* Strand (1490 a; *A. nannion* Joy, die ik in 1967 vermeldde, dient nummer 1490 b te krijgen). Naarden, 25.V.1968, 's avonds op oevergrassen, 1 ♀. Goed te herkennen aan de vorm van de ventrale plaat van het laatste achterlijfssegment.

6. *Atheta (Datomicra) dadopora* Thoms. (1569 a). Een gewone soort, veelal

SMITHSONIAN
INSTITUTION

SEP 16 1970

in gezelschap van de verwante soorten *celata* Er. en *zosteræ* Thoms.; bij voorkeur, naar het mij voorkomt, in bijna geheel verrotte zwammen, maar ook in vochtig, rottend blad. 's-Graveland en Huizen, van I tot XI, het meest in de herfst.

7. *Lathridius (Aridionomus) bifasciatus* Reiter (2390 a). Naarden, 6—10.IX. 1969, zeer talrijk in het gras op de vestingwallen, in gezelschap van o.a. *Lathr. lardarius* Deg., *Enicmus minutus* L., *E. transversus* Ol., *E. histrio* Joy en *Corticarina gibbosa* Herbst. Dit is een merkwaardige vondst, voor zover mij bekend de eerste op het vasteland van Europa. De soort is uit Australië beschreven en vandaar naar Engeland overgebracht, waar hij zich de laatste jaren sterk verspreid heeft. VON PEEZ vermoedde al, dat de soort zich mettertijd wel verder in Europa zou uitbreiden. Het is nu afwachten of hij zich hier handhaaft.

8. *Cartodere separanda* Reitter (2403 a). 's-Graveland, V—VII, herhaalde malen in aantal, uitsluitend op oude exx. van *Tyromyces sulphureus*, de zwavelzwam. Waarschijnlijk stelt de soort andere eisen aan zijn biotoop dan zijn naaste verwant *C. elongata* Curt., want hoewel *separanda* al jarenlang bekend is en gemakkelijk te herkennen, is het aantal vondsten in Middeneuropa gering.

9. *Mordella brachyura* Muls. (2644 a). Haelen (L.), 23.VII.1955, 3 exemplaren (G. BANK leg.).

10. *Haltica brittini* Sharp (3140 a). Dwingelose Heide, 25. VII—1.VIII. 1967 in enige exemplaren. De soort leeft op *Calluna* en is moeilijk te onderscheiden van de ssp. *breddini* Mohr. van *H. oleracea* L., die ook op deze vindplaats voorkomt, op dezelfde voedselplant. Voor de ♂♂ geeft genitaalonderzoek uitsluitsel.

(Over nog een nieuwe *Haltica, ericetorum* Allard, die door Dr. DEN BOER op de Dwingelose en Kralose Heide werd ontdekt, zal een uitvoeriger mededeling volgen).

Summary

The author mentions nine Coleoptera and one subspecies new to the Netherlands fauna.

Litteratuur

- BRUNDIN, L., 1944, Monographie der palaearktischen Arten der Atheta-Untergattung *Hygroecia*. *Ann. Naturhist. Mus. Wien* 53: 230, afb. 106.
 ERMISCH, K., 1969, Mordellidae, in: FREUDE, HARDE & LOHSE, die Käfer Mitteleuropas 8: 168—170.
 LOHSE, G. A., 1964, Staphylinidae, in: die Käfer Mitteleuropas 4: 212.
 MOHR, K. H., 1966, Chrysomelidae, in: die Käfer Mitteleuropas 9: 232—234.
 PEEZ, A. VON, 1967, Lathridiidae, in: die Käfer Mitteleuropas 7: 174, 180.
 STRAND, A., 1962, *Atheta debiloides* n.sp. (Col. Staph.). *Norsk ent. Tidsskr.* 12: 27.
 ————— & A. VIK, 1962, Die Genitalorgane der nordischen Arten der Gattung *Atheta* Thoms. (Col. Staph.). *Norsk ent. Tidsskr.* 12: 327 e.v., afb. 20 en 105.

Naarden post Bussum, Prins Federik Hendriklaan 68.