

The next chapters include a historic survey of the classification, remarks on phylogeny, and an extensive ecological survey of the species injurious to horticulture, with special emphasis on the influence of temperature on the diapause of the larvae, their resistance to frost, etc. Separate chapters are entirely devoted to the five most injurious species: *Laspeyresia pomonella* (L.) (The Codling Moth), *L. pyrivora* Danil. (injurious to pear), *Grapholitha molesta* Bursk (Oriental Fruit Moth), *G. funebrana* Tr. (Plume Moth), and *G. inopinata* Heinr. ("Manjurian fruit moth"), and the control measures for these pests are indicated.

Then there is a survey of Laspeyresiini injurious to coniferous trees, and finally one on the pests of deciduous woods, both give measures against all these species. A survey of laspeyresiine pests of agricultural crops with control measures follows; and a survey of the literature, containing over 690 titles, completes this part of the monograph.

The systematic section comprises 496 pages in which 14 genera are treated, assigned to two (new) subtribes, Dichroramphae and Laspeyresiae. Keys tot species are provided, and the genitalia of the two sexes of all of them are illustrated.

This book is a valuable contribution to the literature on Lepidoptera and an indispensable tool for every student of the group. It will affect even the identification of the Dutch Laspeyresiini, as I hope to show later. — A.D.

Afdeling Noord Nederland van de N.E.V., secr. P. KUIJTEN, H. Colleniusstraat 35, Groningen.

Op 8 november 1969 werd in Groningen de afdeling Noord Nederland van de N.E.V. opgericht. Bij de oprichtingsvergadering waren 13 (aspirant)leden aanwezig plus de heren W. HELLINGA en C. A. W. JEEKEL uit Amsterdam; de heren FRIELINK en KUIJTEN hadden bericht van verhindering gezonden.

Tot voorzitter werd W. L. BLOM gekozen, tot vicevoorzitter G. OTTO en tot secretaris-penningmeester P. KUIJTEN. De afdelingscontributie werd vastgesteld of f 3,50 per jaar. Men behoeft geen lid van de N.E.V. zelf te zijn om lid van de afdeling te kunnen worden. Besloten werd zo mogelijk iedere twee maanden bijeen te komen.

*Papilio machaon* L. (Lep. Papilionidae). In de zomers van 1941 en 1942 verzamelde ik tientallen rupsen van deze vlinder op wortelveldjes in de volkstuintjes van Rotterdam-Zuid. Na 1945 heb ik de vlinder in deze stad niet meer gezien.

Op 26 juli 1969 kwam de heer STEENBEEK, die vorig jaar begonnen is met het verzamelen van vlinders, mij opgetogen vertellen, dat hij op een Buddleia in Schiebroek een koninginpage had gezien. Een poging het dier met de hand te vangen mislukte.

Ongeveer te zelfder tijd kreeg ik de mededeling van een vriend, dat hij enkele dagen achter elkaar een mooie gele vlinder „met van die staarten” in zijn tuin op Buddleia had gezien. Ongetwijfeld een koninginpage.

Op 11 september 1969 werd mij telefonisch gevraagd de naam op te geven van een grote gele vlinder, alweer met de omschrijving „met van die staarten, waarin een rood oog.” De onderwijzer SCHOT had in de schooltuin deze vlinder zien vliegen op Afrikaantjes. Het dier was zeer onrustig geweest, waardoor een poging hem te fotograferen mislukte.

Na 24 jaar, in één zomer, drie meldingen van *machaon* in Rotterdam. Danken wij dit aan de mooie zomer of is de koninginpage weer in opmars?

J. J. VAN OOSTERHOUT, Rododendronplein 7, Rotterdam 12.